



Comentarios sobre la identificación de un presunto *Ficedula speculigera* en Cap de Creus, Girona.

Àlex Ollé y Albert Burgas

Ante la observación de un macho adulto de *Ficedula* sp. localizado el día 30/04/2012 en el valle de Montjoi, Cap de creus, Girona, se escriben unas notas sobre su identificación, con aspectos de campo, bibliográficos y de comentarios de diversos autores familiarizados con los diferentes taxones similares entre sí, como son *speculigera*, *hypoleuca iberiae* e híbridos de *albicollis* x *hypoleuca*.

Durante la observación en el campo, sorprendió en un inicio por la ancha coloración blanca en las bases de la primarias, más una mancha muy extensa blanca en la frente. A esos efectos y sin tener un collar completo tipo *F.albicollis*, los autores trabajaron *in situ* para poder ver y fotografiar el obispillo y rectrices externas, con la intención de acumular datos para su posible identificación. La observación de unos 20 minutos a intervalos irregulares, dio para obtener imágenes y pautas claras de todas las partes del ave. Incluso el reclamo fue escuchado largamente.

Desde un inicio los autores ya expresaron en la web de www.frontera.cat su inclinación a considerarlo un posible *speculigera*, aunque a falta de comentarios y sugerencias de gente que hubiese trabajado con este taxón y con *hypoleuca iberiae* no se podía descartar nada, dada su complejidad. Estos son muy semejantes en algunos plumajes y en el caso especialmente de *iberiae*, no se tiene suficiente información a día de hoy, para saber sus límites tanto en biometría como en coloración y caracteres de plumaje en sus diferentes poblaciones reproductoras ibéricas.

Con este episodio, se echó mano de comentarios de ornitólogos que han trabajado y publicado trabajos sobre *speculigera/hypoleuca iberiae*.

A continuación unas notas muy ilustrativas realizadas por José Luis Copete, autor de *Identification of Atlas Flycatcher in summer plumage* (Copete, J.L., Armada, R., López, F & Bigas, D. 2010. Dutch Birding V.32. nº 3.)

1.Los híbridos de *albicollis* x *hypoleuca* presentan dos tipos de plumaje. Los que son 'Pied Type', tirando a *hypoleuca*, y los que son 'Collared Type', que se parecen más a *albicollis*. En el caso de los 'Pied Type' presentan la mancha blanca de las primarias como en nominal *hypoleuca*, esto es, más pequeña (notablemente) que en *speculigera/iberiae*. Además tiene menos blanco en las terciarias que *speculigera/iberiae*. Cuando digo menos blanco quiero decir que el blanco está presente bien extendido en la hemibandera externa, pero no se interna de forma generosa en la hemibandera interna. En *speculigera/iberiae* el blanco se extiende en esa hemibandera interna de forma muy evidente, pasando de la punta del raquis con una extensión bien clara por el resto de la pluma en esa parte interna. En promedio, los 'Pied Type' no tienen eso. Vuestro pájaro tiene dos caracteres que apuntan que no es un híbrido 'Pied Type': mancha blanca de primarias bien extensa, pasando por bastantes mm hacia abajo de la primary covert más larga, una mancha de ala bien similar a la de

speculigera o albicollis; luego, en la foto DPP_004 se puede ver que en las terciarias el blanco pasa hacia la hemibandera interna en el ala derecha. En el ala izquierda da la sensación que menos, pero yo creo que es una sensación que da la foto, pues en realidad se puede asumir que las dos alas son simétricas.

Luego, en el caso de los 'Collared Type' presentan un plumaje negro mate, como en speculigera/iberiae, y una mancha frontal bien alta (extendida arriba en la frente) y bien ancha. Ambas cosas presentes en vuestro pájaro. Pero sin embargo también debería presentar, en promedio, un collar solo roto en la nuca, muy extendido, como en un albicollis pero que no acabara de ser perfecto, además de una mancha blanca en la espalda (que no el obispillo, ojo) como en albicollis: blanca bastante pura, extensa, casi como en albicollis average. Vuestro pájaro presenta un dorso bueno para speculigera, algo menos para iberiae (que presenta variación, pero en promedio una mancha en la espalda que tiende a ser como en hypoleuca nominal), y malo del todo para un híbrido 'Collared Type'. Además tampoco presenta el collar. A todo ello hay que añadirle la cola, que en un macho adulto de 'Collared Type' presenta manchitas blancas en las puntas de las rectrices externas (como a medio camino entre adultos reproductores de albicollis, que no tienen blanco, e hypoleuca, que sí lo tienen). Vuestro pájaro tiene la cola negro mate, perfecta para adultos de speculigera e iberiae (ojo, que este último también tienen la cola así de adultos).

Por todo lo previo, yo creo que es fiable descartar esa opción.

2-Nos quedaría, por tanto, que o es *speculigera* o *iberiae*. Tiene características muy buenas para el promedio de *speculigera*: mancha blanca frontal muy grande, alta y ancha. Sobre todo, que sea ancha en la base, yendo hacia los ojos. En *iberiae* en promedio es algo más estrecha (ver por ej las fotos que pusimos en la plate 205-206 de nuestro artículo en DB en 2010). Sin embargo, hay *iberiae* que tienen manchas blancas tan grandes como *speculigera*. Por lo que el tema de la mancha sirve más bien para rematar una identificación de *iberiae*, descartando *speculigera*, que no al contrario, afirmar que un pájaro que la tenga muy grande, sea *speculigera*, por este problema que comentaba. En promedio es cierto que *speculigera* la tiene mayor, pero claro, no se puede descartar un *iberiae* con ese patrón, que los puede haber en cierta proporción.

Luego, por eso, hay una cosa que indica más *speculigera* que *iberiae*: la mancha de la espalda, que parece ausente en vuestro pájaro, que muestra un dorso uniforme negro mate, muy lustroso, como son la mayoría de *speculigera* (ver nuestro artículo, que tenía como objetivo sobre todo esto, comentar que no son bichos con mancha blanca como en *albicollis* como habían sido descritos hasta entonces, sino que eso es una minoría de pájaros, la mayoría tienen mancha casi ausente o ausente del todo). En *iberiae*, según Mild (1994), esa mancha sería como en *hypoleuca*: una manchita de blanco sucio insinuado, no muy grande, en la espalda justo a tocar el obispillo. Los que yo he visto en Madrid, donde fuimos a capturar *iberiae*, son así: como un *hypoleuca* nominal, en ese carácter. Sin embargo capturamos un macho (plate 207 de nuestro artículo) que presentaba una espalda como *speculigera*. Así que este tema, a pesar de lo comentado por Krister Mild en su paper clásico sobre la id de los *Ficedula* machos adultos, está por resolverse.

Dado lo que te comento, yo creo que tiene más números de ser *speculigera* que *iberiae*. Pero que no puede afirmarse 100% hasta que no se profundice sobre la variación de los *iberiae*.

Hay un carácter además que creo que puede servir. Es el color negro, que en *speculigera* es muy lustroso, un negro muy mate pero con un lustre que los hace muy chulos. En *iberiae* no tienen ese jet black: son negros, sí (en plumaje definitivo; en los 1st-summer son como en *hypoleuca* nominales en las plumas de vuelo), pero no tan lustrosos. Cómo medir esto es algo subjetivo. Pero vuestro pájaro, para mí, es más eso, un *speculigera* que un *iberiae*.

Comentario de Andrea Corso sobre el ave de Girona:

Hi


I'm happy to communicate you that this is a MOST TYPICAL and fantastic *Ficedula speculigera*, 1st for SPAIN !! It is part of major influx of this species into Europe in these days, with 4 to 6 in Italy and 1 in Malta, and one in UK too !!!

Very good job and well done, all my compliments

hybrid is excluded because no reason to think it is one, as the white forehead, the white primary base patch, the P1 length, the tail, very jet deep black plumage etc are all perfectly fitting a male adult type *speculigera*, with no oddity at all.... also, white forehead pattern, wide and shape, as well as the length of P1 and the wideness and shape of white primary base all exclude an *iberiae*.

Así pues y a falta de más comentarios, el ave de Cap de Creus, parece apuntar como ya se comentó en un inicio a *Ficedula speculigera* según los diferentes comentarios, aunque como dicen algunos autores, queda trabajo por realizar, especialmente con las poblaciones ibéricas para tener más documentados diferentes aspectos básicos en el momento de poder separar en el campo de manera fidedigna *speculigera* de *iberiae*. Ciertos aspectos como mancha blanca frontal y especialmente la coloración de la espalda, parecen ser los factores mas importantes y que en un futuro próximo si se llevan a cabo estudios sobre el problema, se podría determinar a posteriori esta ave en particular de forma segura. De momento, y aunque todo apunte a una primera para España, hoy por hoy no es posible su identificación específica.

Muchas gracias a José Luis Copete, Ferran López, Miguel Ángel Fuentes y Andrea Corso por todos sus comentarios.




Ficedula speculigera

Montjoi, Cap de Creus, Girona (España)

30 de abril de 2012

© Albert Burgas




Ficedula speculigera

Montjoi, Cap de Creus, Girona (España)

30 de abril de 2012

© Albert Burgas



Ficedula speculigera

Montjoi, Cap de Creus, Girona (España)

30 de abril de 2012

© Albert Burgas