

Viaje ornitológico por Finlandia y Norte de Noruega

25 de mayo – 13 de junio de 2009

ANTONIO CEBALLOS Y ANA C. NARCISO

ceballos@usal.es



Entre los días 25 de mayo y 13 de junio de 2009 recorrimos gran parte de Finlandia y Norte de Noruega con el objetivo principal de localizar y observar un conjunto de especies de aves propias del norte y este de Europa y, por tanto, ajenas a nuestro entorno biogeográfico próximo. Para ello visitamos una serie de zonas previamente seleccionadas en donde las posibilidades de éxito fueran mayores: i) sur de Finlandia, con una especial atención a los alrededores de Helsinki; ii) Oulu y alrededores; iii) Laponia; iv) Varanger y alrededores; v) Kuusamo y alrededores y vi) sureste de Finlandia (Värtsilä, Parikkala e Imatra). En comparación con el número total de aves contabilizadas por otros observadores en un viaje similar (generalmente siempre por encima de 180), en nuestro caso sólo anotamos 167 especies distintas, debido a que nos centramos en aquellas especies y subespecies nuevas para nosotros. De las 167 especies vistas, 44 son consideradas como rareza en España. En el anexo correspondiente se incluye un listado completo con todas las especies, detallando en que zonas fueron vistas. Durante los 20 días del viaje el tiempo fue muy variable, predominando los días lluviosos y con temperaturas bajas.

Para la preparación del recorrido resultó clave la consulta de una serie de *trip reports*, destacando los publicados por F. Simpson (junio/julio de 2003); Karmelo de Dios et al. (mayo/junio de 2004); Oscar Gutiérrez et al. (mayo/junio de 2006); Paco Chiclana et al. (mayo/junio de 2006); José Ardaiz (mayo/junio de 2007) y Daniel López Velasco et al. (julio de 2007). También fueron consultados títulos como *Finding Birds in Finland* de Dave Gosney, *Dónde observar aves en Europa y toda Rusia* de Nigel Wheatley y un breve artículo sobre Varanger escrito por Gabriel Martín y publicado en el nº 135 de *La Garcilla*. Una vez sobre el terreno resultó fundamental el intercambio de información con otros ornitólogos, sin cuya colaboración no hubiéramos visto algunas de las especies más localizadas, así como la contratación de los servicios de la empresa de guías Finnature para ver especialmente los búhos.

A continuación se ofrece la siguiente información sobre el viaje: I) Aspectos organizativos. II) Recorrido detallado. III) Mapa con los lugares visitados más significativos. IV) Lista de las especies observadas durante el viaje. V) Información detallada por orden cronológico de las observaciones más destacadas del recorrido, incluyendo varias fotografías de aves¹, coordenadas geográficas² para facilitar la localización de los sitios (configuración GPS: grados y minutos decimales, datum WSG84), algunas descripciones de hábitats, etc. VI) Galería general de fotos.

I) GENERALIDADES: ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Transporte: Viajamos en avión desde Madrid a Helsinki, con escala en Praga, con la compañía Czech Airlines. Mediante el buscador www.rumbo.es encontramos un par de billetes cuatro meses antes del viaje por 195 € cada uno (tasas incluidas). Para desplazarnos por Finlandia y Noruega alquilamos un Skoda Fabia "familiar" diesel en *Budget* por 1.110 € (incluyendo el complemento por atravesar la frontera y entrar en Noruega). Durante nuestro viaje en Finlandia el litro de diesel osciló en torno a 1,00 € (unos 7 céntimos más caro que en España durante el mismo período).

Alojamiento: Salvo las tres noches en que pernoctamos en Noruega, no hicimos ninguna reserva de alojamiento ya que fuimos decidiendo sobre la marcha los lugares en donde parar por la "noche" y descansar. No tuvimos ningún problema o contratiempo a la hora de buscar y encontrar alojamiento. Con la guía de viaje de la colección "Trotamundos" (editada por Salvat) tuvimos más que suficiente para solventar esta cuestión. Suponemos que a partir de la segunda quincena de junio y sobre todo en julio y agosto los problemas para encontrar alojamiento sobre la marcha serán mucho mayores. Generalmente nos alojamos en cabañas de madera ubicadas en campings, con un precio que en la mayor parte de los casos osciló entre los 35 y 45 € para dos personas. Generalmente cada cabaña tenía dos camas con colchón (fue necesario saco de dormir), una mesa con dos bancos y en algunos casos una pequeña nevera y una cocina eléctrica.

Comidas: Encontramos una buena oferta de pequeños supermercados en casi todas las localidades que atravesamos y también en las estaciones de servicios. En alguna ocasión recurrimos a los menús del día (denominados *lounas*) que ofertaban los restaurantes de carretera por unos 9 €. Los platos combinados y las hamburguesas de los restaurantes de la cadena de estaciones de servicio ABC también fueron un buen recurso ya que abrían de 6 a 24 h.

Mapas y GPS: Como en otros viajes, recurrimos al mapa de carreteras de *Freytag & Berndt* (Finlandia 1:500.000), que una vez más nos dio un magnífico resultado. También llevamos en el coche un navegador GPS Tom Tom con la cartografía del país, que sin duda nos hizo ganar muchísimo tiempo durante el viaje, y un GPS 60 C de *Garmin* para georreferenciar las observaciones más relevantes. Siguiendo los estándares al uso, en la configuración del GPS seleccionamos el datum WSG 1984 y las coordenadas las expresamos en grados y minutos decimales.

Servicio de guías: Para asegurar algunas especies muy localizadas y difíciles de encontrar sin buenos contactos en el país, recurrimos a los servicios de la empresa Finnature en Oulu para ver los búhos. El precio nos pareció muy elevado (200 € por persona), aunque en nuestro caso lo amortizamos bien ya que vimos Mochuelo Chico, Cárabo Lapón, Cárabo

¹ Todas las fotografías de aves que ilustran este trip fueron realizadas aplicando la técnica del digiscoping (cámara Canon PowerShot 95, telescopio Carl Zeiss 85 mm, ocular 20-60).

² En el caso de las observaciones realizadas durante la excursión guiada por Finnature y del Zarcero Escita en Värtsilä, no incluimos coordenadas GPS debido a nuestro compromiso con los guías de Finnature y el ornitólogo finés Ari Linna de no divulgar las localizaciones de las especies vistas gracias a su colaboración.

Uralense, Lechuza de Tengmalm, Grévol, Pico Tridáctilo y Alcaudón Real Norteño en muy buenas condiciones. La excursión duró 8 horas (de 3:00 a 11:00 h) e incluía desplazamiento en una furgoneta de 8 plazas, desayuno en el campo y, por supuesto, el asesoramiento del guía.

Indumentaria: En la época de nuestro viaje (finales de mayo, comienzos de junio) el tiempo es sumamente variable, lo que aconseja llevar ropa de abrigo (forro polar, chaqueta de gore-tex, gorro, guantes, botas, etc). Debido al frío, al viento y el agua una buena chaqueta de gore-tex o material similar resulta imprescindible. Tras darle muchas vueltas, por el tema del peso del equipaje, finalmente incluimos también unas botas de agua que resultaron de gran utilidad para recorrer ciertas zonas con sustrato de musgo y parcialmente encharcadas (especialmente en Laponia).

II) DETALLES DEL RECORRIDO (6.148 km en 19 días):

Día 25/05: Llegada a Helsinki a las 16:45 h; recogida del coche y desplazamiento al camping Oittaa. Cabaña austera para dos personas: 52 €. Tiempo despejado, 20° C en el aeropuerto.

Día 26/05: Emprendimos camino a Oulu. Visitas al paraje natural de Vikki y al parque natural de Pyhä-Häkin. Pernoctación en el camping Nelostien Lomamokit en Äänekoski. Cabaña austera para dos personas: 42 €. Tiempo parcialmente nublado con ligero chubasco, 20 ° C en las horas centrales del día.

Día 27/05: Llegada a Oulu a mediodía; visita a Liminganlahti y desplazamiento al camping Nallikari (65°01.866' N – 25°25.046' E). Cabaña austera para dos personas: 35 €. Tiempo nublado y lluvioso, ≈15° C.

Día 28/05: Recorrido durante la madrugada por la carretera 813 y visita a las inmediaciones del área portuaria de Oulu (Rantakurvin Lintutorni). Pernoctación en el mismo sitio del día anterior. Tiempo muy ventoso, nubosidad variable, 7/14° C.

Día 29/05: Excursión con Finnature y desplazamiento a Laponia. Pernoctación en Hostel Visatupa en Sodankylä/Raudanjoki (67°03.238' N – 26°22.302' E): habitación doble con desayuno incluido por 52 €. Tiempo despejado durante la mañana (madrugada muy fría) con chubascos vespertinos, 0/13° C.

Día 30/05: Visita a la ciénaga de Petkula, Sampiojarvi y Monte Kiilopaa. Pernoctación en el camping Ukonjarven Lomakylä a 8 km al norte de Ivalo, junto al lago Inari. Habitación doble minúscula con baño: 55 €. Tiempo variable con rachas de viento, 13/18 ° C.

Día 31/05: Visita al comedero del hotel-restaurant Neljan Tuulen Tupa y desplazamiento hacia la frontera vía Karigasniemi (visita al Monte Ailegas). Pernoctación en el camping de Utsjoki. Cabaña austera para dos personas: 45 €. Tiempo variable con rachas de viento y algunos chubascos, 13/20° C.

Día 01/06: Incursión en Noruega, recorriendo el fiordo de Varanger hasta la localidad de Vardo. Las noches correspondientes a los días 1, 2 y 3 las pasamos en una casita alquilada por 1600 coronas las tres noches en Vestre Jakobselv (contacto: Jens Pedersen, post@pikkuskitsi.no). Tiempo miserable con continuos chubascos, bajas temperaturas (≈ 3° C) y viento muy fuerte que intensificaba la sensación térmica de frío.

Día 02/06: Recorrido por Varanger, alcanzado la localidad de Hamningberg y visitando la isla Hornoya (precio del billete individual desde Vardo 300 coronas noruegas). Tiempo frío (3/5° C), aunque sin lluvia y viento moderado.

Día 03/06: Por la mañana recorrimos el interior de Varanger desplazándonos hasta Tana Bru y de ahí a Batsfjord. Por la tarde hicimos una última visita al fiordo hasta las proximidades de Vardo. Tiempo nublado y frío, con temperaturas que oscilaron entre -0,5 y 1° C y aguanieve por la mañana y despejado por la tarde, alcanzándose los 7° C.

Día 04/06: Salida de Varanger a primera hora, internándonos de nuevo en Finlandia rumbo a Kuusamo. Paradas puntuales y breves en los comederos de los hoteles restaurantes Pohjan Tuli y Neljan Tuulen Tupa y la ciénaga de Petkula. Por la tarde recorrimos los alrededores de Sodankylä en donde pernoctamos en el camping Nilimella. Cabaña austera para dos personas: 36 €. Tiempo frío y muy lluvioso durante gran parte de la jornada (1,5 / 7° C).

Día 05/06: Llegada a Kuusamo al mediodía, visitando por la tarde Konttinen-Valtavaara e Iivaara. En el complejo turístico Heikkala en Ruka nos alojamos en un comodísimo chalet de madera durante tres noches por un precio total de 180 € (el chalet tenía 3 dormitorios, una completa cocina, un confortable salón, cuarto de baño, sauna y lavandería). Tiempo nublado y frío (2,5 / 6° C)

Día 06/06: Recorrido a fondo por Iivaara y Konttinen-Valtavaara de madrugada y el lago Juntilla y carretera 20 por la tarde. Tiempo nublado y frío con nevadas intermitentes y poco intensas (- 0,5/6° C).

Día 07/06: Recorrido Konttinen-Valtavaara de madrugada y visita al parque Oulanka. Tiempo frío y variable, con aguanieve por la mañana y parcialmente despejado por la tarde (0,5 / 6,5° C).

Día 08/06: Última visita a Konttinen-Valtavaara por la mañana. Salida de Kuusamo rumbo al sureste de Finlandia. Llegada a Vartsila a media tarde alojándonos en el Hotelli Sinilintu. Habitación doble, sin baño y con desayuno: 60 €. Tiempo variable: 2,5° C en Kuusamo, 14° C en Vartsila.

Día 09/06: Recorrido por los alrededores de Vartsila entre la 1:00 y las 5:30 h de la noche -madrugada. Desplazamiento a Parikkala. Visita a Siikalahti y alrededores. Pernoctación en el camping Lumakeskus en Punkaharjun. Cabaña austera para dos personas: 35 €. Tiempo variable, chubascos por la mañana (6/15° C).

Día 10/06: Recorrido por los alrededores de Parikkala entre la 1:45 y las 3:30 h. Salida hacia Helsinki con parada en Imatra. Problemas para alojarnos en Helsinki debido a la avalancha de rusos, ya que por la noche jugaban Finlandia y Rusia un partido de fútbol (los rusos ganaron 0-3 con serios altercados entre las dos aficiones). Finalmente nos


alojamos de nuevo en el camping Oittaa en tienda de campaña: 21 €. 7° C al amanecer en Parikkala, 19° C por la tarde en Helsinki.

Día 11/06: Visita turística a Helsinki. Pernoctación en el camping Oittaa. Cabaña austera para dos personas: 52 €. Tiempo nublado por la mañana y despejado por la tarde (13/19,5° C).

Día 12/06: Visita turística por la costa sur (Ekenas Tammisaari y Hanko). Tiempo despejado con 21,5° C a mediodía. Breve paseo por el parque natural de Nuuksion y desplazamiento al aeropuerto para entregar el coche a última hora del día y pasar la noche.

Día 13/06: Regreso a Madrid vía Praga.

III) MAPA CON LOS LUGARES VISITADOS MÁS SIGNIFICATIVOS:



IV) LISTA DE ESPECIES DE AVES IDENTIFICADAS (N = 167)

Distribución de acuerdo a las distintas zonas señalizadas en el mapa

Especies	I	II	III	IV	V	VI
<i>Gavia stellata</i>						
<i>Gavia arctica</i>						
<i>Gavia adamsii</i>						
<i>Podiceps grisegena</i>						
<i>Podiceps cristatus</i>						
<i>Podiceps auritus</i>						
<i>Phalacrocorax carbo</i>						
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>						
<i>Ardea cinerea</i>						
<i>Botaurus stellaris</i>						
<i>Cygnus olor</i>						
<i>Cygnus cygnus</i>						
<i>Anser brachyrhynchus</i>						
<i>Anser anser</i>						
<i>Anas penelope</i>						
<i>Anas crecca</i>						
<i>Anas platyrhynchos</i>						
<i>Anas acuta</i>						
<i>Anas clypeata</i>						
<i>Aythya fuligula</i>						
<i>Somateria mollissima</i>						
<i>Somateria spectabilis</i>						
<i>Polysticta stelleri</i>						
<i>Clangula hyemalis</i>						
<i>Melanitta nigra</i>						
<i>Bucephala clangula</i>						
<i>Mergus albellus</i>						
<i>Mergus serrator</i>						
<i>Mergus merganser</i>						
<i>Haliaeetus albicilla</i>						
<i>Circus aeruginosus</i>						
<i>Accipiter nisus</i>						
<i>Buteo buteo</i>						
<i>Buteo lagopus</i>						
<i>Falco tinnunculus</i>						
<i>Falco subbuteo</i>						
<i>Lagopus lagopus</i>						
<i>Tetrao tetrix</i>						
<i>Bonasa bonasia</i>						
<i>Grus grus</i>						
<i>Crex crex</i>						
<i>Fulica atra</i>						
<i>Haematopus ostralegus</i>						
<i>Vanellus vanellus</i>						
<i>Pluvialis apricaria</i>						
<i>Charadrius hiaticula</i>						
<i>Charadrius dubius</i>						
<i>Charadrius morinellus</i>						
<i>Gallinago gallinago</i>						
<i>Limosa limosa</i>						
<i>Limosa lapponica</i>						
<i>Numenius phaeopus</i>						
<i>Numenius arquata</i>						
<i>Actitis hypoleucos</i>						
<i>Tringa ochropus</i>						
<i>Tringa nebularia</i>						
<i>Tringa glareola</i>						
<i>Tringa totanus</i>						
<i>Arenaria interpres</i>						
<i>Calidris canutus</i>						
<i>Calidris alba</i>						
<i>Calidris alpina alpina</i>						
<i>Calidris maritima</i>						

Especies	I	II	III	IV	V	VI
<i>Philomachus pugnax</i>						
<i>Phalaropus lobatus</i>						
<i>Larus canus</i>						
<i>Larus marinus</i>						
<i>Larus argentatus argentatus</i>						
<i>Larus fuscus fuscus</i>						
<i>Larus ridibundus</i>						
<i>Larus minutus</i>						
<i>Rissa tridactyla</i>						
<i>Sterna paradisaea</i>						
<i>Sterna hirundo</i>						
<i>Stercorarius parasiticus</i>						
<i>Stercorarius longicaudus</i>						
<i>Uria aalge aalge</i>						
<i>Uria lomvia</i>						
<i>Alca torda</i>						
<i>Cepphus grylle</i>						
<i>Fratercula arctica</i>						
<i>Columba livia</i> var. domestica						
<i>Columba palumbus</i>						
<i>Cuculus canorus</i>						
<i>Strix uralensis</i>						
<i>Strix nebulosa</i>						
<i>Glaucidium passerinum</i>						
<i>Aegolius funereus</i>						
<i>Asio flammeus</i>						
<i>Apus apus</i>						
<i>Dendrocopos minor</i>						
<i>Dendrocopos major</i>						
<i>Picoides tridactylus tridactylus</i>						
<i>Dryocopus martius</i>						
<i>Picus canus</i>						
<i>Eremophila alpestris flava</i>						
<i>Hirundo rustica</i>						
<i>Delichon urbica</i>						
<i>Anthus pratensis</i>						
<i>Anthus cervinus</i>						
<i>Anthus trivialis</i>						
<i>Anthus petrosus littoralis</i>						
<i>Motacilla alba</i>						
<i>Motacilla flava thunbergi</i>						
<i>Regulus regulus</i>						
<i>Bombicilla garrulus</i>						
<i>Prunella modularis</i>						
<i>Turdus merula</i>						
<i>Turdus pilaris</i>						
<i>Turdus iliacus</i>						
<i>Turdus viscivorus</i>						
<i>Locustella naevia</i>						
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>						
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>						
<i>Acrocephalus dumetorum</i>						
<i>Acrocephalus palustris</i>						
<i>Hippolais caligata</i>						
<i>Phylloscopus trochilus</i>						
<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>						
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>						
<i>Phylloscopus trochiloides</i>						
<i>Sylvia atricapilla</i>						
<i>Sylvia borin</i>						
<i>Sylvia communis</i>						
<i>Muscicapa striata</i>						
<i>Ficedula hypoleuca</i>						
<i>Ficedula parva</i>						
<i>Erithacus rubecula</i>						
<i>Luscinia luscinia</i>						
<i>Luscinia svecica svecica</i>						

Especies	I	II	III	IV	V	VI
<i>Tarsiger cyanurus</i>						
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>						
<i>Saxicola rubetra</i>						
<i>Oenanthe oenanthe</i>						
<i>Aegithalos caudatus caudatus</i>						
<i>Parus montanus</i>						
<i>Parus cinctus</i>						
<i>Parus major</i>						
<i>Parus caeruleus</i>						
<i>Lanius collurio</i>						
<i>Lanius excubitor</i>						
<i>Perisoreus infaustus</i>						
<i>Garrulus glandarius</i>						
<i>Pica pica</i>						
<i>Corvus monedula</i>						
<i>Corvus cornix</i>						
<i>Corvus corax</i>						
<i>Sturnus vulgaris</i>						
<i>Passer domesticus</i>						
<i>Passer montanus</i>						
<i>Fringilla coelebs</i>						
<i>Fringilla montifringilla</i>						
<i>Pinicola enucleator</i>						
<i>Carpodacus erythrinus</i>						
<i>Loxia curvirostra</i>						
<i>Carduelis chloris</i>						
<i>Carduelis flammea</i> ^R						
<i>Carduelis hornemanni</i> ^{R+}						
<i>Carduelis spinus</i>						
<i>Carduelis flavirostris</i> ^{R+}						
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>						
<i>Emberiza citrinella</i>						
<i>Emberiza hortelana</i>						
<i>Emberiza pusilla</i> ^{R+}						
<i>Emberiza rustica</i> ^{R+}						
<i>Emberiza schoeniclus</i>						
<i>Calcarius lapponicus</i> ^{R+}						

V) INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LAS OBSERVACIONES DE AVES MÁS DESTACADAS DEL RECORRIDO:

25/05/2009

Al atardecer observamos en un abedular situado en el interior del **Camping de Oittaa** (60°14.471' N – 24°39.481' E), muy cerca de Espoo, un ejemplar hembra de **Pito Cano** (*Picus canus*), durante varios segundos posado en el tronco de un árbol a escasa distancia.

26/05/2009

A primera hora de la mañana (9:30 h) visitamos el paraje natural de **Vikki** (parking: 60°12.867' N – 24°59.115' E), situado en el oeste del tejido periurbano de Helsinki. En una aliseda próxima al puente observamos a placer un **Ruiseñor Ruso** (*Luscinia luscinia*) cantando de forma continuada (60°12.757' N – 24°58.992' E). Posteriormente en el bosque de abedules situado entre el parking y los observatorios y pasarelas de madera localizamos varios ruiseñores más cantando (60°12.815' N – 24°59.154' E).



A media tarde recorrimos la carretera que conduce de Saarijärvi al parque natural de Pyhä-Häkin, parando en el **lago Pyhäjärvi** a la altura del cruce de la carretera de Häkkilä. En el lago observamos una pareja de **Somormujos Cuellirrojos** (*Podiceps grisegena*), permaneciendo uno de ellos incubando en el propio nido.

En las inmediaciones del punto anterior tuvimos la ocasión de ver al primer **Carbonero Sibilino** (*Parus montanus* subsp. *borealis*) del viaje en un bosque encharcado de píceas, abedules y alisos situado junto a la orilla del propio lago (62°47.940' N – 25°25.025' E). En el mismo lugar también se encontraba presente un ejemplar de **Mito** de la subespecie nominal (*Aegithalos caudatus* subsp. *caudatus*) caracterizado por su llamativa cabeza blanca.



Finalmente, a última hora del día escuchamos y vimos un **Mosquitero Silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*) en un bosque de *Pinus sylvestris*, con algunas píceas y abedules intercalados, en las inmediaciones del **camping Nelostien Lomamokit** en **Äänekoski**.

27/05/2009

En las proximidades del centro de visitantes de **Liminganlahti**, alertados por las indicaciones de un ornitólogo local, oímos cantar y vimos un macho de **Camachuelo Carminoso** (*Carpodacus erythrinus*) en la copa de un sauce (64°49.438' N – 25°18.654' E). El hábitat predilecto de esta especie consistió en setos de sauces y abedules limitando campos de cultivo.



Desde la torre de observación localizamos un grupo de al menos 60 **Serretas Grandes** (*Mergus menganser*) y también vimos numerosos **Cisnes Cantores** (*Cygnus cygnus*), especie omnipresente en los lagos de todo el país.

28/05/2009

Entre las 3:00 y 6:00 h, siguiendo las indicaciones de varios *trip reports*, recorrimos la **carretera 813** entre las localidades de **Lappi** y **Keskikylä** buscando **Gallos de Lira** (*Tetrao tetrix*). Tuvimos la ocasión de observar varios ejemplares en dos localizaciones. El primer lugar correspondió a la gravera abandonada citada en los *reports* de Óscar Gutiérrez y José Ardaiz (64°50.945' N – 24°48.476' E), en donde contamos un total de 4 machos. Primeramente un grupo de tres aves posadas en el suelo (3:45 h) y una hora más tarde (4:45 h) un cuarto macho sobrevoló el paraje a baja altura internándose posteriormente en el bosque. El hábitat consistió en una antigua gravera actualmente en desuso y colonizada por musgos, brezos, arándanos, así como por pequeños sauces, abedules y pinos dispersos.

Posteriormente, a las 5:40 h localizamos un lek con 5 machos en un campo arado en las proximidades del límite del bosque. Observamos la pugna entre dos machos, consiguiendo el ave dominante expulsar a su contrincante fuera del campo arado mientras que los tres machos restantes permanecieron en actitud poco beligerante.

Fueron frecuentes las carreras del macho dominante con la cola levantada y extendida. A pesar del fuerte viento, grabamos un par de videos y realizamos varias fotografías que reflejan toda la secuencia. La localización del lek corresponde a 200 m al sur desde el siguiente punto de observación situado en la propia carretera: 64°51.742' N – 25°04.919' E.





Durante la mañana visitamos en un par de ocasiones el clásico observatorio situado junto al área portuaria de Oulu en donde algunas fuentes de información sugieren la posibilidad de observar Andarrios de Terek (**Rantakurvin Lintutorni**, 65°00.981' N – 25°24.904' E). El fuerte viento reinante nos impidió prácticamente montar el telescopio en lo alto de la torre. Tras varios rastreos con los prismáticos sólo detectamos la presencia de algunas gaviotas no consiguiendo ver especie alguna de limícolas. Posteriormente, la guía de Finnature Pirita Latja nos comentó que en la zona hay muy pocos individuos de la especie y que suelen moverse por el área portuaria de acceso restringido. En el sendero que conduce desde el parking a la torre vimos un **Carbonero Sibilino** (*Parus montanus* subsp. *borealis*) anillado picando la piña de un *Pinus sylvestris* en una acrobática postura.



29/05/2009

Entre las 3:00 y las 11:00 h de un día frío y despejado (0° C a las 2:50 h) participamos en una **excursión guiada** con la empresa **Finnature** recorriendo el espacio comprendido, por un lado, entre las carreteras 4 y 8, y por otro, entre las carreteras 813 y 4, a unos 30-50 km al **sur-suroeste de Oulu**. El grupo lo formamos la guía Pirita Latja, los franceses Alain Pataud, Françoise Harriet y Alain Goudon, Ana C. Narciso y Antonio Ceballos. Por orden cronológico, las observaciones más relevantes de la excursión fueron las siguientes.

Hicimos un primer intento para ver Lechuza de Tengmalm en una caja nido sin éxito. Aunque la caja estaba ocupada, la pareja de adultos se encontraban ausente ya que probablemente estuvieran cazando. Posteriormente visitamos un territorio de **Mochuelo Chico** (*Glaucidium passerinum*) consiguiendo localizar a uno de los miembros de la pareja posado en lo alto de una píceas ofreciéndonos excelentes vistas (bosque de píceas y abedules).



Posteriormente nos desplazamos unos pocos cientos de metros por una pista para visitar otra caja nido ocupada por Lechuza de Tengmalm e intentar, de nuevo sin éxito, verla. Justo en este punto escuchamos el canto de un **Grévol** (*Bonasa bonasia*) oculto en un bosque de píceas con algunos pinos y abedules. Tras varios minutos de espera finalmente conseguimos ver una pareja, ya que en un par de ocasiones atraviesan la pista mediante un vuelo rápido posándose en la parte media de la copa de los árboles ocultos en el follaje. Siguiendo la pista dentro de la furgoneta sorprendemos a un macho de **Gallo de Lira** (*Tetrao tetrix*) en el camino, posándose en la copa de un abedul junto a la cuneta lo cual nos permitió verlo a escasos metros. Tras ello, nos desplazamos varios kilómetros para visitar un par de territorios de **Pico Tridáctilo** (*Picoides tridactylus* subsp. *tridactylus*), consiguiendo en el segundo intento ver un precioso macho posado en el tronco de un árbol muerto, situado en un amplio claro en un bosque de píceas orlado por abedules (ver fotografía).



Aproximadamente a un kilómetro del lugar en donde vimos al Pico Tridáctilo visitamos un nido de **Cáрабо Lapón** (*Strix nebulosa*) situado en la rama de un gran abedul en el seno de un bosque mixto de abedules, pinos y píceas. Durante más de 20 minutos observamos a la hembra tumbada sobre los pollos (Pirita nos comentó que la pareja estaba criando 5 pollos) mientras que el macho ausente probablemente estuviera cazando.

De regreso al claro forestal en donde vimos al Pico Tridáctilo, localizamos posado en la rama de un árbol seco un **Alcaudón Real Norteño** (*Lanius excubitor*).




Posteriormente recorrimos varios kilómetros con el propósito de visitar una caja nido ocupada por **Cáрабо Uralense** (*Strix uralensis*) en un bosque de *Pinus sylvestris* con algún que otro abedul intercalado. En el momento de aproximarnos a las inmediaciones del nido, para tratar de ver a los adultos que seguramente se encontrarían en las inmediaciones del mismo, somos testigos de la conocida agresividad de la especie al ver como repentinamente un cáрабо adulto se precipita sobre la guía Pirita Latja arrebatándole la gorra. El ave finalmente se posa en la rama de un árbol cercano vigilando expectante todos nuestros pasos.

Finalmente regresamos a la segunda caja nido, ocupada por una pareja de **Lechuza de Tengmalm** (*Aegolius funereus*), que visitamos al comienzo de la jornada, pudiendo por fin ver a uno de los adultos que se asomó curioso al agujero de la caja en cuanto detectó nuestra presencia. El ave permaneció confiada durante varios minutos a escasos metros de distancia, lo que nos permitió observarla a placer. Bosque de píceas con algún que otro abedul intercalado.



30/05/2009

En un pinar de *Pinus sylvestris*, en las inmediaciones del albergue en donde dormimos (**Hostel Visatupa en Sodankyla/Raudanjoki**, coordenadas 67°03.238' N – 26°22.302' E), observamos durante varios minutos un macho de **Ampelis Europeo** (*Bombycilla garrulus*) posado en las ramas bajas de un árbol en actitud confiada (5:00 h). Posteriormente, cuando reemprendimos el viaje volvimos a verlo sobre las 9:20 h.



A unos 2 kilómetros de la pequeña localidad de **Seipäjärvi**, siguiendo la única pista de tierra que comunica la zona, en un bosque de píceas con algunos pinos y abedules intercalados y sustrato mullido cubierto de musgo y arándanos (67°10.261' N- 26°14.157' E), localizamos 3 **Carboneros Lapones** (*Parus cinctus*) y 1 **Carbonero Sibilino** (*Parus montanus*). Hora de la observación: 6:15 h.

Al norte de **Sodankylä**, en un pastizal a la orilla de un lago junto a la carretera, vimos un par de **Lavanderas Boyeras** de la variedad fennoscandinava (*Motacilla flava* subsp. *thunbergi*).

Por la tarde subimos al **Monte Kiilopää** (546 m) buscando los **Chorlitos Carambolos** (*Charadrius morinellus*) que suelen ser usuales en los brezales próximos a la cima. Tras una larga búsqueda, dificultada por el fortísimo viento que soplabá, conseguimos localizar una pareja a unos 100 m de la cima y 200 m a la derecha de la escalera de madera según se sube. A pesar de la actitud confiada de las aves, el fuerte viento nos impidió hacerles buenas fotografías.



31/05/2009

A unos 3 km al norte de **Ivalo**, en la carretera que conduce a la localidad de Koppelo, vimos pasar volando por encima de nuestra posición una pareja de **Ampelis Europeos** (*Bombicilla garrulus*) que posteriormente se posaron en lo alto de la copa de un pino (68°41.169' N – 27°34.256' E, 5:25 h).

Posteriormente, en un bosque de *Pinus sylvestris*, con algún abedul intercalado, situado en la orilla sur del **lago Inari**, y en las cercanías del camping Ukonjarven Lomakyla, localizamos una pareja de **Carboneros Lapones** (*Parus cinctus*). Coordenadas geográficas: 68°44.228' N – 27°29.142' E. Hora de la observación: 7:30 h.

A las 10:00 h nos apostamos en las proximidades del comedero situado junto al hotel-restaurante **Neljan Tuulen Tupa** (69°10.957' N – 27°12.821' E) en donde había numerosos **Verderones Comunes** (*Carduelis chloris*) y **Pinzones Reales** (*Fringilla montifringilla*), así como unos pocos **Carboneros Comunes** (*Parus major*) y **Pardillos Sizerines** (*Carduelis flammea*). Sobre las 10:30 h fuimos sorprendidos por la repentina llegada de un magnífico ejemplar macho adulto de **Camachuelo Picogruoso** (*Pinicola enucleator*), que nos llamó la atención por su tamaño y corpulencia en relación con el resto de passeriformes presentes en los comederos. Permaneció durante varios minutos comiendo pipas, circunstancia que aprovechamos para observarlo con detenimiento y sacarle algunas buenas fotografías.






A unos 12,3 km de **Karigasniemi**, en una pequeña laguna situada junto a la carretera 92 (69°23.339' N – 26°10.391' E), vimos dos machos de **Serreta Chica** (*Mergus albellus*) mostrando una actitud desconfiada y huidiza ante nuestra presencia. Tuvimos la oportunidad de observarlos en muy buenas condiciones, tanto posados en el agua como en vuelo. En el mismo sitio también anotamos dos machos y una hembra de **Lavandera Boyera** (*Motacilla flava* subsp. *thunbergi*).

01/06/2009

En los primeros kilómetros de la **carretera E-75**, en territorio noruego y no muy lejos de la frontera, avistamos una pareja de **Serretas Chicas** (*Mergus albellus*) en una pequeña laguna junto a la carretera (69°56.808' N – 27°12.706' E). Al igual que los dos machos observados el día anterior, mostraron una actitud muy desconfiada y huidiza ante nuestra presencia. En la misma carretera, y a la altura de la pequeña localidad de **Sirma**, vimos a lo lejos un **Ratonero Calzado** (*Buteo lagopus*) cerniéndose.

Sobre las 10:00 de la mañana llegamos al **fiordo de Varanger**, sufriendo unas condiciones meteorológicas muy duras: viento muy fuerte, chubascos intermitentes y temperaturas bajas (2,5 – 5° C). Recorrimos el fiordo hasta la localidad de Vardo, destacando las siguientes observaciones: i) Hasta 8 **Pigargos** (*Haliaeetus albicilla*) distintos pertenecientes a diferentes grupos de edad. ii) Cerca de **Skallelv** anotamos una pareja de **Ánsares Piquicortos** (*Anser brachyrhynchus*) en las proximidades de la carretera. iii) En el puerto de **Store Ekkeroy** contamos 4 **Falaropos Picofinos** (*Phalaropus lobatus*); posteriormente vimos algunos más en las proximidades de **Vestre Jakobselv**. iv) Un ejemplar de **Alondra Cornuda** (*Eremophila alpestris* subsp. *flava*) en un brezal próximo a la carretera (70°12.420' N – 30°28.166' E). v) Durante la jornada contamos un par de **Págalos Raberos** (*Stercorarius longicaudus*) y numerosos **Págalos Parásitos** (*Stercorarius parasiticus*), con ejemplares de ambas fases. vi) Centenares de **Serretas Grandes** (*Mergus merganser*) en todo el fiordo.

Tanto los Pigargos como los Falaropos Picofinos, Págalos Parásitos y Serretas Grandes son aves frecuentes en Varanger, pudiendo ser observados en diferentes sitios del fiordo. En el caso de las serretas, durante nuestra estancia probablemente viéramos miles de individuos distribuidos por todo el fiordo. Respecto a la Alondra Cornuda no volvimos a ver ningún ejemplar más. Finalmente, los Págalos Raberos son más frecuentes en la tundra interior que en la costera. La imagen de la derecha muestra un ejemplar fotografiado el día 3 camino de Batsfjord.



02/06/2009

En las proximidades de **Mortensnes Ceavccageadgi** localizamos a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 h) varios **Pardillos de Hornemann** (*Carduelis hornemanni*) en una ladera con abedules de porte mediano (70°07.740' N – 29°02.652' E). Tanto con el telescopio como con los prismáticos tuvimos ocasión de estudiar el aspecto de varios individuos destacando la coloración general del plumaje muy pálida, con el pecho y vientre libre de estrías y una coloración rosa pálida en la zona pectoral patente en algunos individuos. Al rato llegó un grupo de **Pardillos Sizerines** (*Carduelis flammea*), circunstancia que nos permitió comparar diversos aspectos de ambas especies: i) a pesar de la connotación de ave ártica del *hornemanni*, en Varanger *hornemanni* y *flammea* comparten hábitat; ii) la actitud del *flammea* nos pareció más atrevida y confiada, mientras que el *hornemanni* se comportó como un ave más esquiva; iii) el reclamo de ambas especies es distinto, más “áspero” en el caso del *flammea*; iv) reconociendo que en casos puntuales la identificación de algunos ejemplares puede no resultar fácil, en campo es evidente la diferencia del plumaje de ambas especies (en el caso del *flammea* el plumaje es apreciablemente más oscuro, el rojo de pecho y vientre bastante saturado y el contraste del babero negro no es tan claro como en el caso del *hornemanni*, en el que el babero negro destaca muchísimo en relación al resto del plumaje del ave, generalmente muy pálido). Fue la única observación de la especie durante todo el viaje.

Sobre las 10:30 h, rastreando desde la carretera los grupos de patos cercanos a la costa, descubrimos un llamativo macho adulto de **Eider Real** (*Somateria spectabilis*) luciendo el plumaje nupcial en el seno de un pequeño grupo de **Eíderes Comunes** (*Somateria mollissima*). En la foto inferior es apreciable el tamaño algo menor del Eider Real en comparación con los comunes. Fue el único ejemplar de la especie que vimos durante nuestra estancia en Varanger y un ornitólogo francés nos avisó de la presencia de dos jóvenes en la isla de Hornoya. Nuestra observación se produjo en el término de **Vardo** (70°13.459' N – 30°29.192' E).



En el mismo punto en donde localizamos al Eider Real, vimos el primer **Escribano Lapón** (*Calcarius lapponicus*) del viaje en un brezal con montículos y la presencia de sauces enanos. Se trató de una hembra que aún no presentaba los colores “encendidos” típicos del plumaje estival. Unos minutos más tarde, un poco más adelante observamos un macho con plumaje estival volando y reclamando junto a la carretera (70°15.638' N – 30°44.113' E). La fotografía de la derecha refleja el hábitat típico de la especie.



Posteriormente, guiados por una pareja de ornitólogos ingleses con quienes intercambiamos información, conseguimos ver a gran distancia desde la costa un ejemplar adulto de **Colimbo de Adams** (*Gavia adamsii*). Los ingleses nos explicaron que unos 40 minutos antes vieron dos ejemplares adultos bastante próximos a la costa. Localización del punto de observación: 70°15.081' N – 30°38.937' E. Por la tarde regresamos de nuevo al mismo lugar, relocalizando probablemente al mismo ejemplar de la mañana lejos de la costa y viendo también una pareja de **Colimbo Árticos** (*Gavia arctica*) algo más cerca. Al día siguiente ya no conseguimos ver al Colimbo de Adams, pero sí un **Colimbo Chico** (*Gavia stellata*). Curiosamente, en dos días conseguimos ver en el mismo lugar las tres especies de colimbos presentes y habituales en el fiordo.

Por la tarde visitamos la **isla de Hornoya** durante un par de horas (de 13:30 a 15:30 horas) disfrutando del grandioso espectáculo que ofrecen las decenas de miles de aves marinas que crían en la pequeña isla. Tuvimos la ocasión de ver con gran calidad especies como **Cormorán Moñudo** (*Phalacrocorax aristotelis*), **Gavión Atlántico** (*Larus marinus*), **Gaviota Argénteo** (*Larus argentatus*), **Gaviota Tridáctila** (*Rissa tridactyla*), **Arao Común** (*Uria aalge*), **Arao de Brünnich** (*Uria lomvia*), **Alca Común** (*Alca torda*), **Arao Aliblanco** (*Cepphus grylle*), **Frailecillo Atlántico** (*Fratercula arctica*), etc.



Entre los pequeños passeriformes destacar la presencia de varios **Bisbitas Gorgirrojos** (*Anthus cervinus*) – los volvimos a ver dos horas más tarde camino de Hamningberg-, **Bisbitas Costeros** (*Anthus petrosus*) y especialmente el buscado **Pardillo Piquigualdo** (*Carduelis flavirostris*). En este último caso destacar el avistamiento de un par de ejemplares en la ladera del embarcadero, un poco antes de bajar hacia el camino que conduce al faro por la otra parte de la isla. Como esperábamos, el aspecto general del ave fue poco llamativo, pudiendo disfrutar con muy buenas vistas de un macho nupcial reclamando.



03/06/2009

Tras rastrear en varias ocasiones a primera hora de la mañana (6:30 h.) la bahía situada tras el edificio de la biblioteca en la localidad de **Vadso**, finalmente conseguimos localizar el trío de **Eíderes de Steller** (*Polysticta stelleri*) que desde al menos dos días habían observado varios *birdwatchers*. Se trataba de dos machos en plumaje nupcial y una hembra que se encontraban ocultos muy próximos a la orilla alimentándose en el agua y capuzando entre rocas y algas (70°04.454' N- 29°46.951' E). Los estuvimos observando más de 20 minutos viéndolos alimentarse y también “jugar” entre ellos con pequeñas escaramuzas, vuelos cortos, alzado del cuerpo, etc. Se movían de forma independiente en relación a los numerosos Eíderes Comunes presentes en la bahía y cuando estaban juntos resultaba muy llamativa la gran diferencia de tamaño entre ambas especies. A última hora de la tarde relocalizamos de nuevo al trío, esta vez en las proximidades del puente.





En el famoso **km 28 de la carretera 890** ($70^{\circ}26.070' \text{ N} - 28^{\circ}18.911' \text{ E}$), que conduce de Tana Bru a Berlevag, hicimos una parada para intentar ver a la pareja de Halcón Gerifalte que cría por la zona. En el lugar se encontraban varios *birdwatchers* prospectando sin éxito la pared rocosa y comprobando que el clásico nido de la pareja estaba ocupado por cuervos. Mientras charlábamos con un colega irlandés, un **Ratonero Calzado** (*Buteo lagopus*) sobrevoló el acantilado durante breves segundos.

A partir de los últimos 30 km antes de llegar a Batsfjord (**carretera 891**), fueron frecuentes las observaciones de **Págalo Rabero** (*Stercorarius longicaudus*) en las laderas cubiertas de brezo y musgo en la tundra interior, lugar en donde crían varias parejas.



Por la tarde, de regreso al fiordo, prospectamos el bosque de abedules situado a ambos lados de la **carretera E75**, a la altura del límite de la comuna de Unjárga/Nesseby, con la intención de ver **Lagópodo Escandinavo** (*Lagopus lagopus*), especie citada en la zona en algunos *trip reports*. Tras rastrear la zona (bosque de abedul con algunos claros de brezo y musgo) finalmente conseguimos ver un precioso macho posado en la rama alta de un árbol ($70^{\circ}10.777' \text{ N} - 28^{\circ}21.014' \text{ E}$). A pesar de la amplia distribución de la especie por Finlandia y Noruega sólo vimos este ejemplar durante los 20 días de viaje.

Finalmente, a última hora de la tarde vimos y fotografiamos un macho de **Escribano Lapón** (*Calcarius lapponicus*) en el mismo sitio en donde lo localizamos el día anterior.



04/06/2009

Tras dejar Varanger (Noruega), a primera hora de la mañana, de nuevo nos adentramos en Finlandia con el propósito de llegar a Kuusamo al día siguiente. De camino paramos en los comederos de los **hoteles Pohjan Tuli** ($69^{\circ}51.460' \text{ N} - 27^{\circ}00.849' \text{ E}$), 8 km al sur de Utsjoki, y el ya visitado a la ida **Neljan Tuulen Tupa**, en donde avistamos numerosos **Pinzones Reales** (*Fringilla montifringilla*), **Verderones Comunes** (*Carduelis chloris*) y **Pardillos Sizerines** (*Carduelis flammea*).

Desde la misma carretera 4, a unos 8 km al sur de **Ivalo**, vimos durante más de un minuto y relativamente cerca un

ejemplar de **Ratonero Calzado** (*Buteo lagopus*), sobrevolando la misma carretera y los bosques de *Pinus sylvestris* aledaños.

A media tarde (19:20 h) visitamos el lugar que el gerente de la recepción del *Birdwatching Centre* de Peurasuvanto nos indicó muy amablemente unos días de antes, cuando nos dirigíamos hacia el norte, para tratar de ver **Escribano Pígmico** (*Emberiza pusilla*). Transcurridos unos pocos minutos descubrimos un ejemplar adulto con plumaje nupcial cantando y moviéndose por los arbolillos y arbustos a escasa distancia. Tipo de hábitat: bosque de píceas, pinos, sauces y abedules de bajo porte con suelo encharcado cubierto totalmente de musgo. El nombre de la localidad más cercana según el mapa de carreteras es **Kelujärvi**. Localización del lugar: 67°27.615' N – 27°05.014' E).

05/06/2009

En un estanque situado junto a la **carretera 5** a unos 50 km al norte de Kuusamo anotamos una pareja de **Somormujo Cuellirrojo** (*Podiceps grisegena*).

Sobre las 13:00 visitamos el **parking de Konttainen-Valtavaara** (66°12.613' N – 29°13.160' E) obteniendo nuestro primer avistamiento de **Arrendajo Funesto** (*Perisoreus infaustus*). Tuvimos ocasión de ver durante varios minutos a escasa distancia un grupo de al menos 6 individuos pululando por el comedero en actitud sumamente confiada.



A media tarde nos dirigimos a **livaara** prospectando los alrededores del puente de madera situado al pie de la colina en busca de **Escribano Rústico** (*Emberiza rustica*). Tras un buen rato pateando una zona que nos pareció que era representativa de su hábitat (zona abierta de pinar con alguna picea y algún abedul, próxima a un río con sustrato encharcado cubierto por musgo) finalmente encontramos un ejemplar macho oculto en la vegetación y próximo al suelo. Coordenadas geográficas: 65°48.543' N – 29°39.231' E. Hora de la observación: 17:45 h. En el mismo sitio también vimos una **Lavandera Boyera** de la variedad fennoescandinava (*Motacilla flava* subesp. *thunbergi*).

06/06/2009

Entre la 1:45 y las 3:30 h de la noche/madrugada recorrimos lentamente el sendero de acceso a la cima de **livaara** (470 m) tratando de localizar sin éxito **Coliazules Cejiblanco**s a pesar de ser una zona en donde la especie está aquerenciada (probablemente circunstancias como la hora, demasiado temprana, y el frío, día nublado, con 0° C y nieve, explicarían la ausencia de aves). A la bajada, de nuevo conseguimos ver el **Escribano Rústico** (*Emberiza rustica*) en el mismo lugar del día anterior. En la **pista de tierra que comunica livaaara con la carretera 866** apuntamos dos **Gallos de Lira** machos (*Tetrao tetrix*) a las 4:00 h. Sobre las 5:00 h anotamos un **Arrendajo Funesto** (*Perisoreus infaustus*) en la cuneta de la **carretera 5** a 2 km al norte de **Ruka** y una hora más tarde de nuevo nos topamos con el grupo del día anterior en el **parking de Konttainen-Valtavaara**.

Tras una larga noche buscando aves, a las 6:30 h tuvimos la gran fortuna de toparnos con un precioso macho adulto de **Coliazul Cejiblanco*** (*Tarsiger cyanurus*) a unos 25 metros de distancia posado en una rama baja de una gran picea en la **cima de Valtavaara** (66°12.382' N – 29°12.943' E, 380 m). El ave permaneció posada durante unos 20 segundos para después perderse en la espesura del bosque volando entre las ramas bajas de los árboles. Hábitat: bosque maduro de píceas con algún que otro abedul intercalado y sotobosque muy tupido de arándanos.

07/06/2009

Recorrido por la **cima de Valtavaara** entre las 5:00 y 7:00 h buscando principalmente **Coliazules Cejiblanco**s (*Tarsiger cyanurus*) con el siguiente resultado:

I) 5:53 h. Un ejemplar hembra posado en la rama baja de una picea y moviendo la cola. Coordenadas y altitud: 66°12.230' N – 29°12.639' E, 408 m. II) 6:08 h. Un ejemplar macho adulto cantando desde el extremo más alto de la copa de una picea. Grabamos el canto y realizamos alguna foto testimonial. A escasos metros, observamos un segundo ejemplar, en este caso hembra, posado en el suelo. Coordenadas y altitud: 66°12.121' N – 29°12.557' E, 417 m. III) 6:45 h. Un ejemplar macho adulto cantando desde el extremo más alto de la copa de una picea. Coordenadas y altitud: 66°12.115' N – 29°12.549' E, 418 m.



08/06/2009

Antes de abandonar la región de Kuusamo, dimos una última vuelta a primera hora de la mañana anotando una pareja de **Colimbos Árticos** (*Gavia arctica*) a las 6:00 h en el lago situado a la derecha de la carretera un poco antes de llegar al **parking de Konttainen-Valtavaara**. Posteriormente, sobre las 7:15 h, avistamos un **Carbonero Sibilino** (*Parus montanus*) en el comedero del propio parking en compañía de los habituales **Camachuelos Comunes** (*Pyrrhula pyrrhula*) y **Picos Picapinos** (*Dendrocopos major*).

Por la tarde (¡15:55 h!), camino del sector sureste de Finlandia, nos vimos sorprendidos por la aparición de un **Cáрабо Lapón** (*Strix nebulosa*) volando paralelo a la **carretera 6 a unos 50-52 km al norte de Joensuu** (63°01.681' N – 29°42.107' E) durante varios metros antes de internarse en un bosque de píceas, abedules y pinos.



Finalmente, sobre las 20:00 h. en los alrededores de **Vartsilä**, vimos y fotografiamos un macho de **Camachuelo Carminoso** (*Carpodacus erythrinus*) cantando en un seto de árboles entre campos de cultivos (62°13.324' N – 30°37.100' E).

Dormimos en el hotelli Sinilintu en Vartsilä teniendo la fortuna de coincidir con el ornitólogo finlandés Ari Linna, quien nos informó sobre diversas localizaciones de Carricero de Blyth y Guión de Codornices.

09/06/2009

Entre la 1:00 y las 5:00 de la noche/madrugada recorrimos los **alrededores de Vartsilä** buscando algunas de las especialidades propias del sureste de Finlandia. En las proximidades del cruce con la carretera 500, en dirección a Ilomantsi, a la 1:25 h escuchamos varios **Guiónes de Codornices** (*Crex crex*) cantando ocultos en los herbazales cultivados (grabamos una pista con el canto). A pesar de acercarnos sigilosamente a la posición del ave, somos incapaces de verla debido a la oscuridad y a la costumbre que tiene de cantar oculta en la espesura. Sólo conseguimos verla en el transcurso de un vuelo corto (62°12.978' N – 30°36.279' E).

En el mismo punto, oímos cantar y conseguimos ver al menos un par de **Carriceros Políglotas** (*Acrocephalus palustris*) en una mancha de arbustos junto a la cuneta de la carretera.

Durante la noche coincidimos de nuevo con Ari Linna quien nos advierte que acababa de escuchar cantar cerca un **Zarcero Escita*** (*Hippolais caligata*). Amablemente nos condujo al sitio consiguiendo escuchar el reclamo del zarcero entre los sonidos emitidos por los Carriceros Comunes y verlo fugazmente moviéndose entre los arbustos. Ari nos comentó que se trataba del segundo ejemplar que llegaba este año a la zona de Vartsilä y que es probable que se esté formando un pequeño núcleo reproductor de la especie en la zona, lo cual representaría el enclave más occidental de su área de cría en el WP.

Siguiendo las indicaciones de Ari Linna, a las 3:30 h conseguimos localizar un ejemplar de **Carricero de Blyth** (*Acrocephalus dumetorum*) cantando en lo alto de una rama seca junto a un camino con algunos arbolillos (serbales y saúcos) y algunas herbáceas (ortigas y umbelíferas). Con un poco de paciencia, pudimos acercarnos al ave para realizar algunos vídeos y fotografías a pesar de la escasa luz. En ocasiones bajó al suelo o cambió de percha para seguir cantando. Localización del sitio: 62°12.652' N – 30°29.240' E.

Posteriormente, regresamos a las 10:50 h comprobando que en la zona había al menos tres Carriceros de Blyth. También oímos y vimos un ejemplar macho de **Camachuelo Carminoso** (*Carpodacus erythrinus*).

Desde la misma localidad de **Vartsilä** nos dirigimos a una torre de observación cercana, denominada **Luontotorni Hopeakallio** (62°12.153' N – 30°37.282' E), desde donde disfrutamos con las excelentes vistas del valle de Vartsilä (ver foto) y también localizamos al menos dos **Carriceros de Blyth** (*Acrocephalus dumetorum*) ocultos en las copas de unos arbolillos (*Sorbus* sp. y *Alnus* sp.) situados al pie de la mismísima torre (óvalo amarillo en la foto inferior derecha).



A media mañana llegamos a la localidad de **Imatra**, en donde el día anterior un *birdwatcher* finlandés nos había advertido que podíamos ver Papamoscas Papirrojo y Mosquitero Troquiloides. El sitio se encontraba en la confluencia de la "calle" Liippilahdentie con una pista reservada para ciclistas y viandantes junto a unas píceas altas y más o menos a 1 km de distancia del río. Con esta descripción conseguimos encontrar el lugar exacto que resultó ser una pista de tierra que atravesaba una densa masa forestal en la que confluía por la izquierda una pista más estrecha con una señal de carril reservado para bicicletas y paseantes. Nada más llegar al sitio (sobre las 12:15 h) escuchamos el canto de un **Papamoscas Papirrojo** (*Ficedula parva*) al que no conseguimos ver en un principio debido a la espesura del bosque. Creyendo que se encontraba en la parte alta de la copa de los árboles, nos sorprendió verlo moverse por el estrato arbustivo bajo del bosque e incluso entre los troncos viejos caídos en el propio suelo. Se trató de un ejemplar que identificamos como un macho de segundo verano al presentar la cabeza de color pardo y la garganta de color anaranjado. Habitat: bosque relativamente complejo en cuanto a su estratificación con píceas y abedules en el estrato arbóreo; *Sorbus* sp., *Rubus* sp. y *Acer* sp. en el nivel arbustivo y algunos helechos en el herbáceo (61°13.259' N – 28°47.129' E).

Posteriormente, muy cerca del punto anterior, localizamos un **Mosquitero Troquiloide*** (*Phylloscopus trochiloides*), justo en el sitio en donde nos habían advertido que algún macho de la especie había estado cantando unos días antes, cantando en el ápice de la copa de una de las píceas. Con el telescopio disfrutamos de excelentes vistas del pájaro apreciando algunos detalles como la marcada ceja (cuando mira de frente parece que lleva una especie de corona) y la banda alar clara. Hábitat similar al descrito para el Papamoscas Papirrojo. Coordenadas: 61°13.217' N – 28°47.200' E.

11/06/2009

De madrugada prospectamos el **SE de Helsinki** ("calle" Vuontie, a unos 800 m del camping Rastila) tratando de localizar sin éxito Buscarla Fluvial. No obstante, identificamos un **Carricero de Blyth** (*Acrocephalus dumetorum*) en un bosque de *Alnus* sp.; *Sorbus* sp.; *Betula* sp.; *Acer* sp. y *Picea abies*. Coordenadas y hora de la observación: 60°12.624' N – 25°07.070' E. 6:15 h. Posteriormente en las inmediaciones del **camping Oittaa** oímos y vimos un ejemplar joven de **Camachuelo Carminoso** (*Carpodacus erythrinus*).

12/06/2009

Desde una de las playas de **Hanko** observamos una hembra de **Serreta Grande** (*Mergus merganser*) con 10 pollos nadando cerca de la costa y varios **Eíderes Comunes** (*Somateria mollissima*) descansado en las orillas.

GALERÍA DE FOTOS



Porrón Osculado, macho



Porrón Osculado, hembra



Cisne Cantor



Ostrero Euroasiático



Zarapito Real



Gaviota Cana



Zorzal Real



Camachuelo Común, macho



Camachuelo Común, hembra



Corneja Cenicienta (superior). Escribano Cerillo (derecha)



Monte Kiilopää, 30-mayo-2009



Franja ecotónica taiga-tundra, 1-junio-2009



Ciénaga de Petkula, 30-mayo-2009



Fiordo de Varanger, 3-junio-2009



Iglesia de Nesseby, 3-junio-2009



Puente de Iivaara, 5-junio-2009



Parque Natural de Oulanka, 7-junio-2009



Siikalahti 9-junio-2009



Renos en Laponia ...

ESPECIES DE MAMÍFEROS VISTAS DURANTE EL VIAJE

Liebre Común (*Lepus capensis*); **Liebre Variable** (*Lepus timidus*); **Ardilla Común** (*Sciurus vulgaris*); **Rata Almisclada** (*Ondatra zibethicus*); **Zorro Común** (*Vulpes vulpes*); **Foca Gris** (*Halichoerus grypus*); **Reno** (*Rangifer tarandus*).