

Viaje Ornitológico a Kuwait y Georgia 2011

César Bermejo y Javier Portillo

Durante el otoño de 2010, César Bermejo y Javier Portillo planteamos hacer un viaje ornitológico a Kuwait, que después pensamos extender hasta Georgia, aprovechando que al caer el festivo 1 de mayo en domingo, la fiesta pasaba al lunes, lo que nos daba más tiempo para estar en Georgia. Así estaríamos seis días completos en Kuwait, y tres días y medio en Georgia. El viaje se lo planteamos a más amigos, pero al final no se decidió ninguno de ellos, por lo que fuimos César y yo solos.

Kuwait es un destino ornitológico reciente, y parece ser que cada vez más frecuentado, por estar en el límite oriental del Paleártico Occidental, y ser una importante ruta migratoria de aves, además de tener importantes concentraciones de aves marinas. El problema es que muchos de los lugares para ver aves en este pequeño país son de acceso restringido, y hay que acudir con guía. La teoría dice que en una segunda visita, quien dirige esa zona controla la matrícula de tu coche y te deja entrar. Sin embargo, nuestra experiencia al respecto, indica que nada de apuntar matrícula, sino que dando una propina al salir, te suelen volver a dejar entrar. Uno de los lugares visitados, Zour Port, sí que es bastante difícil de acceder, puesto que hay que dejar el nombre de los visitantes y los números de las matrículas. Otro problema es que algunos de los lugares (Al Abra q por ejemplo), son difíciles de encontrar una primera vez, y otros, como Abdali Farms son lugares muy extensos y las aves que hay que localizar (en este caso el **Tordalino Afgano** (*Turdoides (caudata) huttoni*)), están en una pequeña área, lo que aconseja buscarlo con guía.

Estas visitas con guía pueden ser en su vehículo, o más barato si le sigues en tu propio vehículo.



César buscando pájaros de montaña en Kazbegi
Kazbegi, Georgia, Abril 2011
2011 2011 © Javier Portillo Javier Portillo

ALQUILER DE COCHE

En Kuwait es fácil alquilar un coche en el aeropuerto, haciéndolo previamente por Internet. Se aconseja un todo terreno, cuatro por cuatro, pues en algunas ocasiones hay que ir por el desierto. Pero el alquiler no es caro, y el combustible es muy barato. Así nosotros alquilamos un Hyundai Santa Fe, automático por 485 euros los 7 días. El tanque de combustible lo llenábamos, unos 52 litros, por unos 8 euros.

En Georgia costó algo más alquilar el coche, pues no hay muchas empresas en el aeropuerto de Tbilisi, aunque tampoco es muy caro. Alquilamos un Ford Focus, automático también por 220 euros. La gasolina es más barata que en España, unos 80 céntimos el litro. Pero fuera de la capital (donde hay muchísimas gasolineras), en otros lugares son más bien escasas. De hecho, la ruta normal va a Kazbegi, en el Cáucaso, donde sí que hay gasolinera, aunque te tienen que llevar hasta ella, pues el establecimiento parece de todo salvo una gasolinera.



Gasolinera de Kazbegi
Kazbegi, Georgia, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

ALOJAMIENTO

Los hoteles en Kuwait son caros, salvo algunos que tienen precios razonables. En los reportajes citan algunos como asequibles, como por ejemplo, el Husa House Hotel o el Continental. Nosotros nos quedamos en el IBIS SHARQ, que costaba unos 71 euros la habitación doble. Es un hotel muy recomendable, pues el acceso es muy sencillo, tanto desde el aeropuerto como de las carreteras principales, está bien, y sobre todo, tienen el desayuno disponible, tipo buffet, a cualquier hora de la noche. A partir de las 6 de la mañana hay un buffet extenso, por 4 KD por persona (unos 9 euros), pero antes hay otro más sencillo, aunque suficiente para desayunar muy bien, por sólo cinco euros. Las primeras noches cenamos en el hotel, pero era más barato y mucho mejor la cena en el restaurante hindú Mughal Mahal, a unos 50 metros, donde cenábamos muy bien por unos 9 euros cada uno. La cerveza parece muy difícil de encontrar.

En Georgia nos quedamos en el Hotel STEPANTSMINDA de esa localidad, antes llamada Kazbegi, en el Cáucaso, por unos 34 euros la noche, y en media pensión 60 euros. Y en Tbilisi en el Golden Palace, un buen hotel con nombre horrible, apariencia espantosa, pero bueno y muy bien situado al lado de una carretera principal a las afueras de la capital. En Kazbegi había desayuno y cena pagando, pero ambos eran baratos y buenos. Y en Tbilisi no tenían cenas, pero sí desayunos si los pedías. Sin embargo, las cenas las hacíamos en un restaurante al otro lado de la carretera, bastante bueno. Allí, por escaso dinero se podía tomar una especie de pizza tradicional georgiana, y cerveza buena, si bien no georgiana.



Javi en Kuwait City
Kuwait City, Kuwait, Abril 2011
2011 © César Bermejo

MAPAS

En Kuwait venden mapas muy buenos y con bastante detalle pero las librerías son escasas. Sin embargo, en Georgia, en el aeropuerto hay una oficina de turismo frente a las empresas de alquiler de coches, donde ofrecen gratis mapas de Georgia y de las diferentes regiones, con los que ya es fácil moverse por el país.

En Kuwait las comunicaciones son sencillas, el país es pequeño y las carreteras son buenas. Ocurre todo lo contrario en Georgia, donde además hay muy pocas señalizaciones en las carreteras, y si preguntas a la gente te responde amablemente en ruso.

LUGARES VISITADOS PARA VER AVES

KUWAIT

AL ABRAQ AL KHABARI: Granjas cerca de la frontera con Arabia Saudí, a las que se llega por la carretera que se dirige hacia el sur, hacia Arabia Saudí. Pasado el km 41, unos dos después del cartel que pone SALMI 60 km, hay una carretera que sale hacia la derecha; allí mismo, en el cruce, hay un puesto al lado de una jaima donde se puede comprar agua fría, galletas... a buen precio. Se coge esa carretera de la derecha, y hay que hacer 31 km más, donde se ve una pequeña duna que discurre perpendicular a la carretera, por donde hay unas rodadas en el desierto que hay que coger. Avanzando 2 kilómetros ya se ve la frente muy lejos la silueta de los árboles de la granja, a la que se llega después de 9 km por el desierto. La entrada está marcada por unos bidones de colores, Hay que tener cuidado al salir y fijarse en alguna señal cuando se ha entrado pues no hay rodadas al principio de la senda que se ha de coger.

Hay tierras de labor donde había muchas lavanderas, bisbitas, algunos limícolas, y arbolillos alineados en el desierto que atraían a muchas especies; eran muy buenas las hileras de acacias. El problema del lugar, que ya citan algunos reportajes, es que es una zona en la que se caza mucho, fuera de la granja, indiscriminadamente todo tipo de aves, muchas de las cuales se ven muertas o heridas. Pero aun así, hay muchos bichos por la zona.

El nombre citado es el de la granja, Al Abraq corresponde a la extensa zona de desierto donde se encuentra, pero por abreviar utilizaremos siempre dicha denominación.



Hipocolio (*Hypocolius ampelinus*)
Al Abra, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

ABDALI FARMS: Extensas granjas y zonas de cultivo cerca de la frontera con Iraq, al norte del país. Es el lugar de cría del **Tordalino Afgano** (*Turdoides (caudata) huttoni*), aunque se supone que cada año cambia su ubicación por lo que es recomendable acudir con guía.

PIVOT FIELDS: Granjas y cultivos en el centro del país, al norte de KUWAIT CITY. Se entra a partir de las 8 de la mañana, y parece ser que a las doce las cierran. La visita está permitida, aunque a la entrada controlan a quien entra; nos dijeron que debes enseñar los prismáticos para que te dejen entrar. También aquí se caza.

Para llegar hay que ir por la carretera que va hacia el oeste, la 6ª avenida, que al final gira hacia el norte hasta el km 22, en que a la derecha sale un ramal que gira 180 grados para atravesar un túnel por debajo de la autovía coger otra carretera; giras en el primer cruce a la derecha y avanzas hasta una rotonda, en la que hay que coger la carretera del frente. La carretera gira hacia la derecha, después a la izquierda, y unos dos kilómetros más adelante, tras un badén en la carretera está a la entrada justo a la izquierda.

Las mejores zonas están, según se entra, unos metros más adelante, se encuentran unos grandes depósitos de hormigón, y pasados éstos hay una pista que vas hacia la derecha; un poco después hay unas grandes charcas cercadas que tienen unos cocodrilos, donde estaban los **Basora** (*Acrocephalus griseldis*) y otras aves, y en los campos cultivados detrás había muchas aves.

ZOUR: Puerto en el sur del país, de acceso muy restringido, solo con guía; es como una instalación grande, con viviendas, almacenes, un campo de golf, eriales, etc., y una gran playa. Desde la playa se ven charranes y cormoranes y en el campo de golf, que es un desierto se puede ver entre otros **Gorrión Pálido** (*Carpospiza brachydactyla*) y **Camachuelo Desertícola** (*Rhodospiza obsolata*), del que vimos la primera especie.



Alzacola (*Cercotrichas galactotes familiaris*)

Zour, Kuwait, Abril 2011

2011 © Javier Portillo

SHARQ: Puerto de ese nombre en esa zona de Kuwait City, muy bueno para charranes, en las plataformas de fuera también para **Cormorán de Socotra** (*Phalacrocorax nigrogularis*), y los jardines buenos también para migrantes.



Sharq Port
Kuwait City, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

GREEN ISLAND: Península artificial en Kuwait City, arbolada, muy frecuentada por los kuwaitíes para pasear, pero también aprovechada por los pájaros en las migraciones. Hay un lago en el centro, de poco interés, así como poco interesante es la zona que está detrás del lago. Son buenos los arbustos que hay a ambos lados de la entrada, quizás mejores los de la derecha. Hay que pagar por entrar (medio KD), y la entrada es desde las 8 de la mañana y toda la tarde. Es quizás el mejor lugar para el **Hipocolio** (*Hypocolius ampelinus*) y para muchos migrantes.

JAHRA FARMS. Granjas en la localidad de Jahra, granjas tradicionales, el único lugar donde cría el **Bank Myna** (*Acridotheres ginginianus*), y hay más migrantes, además del **Martín Pescador de Esmirna** (*Halcyon smyrnensis*). Entrada libre.

JAHRA POOLS: Marismas en la localidad de Jahra, cogiendo un desvío que pone la camping, estando al entrada cerca de la rotonda que allí se encuentra. Teóricamente es de acceso restringido, pero creo que pueden entrar cualquiera. Al salir se debe dar una propina, medio o un dinar.

La pista de acceso siguiendo recto tiene un mirador elevado, buen lugar para ver algunas especies, y siguiendo hacia adelante cogiendo la primera desviación a la derecha se encuentra uno frente a un carrizo y una canal; se para ahí el coche y es buen lugar para polluelas y **Carricero De Basora** (*Acrocephalus griseldis*). Pero por la pista de acceso, se coge la primera desviación a la izquierda, se llega tras unas vueltas a otro lugar en una curva hacia la derecha, bueno para polluelas y limícolos.



Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)
 Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011
 2011 © Javier Portillo

MANCHESTER CLUB: Es una planicie costera muy degradada, desde donde se ve una superficie de la bahía de Kuwait que, en pleamar queda cerca de la orilla de forma que se ven bien los limícolas. El acceso es sencillo desde la carretera costera cerca de Jahra, girando hacia la derecha según vas hacia el oeste cuando pone KUWAIT FALCON HOSPITAL; de allí, primero a la derecha por una calle y después a la izquierda ya por el campo degradado, se llega al lugar desde el cual mirar.

DOHA: Varios puestos para ver la bahía de Kuwait desde las orillas, desde donde se ven muchos limícolas. No recuerdo los accesos.

GEORGIA

KAZBEGI: El pueblo, que ahora se llama Stepantsminda, está en un valle rodeado de montañas. La carretera que nos ha traído desde Tbilisi, lleva a Rusia en unos kilómetros, y divide el pueblo en dos. Según se venía, a la izquierda está el monasterio de Sumeba, con sus montañas, y a la derecha las montañas Kuro, más interesantes.

Al monasterio se puede subir por una pista que pasa por el pueblo de Gergeti, y puedes ir andando o en 4X4 que te ofrecen a la puerta o en el hotel. Desde allí todo es paisaje de alta montaña, aunque poco rocoso, más bien son puertos de montaña.

Y los montes Kuro, que en los reportajes recomiendan más, parecen más productivos para las especies emblemáticas. En lo alto del pueblo se ven unas antenas, hasta donde se puede llegar en un coche normal, y desde allí ya se escuchaban los **Perdigallos Del Cáucaso** (*Tetraogallus caucasicus*). Allí se ve una gran ladera empinada con una capilla cerca de la base. Ese parece ser el lugar de los perdigallos. Hacia la derecha se ve una gran morrena por la que se puede caminar y subir, y desde allí localizábamos con facilidad más perdigallos. En el extremo derecho de la morrena citaban las otras especies, pero ahora, al estar la nieve muy alta, no se veían. Y cerca del río, hay masas de arbustos donde también se ven los pájaros cuando baja mucho la nieve.

A la izquierda de la gran ladera con la capillita, va una pista que discurre sobre un pinar (bueno para el mosquitero verde cuando ha llegado); y siguiendo la pista nos acerca a dos torrenteras que nos impiden seguir caminando, que es donde acaban cualquier signo de pista o camino. Pero desde allí se ven muchas laderas, en una de la cuales, bastante altos estaban los pájaros que buscábamos.

En el mismo Kazbegi, al lado del Hotel Stepanstmindia, hay un parquecillo bueno para pájaros en migración.

KASTOVY PASS: Lo citan como bueno para ver gallo lira. Nosotros parábamos en espacios sin nieve en la subida desde el norte, y había muchos pájaros alpinos, aunque **Gallos Lira Caucásico** (*Lyrurus mlokosiewiczi*) no vimos. La ladera sur parece bastante peor.

CASTILLO DE ANANURI: Bajo él hay una gran extensión de río, que en los reportajes citan como buenos para acuáticas (ahora no había nada). Y unos dos Km hacia Tbilisi, nada más pasar un puentecillo, hay una especie de parque con senderos y cabañas, a la derecha de la carretera, entra viejas hayas, lugar bueno para pájaros. El parque se encuentra en el punto N42 09 08.1, E44 44 00.2.

LAGO LISI: A las afueras de Tbilisi, fácil de llegar desde el centro. Está rodeado de carrizo y muy visitado por pescadores. Buen lugar para aves acuáticas.



Papamoscas Papirrojo (*Ficedula parva*)

Lago Lisi, Georgia, Abril 2011

2011 © Javier Portillo

LAGO BAZALETI: Cerca de la carretera que lleva a TBILISI, se ve bien desde las orillas. Había patos y fumareles.

RECORRIDO

21-IV-11.-Salimos de Madrid vía Estambul, para llegar ya muy tarde a Kuwait, donde nos espera la sorpresa de que nos adelantan la hora de la cita con nuestro guía, lo que nos permitirá dormir muy poco tiempo. Contar con un guía es necesario pues hay muchos lugares donde el acceso está restringido, aunque en una siguiente visita ya se permite la entrada.

22-IV-11.- Así pues, quedamos muy pronto para ir a Al Abraq, una granja en medio del desierto cercano a Arabia Saudí, lugar muy bueno para la observación de migrantes. En el cruce, donde había algunos árboles había un **Alcaudón Turquestano** (*Lanius (isabellinus) phoenicuroides*), que mató un coche.

Una vez en Al Abraq, había muchos bichos. Vimos **Zarcero Pálido Oriental** (*Hippolais pallida*), **Zarcero De Upcher** (*Hippolais languida*), **Gorrión de Garganta Amarilla** (*Gymnoris xanthocollis transfuga*), **Petirrojo Gorgiblanco** (*Irania gutturalis*), **Alcaudón Isabel** (*Lanius isabellinus*) (hay tres formas, en algunos lugares considerados diferentes especies, que veríamos abundantemente), **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*) y **Capirotada** (*S. atricapilla*), **Lavandera Boyera** (*Motacilla flava*) (de las subespecies beema, feldeg y lutea), también una

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*), muchos Bisbitas Gorguirrojos (*Anthus cervinus*) y algunos Arbóreos (*A. trivialis*), Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*), Alzacola (*Cercotrichas galactotes familiaris*), mosquiteros, Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*) (de la subespecie nominal, los *samanisicus* han pasado hace unas semanas), Abejaruco Común (*Merops apiaster*) y Persa (*M. persicus*). Rapaces había pocas, un Aguilucho Papialbo (*Circus macrourus*), uno Lagunero (*C. aeruginosus*), un Ratonero de Estepa (*Buteo buteo vulpinus*) herido, y varios gavilanes, entre los cuales había como más interesante dos gavilanes Gavilán Chikra (*Accipiter badius*).

Otros grupos vieron Guión de Codornices (*Crex crex*) y Curruca Gavilana (*Sylvia nisoria*).

De allí fuimos a las Jahra Farms, el único lugar en el Paleártico donde nidifica el Bank Myna (*Acridotheres ginginianus*), un ave introducida, además de algunos otros migrantes, como Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*), más Alcaudones Turquestanos (*Lanius isabellinus phoenicuroides*), Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*), Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*), Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*), Petirrojo Gorgiblanco (*Irania gutturalis*). Y como propios del lugar vimos Martín Pescador de Esmirna (*Halcyon smyrnensis*), Tortolilla Rabilarga (*Oena capensis*) y Bulbul Cariblanco (*Pycnonotus leucogenys leucotis*), ave muy frecuente por todo el país.

Y cerca, visitamos las Jahra Pools, unas lagunas rodeadas de carrizo, donde observamos Avefría Coliblanca (*Vanellus leucurus*), unos 100 Falaropos Picofinos (*Phalaropus lobatus*), Águila Moteada (*Aquila clanga*), las tres especies de polluelas, todas bastante confiadas, y como más interesante, un Carricero De Basora (*Acrocephalus griseldis*), una de las estrellas orníticas del país, ave que se ve en paso con regularidad en esta época. Otras especies presentes eran Andarrios Chicos (*Actitis hypoleucos*) y Andarrios Bastardos (*Tringa glareola*) (estos últimos muy abundantes y confiados en toda lagunilla), Morito (*Plegadis falcinellus*), Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*), Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*) (el único fumarel que vimos en Kuwait), Correlimos Menudo (*Calidris minuta*) y Zarapitín (*C. ferruginea*), y muchas lavanderas de las subespecies citadas.

Cansados fuimos a dormir, pues al día siguiente había que madrugar de nuevo.

23-IV-11.- Esta vez íbamos a ir a Abdali Farms, otra granja en el norte, muy cerca de la frontera con Iraq. Este es el único lugar del Paleártico donde cría el Tordalino Afgano (*Turdoides caudata huttoni*), que buscamos intensamente, para ver finalmente muy bien y por tiempo prolongado. Vimos pocos pájaros más, algún Alzacola (*Cercotrichas galactotes familiaris*), más Bulbules Cariblanco (*Pycnonotus leucogenys leucotis*), y en los campos había muchos grandes lagartos de cola espinosa, además de un agama de garganta azul.

De camino hacia el sur, paramos en una playa frente a la isla de Bubián, lugar de nidificación de varias interesantes especies, de las que vimos Droma Cangrejero (*Dromas ardeola*) y Garcetas Dimorfas (*Egretta gularis*), ambas a bastante distancia.

Las siguientes paradas las haremos en varios puntos de la bahía de Kuwait, concretamente Manchester Club, y Doha, para ver las concentraciones de interesantes especies de limícolas. Lo primero que vimos fueron Andarrios del Terek (*Xenus cinereus*), de los que quizás había unos 300 ejemplares. También había unos 30-40 Chorlitejo Mongol Grande (*Charadrius leschenautii*), un número similar de Correlimos Falcinelo (*Limicola falcinellus*), y sobre todo, un número que nuestro guía había calculado de unos 1100 ejemplares de de Chorlitejo Mongol Chico (*Charadrius mongolus*). En Manchester Club y otros lugares había grandes concentraciones de Gaviota Pícolina (*Larus genei*), y en Doha también vimos una Gaviota Cáspica (*Larus cachinans*). Ese día vimos en un espigón, un macho de Collalba Pía (*Oenanthe*

pleschanka), que dicen que hace algunas semanas había por cientos. Y vimos un **Prinia** (*Prinia gracilis irakensis*), ave que no es muy frecuente.

Al atardecer fuimos al Puerto de Sharq, muy cerca de donde nos hospedábamos, lugar bueno para ver charranes. En algunas plataformas fuera del puerto veríamos varios **Charránes Crestados** (*Sterna bergii*), y un **Cormorán de Socotra** (*Phalacrocorax nigrogularis*), además de otras especies. Además había **Charrancitos** (*Sterna albifrons*), **Charrán Patinegro** (*Sterna sandvicensis*), y en los campos segados había pájaros en migración como lavanderas, **Bisbitas Arbóreos** (*Anthus trivialis*) y **Gorguirrojos** (*A. cervinus*), además de un confiado **Roquero Rojo** (*Monticola saxatilis*).

24-IV-11.- Pronto por la mañana fuimos al puerto de nuevo, donde, además de las aves del día anterior, vimos varios **Charránes Árábigos** (*Sterna repressa*) pescando muy cerca, y después vamos a Green Island, una península artificial en el mismo Kuwait City, lugar arbolado muy frecuentado por los kuwaitíes para pasear y por las aves en sus migraciones. Nosotros íbamos con la esperanza de ver el **Hipocolio** (*Hypocolius ampelinus*), que algunos días antes se había visto aunque se decía que ya era un poco tarde para la especie. Nada más entrar vimos un **Hipocolio** (*Hypocolius ampelinus*), dos, tres, ¡SIETE!, preciosos y confiadísimos. También vimos más alcaudones tipo isabel, **Bulbul de Vientre Rojo** (*Pycnonotus cafer*), **Curruca Gabilana** (*Sylvia nisoria*), etc. También hay por la zona un tejedor, y vimos además **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*), **Tórtola Turca** (*Streptopelia decaocto*) y **Senegalesa** (*Streptopelia senegalensis*), **Bulbul Cariblanco** (*Pycnonotus leucogenys*), **Alcaudón Turquestano** (*Lanius (isabellinus) phoenicuroides*), volaba una **Garza Imperial** (*Ardea purpurea*), y en la playa había **Correlimos Zarapitín** (*Calidris ferruginea*) en plumaje nupcial, una **Garcilla Cangrejera** (*Ardeola ralloides*), una **Gaviota Picofina** (*Larus genei*), y una hembra de **Collalba Pía** (*Oenanthe pleschanka*).

De allí vamos a ir todos los grupos hacia el sur, aunque al llegar nos ponen los dientes largos pues han estado varios en otras granjas, los Pivot Flds observando **Escribano Cabecigrís** (*Emberiza buchanani*), **Águila Imperial** (*Aquila heliaca*), **Carricero De Basora** (*Acrocephalus griseldis*) y las dos especies de canasteras.

La primera parada la haremos en el puerto de Falahel donde había **Charrán Árábigo** (*Sterna repressa*) y algunos **Embridados** (*Onychoprion anaethetus*) posados en las plataformas.

El sur, la carretera que va hacia Arabia Saudí nos lleva a un puerto, Zour, donde vemos otro **Cormorán de Socotra** (*Phalacrocorax nigrogularis*) y **Charranes Embridados** (*Onychoprion anaethetus*) muy lejanos, además de **Charrán Bengalí** (*Sterna bengalensis*), **Pagaza Piquirroja** (*Hydroprogne caspia*) (especie muy abundante, por ejemplo en Doha). En los jardines de una casa cercana vemos dos **Roqueros Rojos** (*Monticola saxatilis*), un **Alzacola** (*Cercotrichas galactotes familiaris*) muy confiado, y varios mosquiteros. Y en una especie de campo de golf que hay en el desierto (el green brilla por su ausencia), buscamos con éxito un grupo de **Gorriones Pálidos** (*Carpospiza brachydactyla*), bastante confiados. Además, en la misma zona seca se ven **Alcaudón Turquestano** (*Lanius (isabellinus) phoenicuroides*) e **Isabel** (*L. isabellinus*) (Daurian en las guías inglesas), **Collalba Pía** (*Oenanthe pleschanka*), **Torcecuello** (*Jynx Torquilla*)...

Es entonces cuando empieza a circular la noticia de que debe de haber algún **Charrancito de Saunders** (*Sternula saundersi*) en el puerto de Sharq.

25-IV-11.- Pronto por la mañana vamos a Sharq, donde vemos y fotografiamos los charranes en busca del Saunders; también van los siguientes grupos, pero nadie consigue asegurar que lo sea.

Ahora sí que iremos a Pivot Fields, a buscar el escribano; llegamos pronto y ya estaban allí casi todos los grupos buscándolo. Vemos canasteras, entre las cuales hay alguna **Alinegra** (*Glareola nordmanni*), dos **Chorlito Asiático Chico** (*Charadrius asiaticus*), varios **Carriceros De Basora** (*Acrocephalus griseldis*) en una lagunilla, y un **Gorrión Dorado Sudanés** (*Passer luteus*), probablemente un escape, pero nadie localiza al escribano. También vemos una **Terrera Común** (*Calandrella brachydactyla*), varias **Cogujadas** (*Galerida cristata*), **Alcaudones Común** (*Lanius sanator*) y **Núbico** (*L. nubicus*), las dos especies de abejaruco, el único **Bisbita Campestre** (*Anthus campestris*) del viaje, muchas lavanderas y **Bisbitas Gorguirrojos** (*Anthus cervinus*), **Águila Calzada** (*Hieraaetus pennatus*), **Aguilucho Lagunero** (*Circus aeruginosus*)...

De allí iremos a las charcas de Jahra donde hay más polluelas que el día anterior, y volvemos a ver la **Avefria Coliblanca** (*Vanellus leucurus*), y un **Águila Culebrera** (*Circaetus gallicus*).

Acabamos en el puerto donde veremos otro **Cormorán de Socotra** (*Phalacrocorax nigrogularis*), **Charrán Crestado** (*Sterna bergii*), **Patinegro** (*Sterna sandvicensis*), **Arábigo** (*S. repressa*), **Charrancito** (*Sternula albifrons*), y en los campos vemos algún **Bisbita Común** (*Anthus pratensis*).

26-IV-11.- Al día siguiente volvemos a los Pivot Fields, donde veremos por tiempo prolongado y en muy buenas condiciones la **Canastera Alinegra** (*Glareola nordmanni*), vemos las tres formas del alcaudón tipo Isabel (sobre todo una muy bien Karelini), además de **Alcaudón Dorsirrojo** (*Lanius collurio*), **Núbico** (*L. nubicus*) y **Común** (*L. senator*), observamos varios **Escribanos Cabecinegros** (*Emberiza melanocephala*), y **Hortelanos** (*E. hortulana*).

Y nos vamos a Al Abra, la granja en medio del desierto donde empezamos el viaje. De camino vemos un **Milano Negro** (*Milvus migrans*) de su forma oriental, con manchas blancas patentes bajo el ala. Cuando estamos llegando llega un mensaje de nuestro guía diciendo que allí están viendo tres **Zarceros De Sykes** (*Iduna rama*), lo cual aumenta nuestros nervios por llegar. Llegamos, buscamos intensamente, pero no los vemos. Eso sí, vemos más currucas **Curruca Gavilanas** (*Sylvia nisoria*) y **Zarcerillas** (*S. curruca*), **Zarceros Pálidos Orientales** (*Hippolais pallida*), tres **Hipocolios** (*Hypocolius ampelinus*) y otras muchas especies, pero no los que buscamos. Cuando nos movemos hacia otra zona de la misma granja, nuestro guía nos avisa de unos arbustos donde han visto **Curruca De Hume** (*Sylvia athaea*), que buscamos pero también sin éxito; allí vemos **Ruiseñor Ruso** (*Luscinia luscinia*), **Guión de Codornices** (*Crex crex*) en el desierto entre arbustos, **Gorrión de Garganta Amarilla** (*Gymnoris xanthocollis transfuga*) y otros cuantos pájaros, entre otros una **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*) de la subespecie blythii, con el diseño de la cabeza que recuerda la del **Alcaudón Dorsirrojo** (*Lanius collurio*). Un tiempo después, localizamos una **Curruca Desértica Asiática** (*Sylvia nana nana*), que se deja ver muy bien, y que contemplamos con un grupo de finlandeses que han llegado para buscar el Sykes. Ya somos seis a buscar, pero de nuevo no tenemos éxito.

Otras especies que vamos a ver este día serán **Garcetas Comunes** (*Egretta garzetta*), **Alcaudón Dorsirrojo** (*Lanius collurio*), **Morito** (*Plegadis flacinellus*), las dos especies de abejaruco, **Ratonero De Estepa** (*Buteo buteo vulpinus*), **Curruca Zarquera** (*Sylvia communis*) y **Capirotada** (*S. atricapilla*), **Carraca** (*Coracias garrulus*), **Mosquitero Musical** (*Phylloscopus trochilus*), **Colirrojo Real** (*Phoenicurus phoenicurus*)...

En el desierto, a la vuelta, vemos una **Collalba Gris** (*Oenanthe oenanthe*), posiblemente de la subespecie groenlandesa.

27-IV-11.- Volvimos pronto a Al Abra, y de camino vemos un **Milano Negro** (*Milvus migrans*) de su forma oriental, con manchas blancas patentes bajo el ala. También de camino vemos

un **Cernícalo Vulgar** (*Falco tinnunculus*), y una **Alondra Ibis** (*Alaemon alaudipes doriae*). Vamos a buscar de nuevo el Sykes, lo que al final conseguimos, además de **Carricero Estentóreo** (*Acrocephalus stentoreus*), y lo demás eran las aves de costumbre, con la única novedad de que llegaban las **Tarabillas Norteñas** (*Saxicola rubetra*), y volvimos a ver un **Guión de Codornices** (*Crex crex*). Este día había bastante menos pájaros en paso. También vimos **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*), **Zarcero Pálido Oriental** (*Hippolais pallida*), **Colirrojo Real** (*Phoenicurus phoenicurus*), varios **Carriceros Tordal** (*Acrocephalus arundinaceus*), **Escribano Hortelano** (*Emberiza hortulana*), **Alcaudón Turquestano** (*Lanius isabellinus*) *phoenicuroides*), **Gavilán Común** (*Accipiter nisus*)...

Después fuimos a las lagunas de Jahra pools, donde hay muchos correlimos, varios **Comunes** (*Calidris alpina*) en plumaje nupcial, así como **Zarapitines** (*C. ferruginea*), muchos **Combatientes** (*Philomachus pugnax*), **Chorlitejos Grandes** (*Charadrius hiaticula*), **Agujas Colinegras** (*Limosa limosa*), **Cigüeñuelas** (*Himantopus himantopus*) (ha habido un grupillo todos los días), y hay también un **Archibebe Fino** (*Tringa stagnatilis*). Polluelas solo vemos tres **Pintojas** (*Porzana porzana*), y otro alcaudón karelini.

En Manchester Club, vemos flamencos (todos los días los ha habido), **Gaviotas Picofinas** (*Larus genei*), **Zarapitos Reales** (*Numenius arquata*) (como otros días)

Y ya tarde vamos a ir a la Green Island, donde han visto estos días una **Curruca de Hume** (*Sylvia althaea*), la que vemos muy bien, así como varias **Curruca Mirlonas Orientales** (*Sylvia crassirostris*). Como novedad también vemos un posible **Mosquitero Común Siberiano** (*Phylloscopus collybita trsitis*), y volvemos a ver las especies habituales como los dos bulbules, **Alcaudones Núbico** (*Lanius nubicus*) y **Turquestano** (*Lanius isabellinus*) *phoenicuroides*), **Escribano Hortelano** (*Emberiza hortulana*), **Tórtola Senegalesa** (*Streptopelia senegalensis*), **Vencejo Pálido** (*Apus pallidus*)...

Esa fue nuestra despedida de Kuwait, país que nos ha sorprendido por la cantidad y variedad de sus aves, así como la facilidad para viajar por este país, lo mismo que sus precios, lo que lo hace un viaje muy asequible.

GEORGIA

Volvimos a Estambul, desde donde íbamos a coger un vuelo que nos llevaría a Georgia, con la intención de ver las especialidades caucásicas. Pero tuvimos mala suerte, pues, aunque la época recomendada es esta porque la nieve aun no está muy alta y los pájaros están en laderas bajas, cuando hemos ido debía hacer mucho tiempo que no nevaba, por lo que los pájaros más interesantes los vimos, tras mucho esfuerzo, y a mucha distancia.

27-IV-11.- Llegamos a Tbilisi, capital del país, desde donde en coche fuimos al Cáucaso, concretamente a la localidad de Kazbegi, cerca de la frontera con Rusia, adonde llegamos ya de noche para ir directamente al hotel, tras comprar algo para comer en lo que nos dicen el Market, que no es sino una especie de kiosko donde venden alcohol, y algo más.

28-IV-11. La primera mañana intentamos buscar en las zonas altas libres de la nieve, y pronto localizamos varios **Perdigallos Del Cáucaso** (*Tetraogallus caucasicus*), que de hecho se escuchaban desde las casas altas del pueblo, y que en los dos días aquí observaríamos en abundancia y muy bien. Por la misma zona vimos otras especialidades alpinas como **Pardillo Piquigualdo** (*Carduelis flavirostris brevirostris*), **Verdecillo Frentirrojo** (*Serinus pusillus*), **Bisbita Alpino** (*Anthus spinoletta*), **Acentor Alpino** (*Prunella collaris montana*), los muy

abundantes **Mirlos Capiblanco** (*Turdus torquatus*), y un **Gallo Lira Caucásico** (*Lyrurus mlokosiewiczii*) que llegó volando. En la zona de Sumeba vimos **Alondra Cornuda** (*Eremophila alpestris*) y **Quebrantahuesos** (*Gypaetus barbatus*), y en la bajada, con un pinarcillo, vimos **Agateador Norteño** (*Certhia familiaris persica*), muchos y ruidosos **Verdecillos Frentirrojos** (*Serinus pusillus*), **Zorzales Charlos** (*Turdus viscivorus*), **Carbonero Garrapinos** (*Parus ater derjugini*). Estuvimos todo el día caminando, a veces bajo la lluvia tratando de localizar las especies que nos faltaban, pero no los localizamos.

29-IV-11.- Por la mañana siguiente localizamos, en una ladera muy alta y bastante lejos, un **Camachuelo Grande** (*Carpodacus rubicilla*) y varios **Colirrojos de Guldenstadt** (*Phoenicurus erythrogaster*). Vimos además otras dos parejas de **Perdigallos Del Cáucaso** (*Tetraogallus caucasicus*), una muy bien mientras pastaba en una ladera alta, y los pájaros de costumbre como **Pardillos Piquigualdos** (*Carduelis flavirostris brevirostris*), collalbas, **Colirrojos Tizón** (*Phoenicurus ochruros*), que eran muy abundantes. Y algo más abajo, unos **Cucos** (*Cuculus canorus*) muy confiados. Todos los días había numerosos **Mosquiteros Caucásicos** (*Phylloscopus lorenzii*), en bosquecillos, parques, etc. En un pequeño parquecillo cerca del hotel en Kazbegi, vimos un macho de **Papamoscas Semicollarino** (*Ficedula semitorquata*), **Pinzón Común** (*Fringilla coelebs caucasica*), **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*), dos **Camachuelos Comunes** (*Pyrrhula pyrrhula rossikowi*), **Agateador Norteño** (*Certhia familiaris persica*), **Jilgueros** (*Carduelis carduelis loudoni*).

Subiendo el puerto que nos llevaría a Tbilisi de vuelta vimos más de las aves ya citadas además de **Gorrion Alpino** (*Montifringilla nivalis alpicola*) y **Acentor Alpino** (*Prunella collaris*), **Chovas Piquirrojas** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis*), **Pardillos Piquigualdos** (*Carduelis flavirostris brevirostris*).

Los últimos intentos fueron para ver algunas especies forestales en zonas más bajas. La primera parada la hacemos en el castillo de Ananuri, donde como más interesante observamos un **Colirrojo Real** (*Phoenicurus phoenicurus samanasicus*). En un parque a unos dos kilómetros más adelante observamos al menos tres **Papamoscas Papirojos** (*Ficedula parva*), y en la laguna Bazaleti, cerca de la capital varios **Fumareles Aliblanco** (*Chlidonias leucopterus*), además de 10 **Cerceta Carretona** (*Anas querquedula*), dos **Ánades Rabudos** (*Anas acuta*), y **Garceta Grande** (*Egretta alba*).

30-IV-11.- El último día lo pasamos en el lago Lisi, buscando intensamente el **Carricero Agrícola** (*Acrocephalus agricola*), cosa que no conseguimos, aunque en los alrededores del lago, veríamos quizás unos 100 **Papamoscas Papirojos** (*Ficedula parva*), en paso, todo un espectáculo.

Además vemos **Carricerines Comunes** (*Acrocephalus schoenobaenus*), **Carriceros Comunes** (*Acrocephalus scirpaceus*) y **Tordales** (*A. arundinaceus*), **Pechiazul** (*Luscinia svecica*) (la subespecie magna, con el pecho completamente azul, sin medalla), **Lavanderas Boyeras** (*Motacilla flava*), **Curruca Zarcerilla** (*Sylvia curruca*), y en cuanto a acuáticas, **Fumareles Aliblanco** (*Chlidonias leucopterus*), **Garcillas Cangrejera** (*Ardeola ralloides*) y **Bueyera** (*Bubulcus ibis*), **Andarríos Grande** (*Tringa ochropus*), canastera...

ESPECIES OBSERVADAS

Gallo Lira Caucásico (*Lyrurus mlokosiewiczii*): GEORGIA: La mañana del 29, vimos un macho cómo volaba alto sobre las laderas, se posaba y después desaparecía. Muy alto cerca del límite de la nieve. En Kassovy Pass no había ninguno.

Perdigallo Del Cáucaso (*Tetraogallus caucasicus*): GEORGIA: En las laderas de Kazbegi, concretamente en las del Kuro Mountains, había varios ejemplares. El día 29 se escuchaban desde las casas altas del pueblo y en esas laderas había unos 6-8 ejemplares, siempre en parejas. Se les veía volando, emitiendo un ruidoso reclamo al hacerlo, y después posados como peonaban vigilantes. Al día siguiente, quizás con las aves a más altura, se veían menos, también porque había gente en las laderas. Sin embargo, vimos varios ejemplares, dos campeando altos muy bien vistos.

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*): GEORGIA: En el lago Bazaleti, cerca de Tbilisi, había 10 ejemplares, 8 de ellos machos, la tarde del 30.

Ánade Rabudo (*Anas acuta*): GEORGIA: En el mismo lago había una pareja.

Zampullín Chico (*Tachybaptus ruficollis*): KUWAIT: Solía haber uno en plumaje nupcial, en una de las lagunas de Jahra Pools.

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*): GEORGIA: Varios, en plumaje nupcial e intentando esconder nido, en el lago Lisi.

Flamenco (*Phoenicopterus ruber*): KUWAIT: Varios siempre en la bahía de Kuwait, tanto en Doha como en Manchester Club.

Morito (*Plegadis falcinellus*): KUWAIT: Algunos, siempre en pequeña cantidad, hasta 6-8 juntos, en Jahra Pools.

Espátula (*Platalea leucorodia*): KUWAIT: Había algunas en la isla Bubián.

Avetoro (*Botaurus stellaris*): GEORGIA: Se escuchó uno en el lago Lisi durante todo el día, ejemplar que no vimos.

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*): Especie abundante tanto en Kuwait como en Georgia. KUWAIT: Se veía en muchos lugares, en las zonas húmedas, por ejemplo en Jahra Pools, pero también en las granjas como Al Abraq, donde probablemente se veían ejemplares en paso. GEORGIA: Había alguna siempre en Lago Lisi.

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*): KUWAIT: Vistas algunas en Al Abraq, por ejemplo, el día 22.

Garza Imperial (*Ardea purpurea*): KUWAIT: Vistas por ejemplo, en Green Island.

Garza Real (*Ardea cinerea*): GEORGIA: Había alguna en el lago Lisi, y también en el lago Bazaleti.

Garceta Grande (*Egretta alba*): GEORGIA: Alguna en el lago Lisi.

Garceta Común (*Egretta garzetta*): KUWAIT: En Al Abraq, el 25 GEORGIA: Varias en el Lago Lisi.

Garceta Dimorfa (*Egretta gularis*): KUWAIT: Alguna de fase oscura, volando lejanas cerca de la isla Bubián, donde crían.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*): KUWAIT: Algunos, si bien siempre pocos, en las plataformas frente a Sharq Port, y también en Zour Port, volando sobre el mar.

Cormorán de Socotra (*Phalacrocorax nigrogularis*): KUWAIT: Una de las especialidades kuwaitíes; había siempre uno posado en las plataformas frente al Sharq Port, que parece que era siempre diferente individuo. También uno voló en la zona del Zour Port.

Milano Negro (*Milvus (migrans) lineatus*): KUWAIT: Uno con grandes manchas blancas bajo las alas, de la subespecie oriental lineatus, volando sobre el desierto en la carretera que se dirige hacia Salmy (hacia el sur desde Kuwait City). Visto el día 27.

Buitre Común (*Gyps fulvus*): GEORGIA: Algunos en la zona de Kazbegi.

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*): GEORGIA: Un ejemplar adulto sobrevolando los pastizales alpinos de la zona de Sumela, la mañana del 29.

Águila Culebrera (*Circus gallicus*): KUWAIT: Una en Jahra Pools, el día 25.

Águila Calzada (*Hieraaetus pennatus*): KUWAIT: Vista una de fase clara en Pivot Fields, el día 25.

Águila Moteada (*Aquila clanga*): KUWAIT: Una que pasó rasante sobre la vegetación acuática en Jahra Pools, la visita del día 22.

Aguilucho Lagunero (*Circus aeruginosus*): KUWAIT: Al menos en Al Abraq, el día 22, y en Pivot Fields, el 25 y el 26.

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*): KUWAIT: Una hembra en Pivot Fields, la visita del día 25.

Ratonero De Estepa (*Buteo buteo vulpinus*): KUWAIT: Visto en Al Abraq, el día 26.



Ratonero de Estepa (*Buteo buteo vulpinus*)

Al Abraq, Kuwait, Abril 2011

2011 © Javier Portillo

Gavilán Común (*Accipiter nisus*): KUWAIT: EN Al Abra q se veían aves en paso, sobre todo en la primera visita, la del día 22, cuando había varios ejemplares muy activos tratando de cazar. En la visita del día 25 también había un ejemplar.

Gavilán Shikra (*Accipiter badius*): KUWAIT: Este es un ave normal aunque en pequeño número como invernante en el país. Decían que ya era algo tarde, aunque vimos uno, cuando volaba cerca de nosotros la primera visita a Al ABraq, cuando había muchos gavilanes. Pekka vio otro ejemplar. Al día siguiente fueron al mismo lugar en su búsqueda un grupo de alemanes con el otro guía, Abderraman, pero no los vieron.

Cernícalo Común (*Falco tinnunculus*): KUWAIT: Algunos dispersos por diferentes lugares del país. GEORGIA: También vimos varios.

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*): KUWAIT: En Jahra Pools había siempre varios ejemplares, en varios lugares. En la laguna del primer observatorio siempre había una, que habitualmente comía en lugares muy despejados. Y en la charca donde vivían las polluelas bastardas, siempre había varias. En ocasiones se enfrentaban a las bastardas.

Polluela Bastarda (*Porzana parva*):GEORGIA: Una hembra en el Lago Lisi. KUWAIT: En Jahra Pools, había dos ejemplares, una pareja, en un pequeño macizo de juncos; estuvieron allí dos días, el último que fuimos, el 27, ya no estaba.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*): KUWAIT:En Jahra Pools había un ejemplar en una zona de carrizos y vegetación densa, en el borde de una zona inundada. Parece que estaba más activa al atardecer. El último día ya no estaba.



Polluela Chica (*Porzana pusilla*)
Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

Guión de Codornices (*Crex crex*): KUWAIT: Vistos un ejemplar cada día en AL ABraq, las dos últimas visitas. La primera vez, el día 26, salió de una zona que tenía hileras de árboles, salió de una de las bases de los árboles. El último día que estuvimos en Kuwait, el 27, había una en una pequeña plantación de regadío, rodeada de tierra.

Polla de Agua (*Gallinula chloropus*): KUWAIT: Presentes en las Jahra Pools.

Focha (*Fulica atra*): GEORGIA: Alguna en el lago Lisi.

Droma Cangrejero (*Dromas ardeola*): KUWAIT: Varios vistos frente a la isla Bubián, siempre muy lejos de la costa.

Cigueñuela (*Himantopus himantopus*): KUWAIT: Bastantes en Jahra Pools en cada una de las visitas.

Avefría Coliblanca (*Vanellus leucurus*): KUWAIT: Siempre veíamos un ejemplar en las Jahra Pools, volando sobre las diferentes lagunas.

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*): KUWAIT: Alguno en cada visita que hacíamos a Manchester Club, con algunos ejemplares en plumaje nupcial.

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*): KUWAIT: Algunos en la zona de la Bahía de Kuwait, como Manchester Club, y también en las Jahra Pools.

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*): KUWAIT: Presentes todas las visitas que hicimos a Jahra Pools.

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*): KUWAIT: Frecuente en las zonas de limos de la Bahía de Kuwait, por ejemplo en Manchester Club, donde los veíamos en cada visita.

Chorlitejo Mongol Grande (*Charadrius leschenautii*): KUWAIT: Varios ejemplares en los grandes bandos de limícolas en Doha Split. Quizás había unos 20-30 ejemplares, en variados plumajes, pero ninguno en plumaje nupcial perfecto.

Chorlitejo Mongol Chico (*Charadrius mongolus*): KUWAIT: Había un gran grupo, que se calculaba en unos 1.100 ejemplares en Doha Split. Pertenecían a la subespecie pamirensis, con la frente negra, y la gran mayoría estaban en plumaje nupcial.

Chorlito Asiático Chico (*Charadrius asiaticus*): KUWAIT: Vistos dos ejemplares, una pareja, en los eriales de Pivot Fields, la mañana del 25. Unos días antes se habían visto 7 ejemplares en el mismo lugar.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*): KUWAIT: Siempre había una en Jahra Pools.

Aguja Colipinta (*Limosa limosa*): KUWAIT: Muchas en la bahía de Kuwait.

Aguja Colinegra (*Limosa lapponica*): KUWAIT: Grupos numerosos en alguna de las visitas que hicimos a la Bahía de Kuwait.

Zarapito Real (*Numenius arquata*): KUWAIT: Algunos en la bahía de Kuwait.

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*): KUWAIT: Siempre había pequeños grupos en la Bahía de Kuwait, sobre todo en Manchester Club.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*): KUWAIT: pocos, al menos algunos en Doha, el día 23.

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*): KUWAIT: Un ejemplar en Jahra Pools, el último día que lo visitamos, el 27.

Combatiente (*Philomachus pugnax*): KUWAIT: Abundante en Jahra Pools, muchos en plumaje de verano o casi.

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*): KUWAIT: Frecuente en Jahra Pools, por ejemplo.

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*): GEORGIA: Algunos en Lago Lisi.

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*): KUWAIT: Muy frecuente en Kuwait, en todas las zona húmedas de interior. Era particularmente frecuente en Jahra Pools, pero también lo había en charcas en Pivot Fields, en cultivos de regadío en Al Abraq.



Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)
Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*): KUWAIT: Muchos en Jahra Pools, pero también presente en charcas en Pivot Fields.

Correlimos Común (*Calidris alpina*): KUWAIT: Presente en Jahra Pools, y en la Bahía de Kuwait, aquí muchos en plumaje de verano.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*): KUWAIT: Varios, muchas veces en plumaje nupcial perfecto, en Doha, en Jahra Pools, había uno en la playa en nuestra visita a Green Island el día 24.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*): KUWAIT: Presente, con algunos ejemplares en plumaje de verano, en la costa de la Bahía de Kuwait, y en Jahra Pools.

Correlimos Falcinelo (*Limicola falcinellus*): KUWAIT: Bastantes ejemplares en Doha, ejemplares en pequeños grupos, el día 23.

Falaropo Picofino (*Phalaropus lobatus*): KUWAIT: Grupo numeroso en todas las visitas que hicimos a Jahra, posados en el agua nadando como suele ser habitual en ellos. En algunas ocasiones también se posaban en el limo.

Vuelvepiedras (*Arenaria interpres*): KUWAIT: Algunos en la Bahía de Kuwait

Canastera Común (*Glareola pratincola*): GEORGIA: Una en las orillas del lago Lisi KUWAIT: Siempre había un grupo numeroso en los eriales de Pivot Fields, con muchos plumajes diferentes. También había una, muy confiada, en los cultivos de Al Abra, la tarde del 25

Canastera Alinegra (*Glareola nordmanni*): KUWAIT: En Pivot Fields, siempre había alguna en los grupos más numerosos de canasteras comunes que descansaban en los eriales. Costaba mucho identificarlas, y aunque se citaban números elevados, de unos 20 ejemplares, nosotros solo conseguimos identificar con certeza una cada día. Además, la tarde del 25 en Al Abra, cuando abandonamos la granja, había un ejemplar recién muerto en el desierto.

Gaviota Picofina (*Larus genei*): KUWAIT: Muchas, Varios cientos, en Doha y otras partes de la bahía de Kuwait. También vista en la playa de Green Island.

Gaviota Cáspica (*Larus cachinans*): Un ejemplar adulto, en Doha.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*): KUWAIT: Había muchas en la Bahía de Kuwait, en plumaje de verano.

Pagaza Piquirroja (*Hydroprogne caspia*): KUWAIT: Muchas en la Bahía en plumaje de verano, y alguna también en Zour Port.

Charrán Bengalí (*Sterna bengalensis*): KUWAIT: frecuente en la costa con ejemplares en variados plumajes. Se veían siempre varios ejemplares en Sharq, donde los vimos en todas las visitas, pero también en Doha, en Zour.

Charrán Crestado (*Sterna bergii*): KUWAIT: En las visitas a Sharq siempre había varios ejemplares posados en las plataformas que había fuera del puerto, donde se los veía muy bien. En vuelo mostraban las alas bastante oscuras, y tenían alas muy largas, volando de manera muy pausada. Algunos grupos vieron hasta 8-10 ejemplares en la zona, nosotros siempre veíamos 3-5 ejemplares. En Doha también vimos un ejemplar el día 23.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*): KUWAIT: En Sharq siempre había algunos ejemplares.

Charrán Embridado (*Onychoprion anaethetus*): KUWAIT: Ave muy frecuente como nidificante en Kuwait, nosotros los vimos en dos ocasiones, en Falahel, en el puerto, en una plataforma

en el mar, y volando frente a la playa de Zour, siempre un grupillo, pero vistos siempre muy lejos.

Charrán Común (*Sterna hirundo*): KUWAIT: Siempre había alguno en Sharq, siempre ejemplares mudados.

Charrán Árabe (*Sterna repressa*): KUWAIT: En nuestras visitas a Sharq, siempre había algunos ejemplares sobrevolando la zona, ejemplares perfectos en plumaje nupcial, que destacaban por su largo cuerpo. También había algunos posados en Falahael, en plataformas fuera del puerto.

Charrancito (*Sterna albifrons*): KUWAIT: Bastantes todos los días en Sharq Port, la mayoría en plumaje de verano. Entre ellos se decía que había algún Saunders, y pese a buscarlo intensamente, no es seguro que lo viéramos.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*): KUWAIT: Un ave, en plumaje nupcial, visto en Jahra Pools la primera visita, del día 22.

Fumarel Aliblanco (*Chlidonias leucopterus*): GEORGIA: Bastante numerosos en las lagunas de Georgia; le vimos en el lago Bazaleti, y a la mañana siguiente en el lago Lisi.

Tórtola Común (*Streptopelia turtur*): KUWAIT: Alguna en Al Abraq.

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis cambayensis*): KUWAIT: Frecuente en zonas humanizadas en Kuwait, como Kuwait City, Green Island.

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*): GEORGIA: Frecuente en lugares humanizados.

Tortolilla Rabilarga (*Oena capensis*): KUWAIT: Una pareja en las Jahra Farms

Cuco (*Cuculus canorus*): GEORGIA: Varios, muy evidentes y llamativos en las laderas sobre Kazbegi, llegando hasta la base de las laderas donde estaban los perdigallos.

Vencejo Común (*Apus apus*): KUWAIT: vistos varias veces en Kuwait City, en Green Island.

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*): KUWAIT: Vistos en Green Island, el día 26

Carraca (*Coracias garrulus*): KUWAIT: Había varias en Al Abraq.

Abubilla (*Upupa epops*): KUWAIT: Varias, en Jahra Farms, en Al Abraq.

Martín Pescador de Esmirna (*Halcyon smyrnensis*): KUWAIT: Al menos dos individuos en las Jahra Farms, en una zona de cultivos con grandes palmeras, que era donde se posaban las aves.

Abejaruco Común (*Merops apiaster*): KUWAIT: Muy frecuente en todos los lugares con algo de vegetación, en grupos y muy ruidoso.

Abejaruco Persa (*Merops persicus*): KUWAIT: Igual que el anterior, muy frecuente y ruidoso. Era una de las piezas preferidas de los cazadores en AL ABraq.

Oropéndola (*Oriolus oriolus*): KUWAIT: Vista una en Al Abraq, en la última visita.

Alcaudón Común (*Lanius senator*): Vistos varios: en Pivot Fields, el 24 y el 25.

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*): KUWAIT: Algunos el día 25 en Pivot Fields, en AL ABraq también el 25.

Alcaudón Núbico (*Lanius nubicus*): KUWAIT: Varios, en Green Island, AL Abraq, en Pivot Fields (25-IV).

Alcaudón Isabel (*Lanius isabellinus*): KUWAIT: Escaso, presente siempre en pequeño número, como citan los demás trips. Lo vimos en Zour Port (24-IV), en Green Island.

Alcaudón Turquestano (*Lanius (isabellinus) phoenicuroides*): KUWAIT: Muy frecuente, se veía todos los días, en todos los lugares con árboles, como Green Island, Al ABraq, la zona de Zour Port, Abdali Farms, Pivot Fileds. El primer día, vimos uno en el cruce de la carretera que iba a Salmy con la que luego nos llevaría a Al Abraq, donde había algunas hileras de acacias en medio del desierto, y por lo tanto había muchos pájaros; era una hembra que mató un coche al intentar cruzar la carretera.

Alcaudón Turquestano (*Lanius phoenicuroides karelini*): KUWAIT: Vimos dos ejemplares de este precioso pájaro, uno en Pivot Fields el 25, y otro en Jahra Pools el 26.



Alcaudón Turquestano (*Lanius phoenicuroides karelini*)
Pivot Fields, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

Tordalino Afgano (*Turdoides (caudata) huttoni*): KUWAIT: En Abdali Farms, donde cría posiblemente la única de pareja de esta especie en todo el WP, y además desde tiempo reciente, buscamos y vimos al ave tras bastante esfuerzo. Vive en zonas de árboles dispersos, cerca de los cultivos, y donde lo vimos era una plantación de jóvenes palmeras, donde se

escondían las aves, muy en el interior de las plantas, de forma que se los veía moverse con una cierta dificultad.

Arrendajo (*Garrulus glandarius*): GEORGIA: Algunos ejemplares, de curiosa cabeza negra, se veían en los bosques de Kazbegi, y también había alguno en los robledales de un monasterio cercano a Tbilisi. La subespecie representada es *krynickyi*, con el píleo negro.

Urraca (*Pica pica*): GEORGIA: Presente por las zonas bajas del país.

Chova Piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis*): GEORGIA: Vista en las laderas de Kazbegi

Chova Piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*): GEORGIA: Vista en las laderas de Kazbegi

Cuervo (*Corvus corax*): GEORGIA: Algunos en la zona de Kazbegi

Corneja Cencicienta (*Corvus cornix*): GEORGIA: Muy frecuente por todo el país.

Hipocolio (*Hypocolius ampelinus*): KUWAIT: Una de las estrellas de Kuwait, en sus pasos hacia la zona de cría en Mesopotamia, decían que quizás fuera un poco tarde para verlo. Se había visto unos días antes en Green Island, que dicen que es el mejor lugar para verlos, un día un ejemplar, y otro dos, pero llevaban dos o tres días sin verlo. Cuando fuimos nosotros, nada más abrir el parque, vimos 7 ejemplares, machos y hembras, que a las dos horas o algo así desaparecieron del lugar. La mañana del 26, vimos algunos en las hileras de acacias de Al Abraq, primero una hembra que parece que estaba con un macho y después una hembra solitaria.

Bulbul Cariblanco (*Pycnonotus (leucogenys) leucotis*): KUWAIT: Muy frecuente en todos los medios arbolados de Kuwait, Green Island, Al Abraq, Jahra Farms... Había algunos, confiados en los pequeños jardines que están próximos a Sharq Port.



Bulbul Cariblanco (*Pycnonotus (leucogenys) leucotis*)
Green Island, Kuwait, Abril 2011
2011 © Javier Portillo

Bulbul de Vientre Rojo (*Pycnonotus cafer*): KUWAIT: En todo el WP sólo crían en Green Island, aunque es una especie introducida. Se ven varios con facilidad, siempre menos que la anterior especie, y además generalmente bastante desconfiados.

Agateador Norteño (*Certhia familiaris persica*): GEORGIA: Vimos algunos ejemplares en Kazbegi, uno en el parque que estaba al lado del hotel y otros en los pinares bajando de Sumela.

Carbonero Garrapinos (*Parus ater derjugini*): GEORGIA: Varios en la zona de Kazbegi

Carbonero Común (*Parus maior*): GEORGIA: Varios en la zona de Kazbegi, y también por la zona del Lisi.

Herrerillo Común (*Parus caeruleus saturnini*): GEORGIA: Presente en bosquecillos

Mito (*Aegithalos caudatus*): GEORGIA: Algunos ejemplares en los bosques cercanos al castillo de Annanuri, pertenecientes a la subespecie *major*

Trepador Azul (*Sitta europea caucásica*): Algunos en el parquecillo de Ananuri

Cogujada Común: KUWAIT: (*Galerida cristata ivanovi*): Pes e a que se cita como una ave frecuente, nosotros vimos pocos ejemplares. Sólo algunos cerca de las carreteras, por

ejemplo en Abdali Farms, y únicamente con una cierta frecuencia en Pivot Fields GEORGIA: (*G.c.caucasica*): Alguna en los campos cercanos al lago Lisi.

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*): KUWAIT: Un ejemplar, muy bien visto en Pivot Fields, en los eriales que estaban llenos de bichos, la mañana del 25. Le saqué muchas fotos para ver la subespecie, y parece *artemisiana*, con bastante rojizo en los lados del cuello, y la marca negra estaba prácticamente ausente.

Alondra Cornuda (*Eremophila alpestris*): GEORGIA: Zona de Sumeba

Alondra Ibis (*Alaemon alaudipes doriae*): KUWAIT: Una en el desierto en la carretera que lleva a Al Abraq, la mañana del 27. Decía Pekka, que no es un ave frecuente.

Avión Roquero (*Hirundo rupestris*): KUWAIT: Presente al menos en Kuwait City el 23

Avión Zapador (*Riparia riparia*): KUWAIT: Presente en Jahra Pools.

Avión Común (*Delichon urbica*): Algunos en Kuwait y Georgia

Golondrina Común (*Hirundo rustica*): KUWAIT: Algunas en migración en Al Abraq, y en medio del desierto.

Prinia (*Prinia gracilis irakensis*): KUWAIT: Sorprendentemente pocos ejemplares. Se escuchaban ejemplares en zonas de la bahía de Kuwait, y vimos un ejemplar en el espigón en la zona de Doha y otro en Jahra Pools.

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*): KUWAIT: Varios en paso, sobre todo en Al Abraq (arboledas en medio del desierto) GEORGIA: Varios en el Lago Lisi, cantando.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*): KUWAIT: Varios, sobre todo en AL ABraq, en arbustos. GEORGIA: Algunos en el lago Lisi.

Carricero Estentóreo (*Acrocephalus stentoreus*): KUWAIT: Al menos un ejemplar en Al Abraq el último día en Kuwait, en las acacias donde buscábamos los Sykes. Pertenecía a la subespecie *brunnescens*, asiática, que debe ser la propia del lugar y en ocasiones se reproduce en arbustillos, y que es claramente más blanca en las partes inferiores.

Carricero De Basora (*Acrocephalus griseldis*): KUWAIT: Es una de las estrellas de Kuwait, que se ve en ambos pasos, ahora en su momento más apropiado. Vimos siempre alguno en los carrizales de Jahra Pools, uno o dos, y alguno también en la pequeña charca que había en Pivot Fields

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*): GEORGIA: Muchos, cantando, en los carrizales del Lago lisi.

Zarcero Pálido Oriental (*Hippolais pallida*): KUWAIT: Bastantes en todos los lugares con árboles o arbustos en Kuwait, aunque siempre en pequeño número. Muy característica su forma de mover la cola de arriba hacia abajo con grandes movimientos

Zarcero De Upcher (*Hippolais languida*): KUWAIT: Un ejemplar en una zona de arbustos, en Al Abraq, la primera mañana que fuimos y otro después en Jahra Farms

Zarcero De Sykes (*Iduna rama*): KUWAIT: Sin duda una de las estrellas de Kuwait, que se ve en paso, en pequeño número en la primavera tardía. El día 26, Pekka vio tres ejemplares en Al Abraq, en una hilera de acacias que estaba llena de pájaros, pero cuando fuimos a buscarlos, una hora después, ya no los vimos, pese a una intensa búsqueda. A la mañana

siguiente, en unas acacias cercanas había un ejemplar que vimos por un tiempo prolongado, y en otras acacias quizás otros dos ejemplares.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*): KUWAIT: Frecuente en los medios arbolados por todo el país. Algunos pertenecían a la subespecie *abietinus*.

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*): KUWAIT: Muchos donde había vegetación. Parece que muchos pertenecían a la subespecie *acredula*, con la garganta amarilla y el resto del cuerpo blanquecino.

Mosquitero Caucásico (*Phylloscopus lorenzii*): GEORGIA: Algunos en las zonas altas.

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*): KUWAIT: Algunas en zonas con vegetación alta.

Curruca Gavilana (*Sylvia nisoria*): KUWAIT: Green Island y Al Abraq.

Curruca Mirlona Oriental (*Sylvia crassirostris*): KUWAIT: Vistos tres ejemplares, parece que dos machos y una hembra, en unos árboles altos en Green Island Otros grupos las vieron el día 22 en Al Abraq.

Curruca Desértica Asiática (*Sylvia nana nana*): KUWAIT: Un ejemplar visto muy bien, y por tiempo prolongado en Al Abraq, en una parcela don vegetación desértica, la tarde del 26. La citan como invernante en el país, aunque en esta fecha ya era algo tarde para verla; algunos autores dicen que podría criar alguna pareja aunque no hay pruebas de ello. Al día siguiente, Pekka vio otro ejemplar.

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*): KUWAIT: Muy frecuente en los medios arbolados, como Al Abraq, Green Island...En su mayoría parecían de la subespecie nominal, aunque en Al Abraq, vimos una de la subespecie *blythii* la tarde del 26 y se vio una caucásica por esos días en otro lugar. GEORGIA: Vistas algunas en el parque que había junto al hotel de Kazbegi, y alguna en los arbustos que rodeaban el Lago Lisi, aunque todas, incluso las del Cáucaso parecían de la subespecie nominal, no de la caucásica, por lo que todos serían ejemplares en migración.

Curruca de Hume (*Sylvia althaea*): KUWAIT: Aunque hay algunas dudas o discusión sobre la especie, quizás sea regular en pequeño número en el país. La tarde del 26, Pekka vio un ejemplar en unos arbustos en Al Abraq, que, cuando lo buscamos no pudimos ver. Después, cuando llegó el grupo de finlandeses a buscar el Sykes, dijeron que habían visto un ejemplar en Green Island, quizás el que vimos nosotros la tarde siguiente en el mismo lugar. Además Pekka nos enseñó fotos de la especie, lo cual denota que quizás está habituado a su observación.

Myna Común (*Acridotheres tristis*): KUWAIT: Muy frecuente por todo el país.

Bank Myna (*Acridotheres ginginianus*): KUWAIT: Las Jahra Farms son el único lugar del WP donde cría la especie, que se ve fácilmente sobre todo a la entrada.

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*): GEORGIA: Abundante en los alrededores del Lago Lisi, y otras zonas humanizadas del país.

Mirlo Común (*Turdus merula*): GEORGIA: Frecuente en el país.

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*): GEORGIA: Sorprendentemente frecuente en los pastizales alpinos de Kazbegi, donde le vimos los dos días y en cantidad, así como en la subida al Kassovy Pass.

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*): GEORGIA: Se veían con facilidad en la zona de Kazbegi.

Pechiazul (*Luscinia svecica*): GEORGIA: Vimos dos ejemplares en el lago Lisi, una pareja; el macho, bien visto se veía que no tenía medalla, era de la subespecie *magna*.

Alzacola (*Cercotrichas galactotes familiaris*): KUWAIT: Muy frecuente por todo el país, en cualquier lugar con vegetación: Green Island, Pivot Fields, Al Abraq, y uno muy conñado en Zour. Los ejemplares son muy parecidos a los de la subespecie *syriacus*

Ruiseñor Ruso (*Luscinia luscinia*): KUWAIT: Vista una pareja muy bien en arbolillos en Al Abraq, los días 26 y 27

Petirrojo Gorgiblanco (*Irania gutturalis*): KUWAIT: Muy frecuente en todas las zonas arboladas, sobre todo en Al Abraq, pero también en parques como Green Island, o un parquecillo que había cerca del hotel en Kuwait City.



Petirrojo Gorgiblanco (*Irania gutturalis*)

Al Abraq, Kuwait, Abril 2011

2011 © Javier Portillo

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*): KUWAIT: Muy frecuente en las zonas arboladas, sobre todo en Al Abraq, siempre pertenecientes a la subespecie nominal. Decían que hacía unas semanas habían pasado los ejemplares de la subespecie *samanisicus*, y que un día antes de llegar nosotros todavía se había visto uno. GEORGIA: Vista una pareja de la subespecie *samanisicus*, en los árboles del castillo de Ananuri

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochrurus*): GEORGIA: Muchos de la subespecie *ochrurus* en Kazbegi, hasta en zonas muy altas donde buscábamos el otro colirrojo. Es parecido al *semirufus*.

Colirrojo de Guldenstadt (*Phoenicurus erythrogastrus*): GEORGIA: Varios en pastizales muy altos en Kazbegi, la mañana del 29. Estaban muy altos porque la nieve también lo estaba, pues debía hacer tiempo que no nevaba. En otros trips lo señalan cerca del pueblo cuando ha nevado, así como en las manchas de arbustos que hay junto al río, pero ahora nos sorprendió lo altos que estaban y que, además, a lo largo de la mañana debía seguir subiendo.

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*): KUWAIT: Al Abraq

Collaba Gris (*Oenanthe oenanthe*): KUWAIT: Vimos pocas aves, por ejemplo un ejemplar de parece que de la subespecie europea en el desierto antes de llegar a Al Abraq, el día 26. GEORGIA: Abundante y muy ruidosa en Kazbegi y Kassovy Pass, que además llegaban hasta mucha altura.

Collalba Isabel (*Oenanthe isabelina*) : KUWAIT: Sólo un ejemplar observado en Pivot Fields, el día 25.

Collalba Pía (*Oenanthe pleschanka*): KUWAIT: Vistos algunos ejemplares en zonas costeras, como en la Bahía de Kuwait, el día 22, donde vimos al menos dos machos diferentes, y una hembra vista en la playa de Green Island la mañana del 24. Decían que ya se veían pocos ejemplares, pero que unas semanas antes había habido muchos ejemplares.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*): GEORGIA: Un ejemplar en las laderas no muy altas de Kazbegi, la tarde del 29. KUWAIT: Vistos varios ejemplares, un macho en los jardines de Kuwait junto a Sharq Port, la tarde del 23, y una pareja en jardines y la playa en Zour Port, la tarde del 24.

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*): KUWAIT: Algunos en paso en Al Abraq, al menos los días 26 y 27, y anteriormente habíamos visto alguno en Jahra Farms.



Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)
 Al Abra, Kuwait, Abril 2011
 2011 © Javier Portillo

Papamoscas Papirrojo (*Ficedula parva*): GEORGIA: Primero los vimos en un hayedo viejo junto a la carretera, donde hay un parquecillo, cerca del castillo de Ananuri, lugar donde los citan los reportajes. Allí vimos al menos una pareja y otro macho. Y al día siguiente, el 1 de mayo, en los alrededores del Lago Lisi había cantidad de ejemplares, muchos de ellos emparejados, en todos los arbustos, arbolillos y bosquecillos de la zona, que, además se localizaban fácilmente por el reclamo. Quizás en los alrededores del lago había un centenar de ejemplares. También los vimos en el mismo día cuando visitábamos los monasterios de la zona, como Jvari, donde siempre había algún ejemplar.

Papamoscas Semicollarino (*Ficedula semitorquata*): GEORGIA: Había un ejemplar en el parquecillo que está junto al hotel en Kazbegi. Era un macho, que se llegó a poner a cantar. Lo vimos el día 30.

Gorrión Común (*Passer domesticus*): KUWAIT: Común en las zonas humanizadas, comiendo en los jardines y cultivos por todo el país. En la zona está presente la subespecie *persicus*, las hembras son muy pálidas.

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis transcaspicus*): KUWAIT: Muchos comiendo en los eriales en Pivot Fields, en las dos vistas que hicimos.

Gorrión Pálido (*Carpospiza brachydactyla*): KUWAIT: Vistos en Zour Port, el 24, un grupillo de individuos de esta especie, en la escasa vegetación herbácea del lugar que, sin embargo, en ocasiones se densifica y dificultaba la observación. Según Pekka, son aves en paso que pasan en la zona una temporada larga, pues las hierbas en las que estaban, de las que se alimentan, deben ser bastante nutritivas.

Gorrión Dorado Sudanés (*Passer luteus*): Kuwait: El día 25 vimos un ejemplar de esta especie en Pivot Fields, comiendo en los campos con los escribanos hortelanos. Teniendo en cuenta que es una especie que cría, como lugar más cercano, la costa de Arabia, y que es un pájaro muy habitual como enjaulado, hay que suponer que sea un escape.

Gorrión de Garganta Amarilla (*Gymnoris xanthocollis transfuga*): KUWAIT: Visto en dos de las vistas a Al ABraq, en dos zonas diferentes de la granja, posados en árboles bajos o en cables de la luz. En la segunda ocasión, el día 26, era una pareja.



Gorrión de Garganta Amarilla (*Gymnoris xanthocollis transfuga*)

Al Abra, Kuwait, Abril 2011

2011 © Javier Portillo

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis alpicola*): GEORGIA: Vistos varios, de la subespecie *alpicola*, en la subida al Kastovy Pass.

Acentor Alpino (*Prunella collaris montana*): GEORGIA: Varios, en las zonas altas, tanto en la zona de Kazbegi como en la subida al Kastovy Pass.

Acentor Común (*Prunella modularis*): GEORGIA: Algunos ejemplares en las zonas no muy altas de Kazbegi

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*): GEORGIA: Normal en los ríos de Kazbegi, y otros lugares apropiados. KUWAIT: Vimos un ejemplar en las Jahra Farms. Decía Pekka que era un ave habitual en invierno, y que ya quedaban muy pocas.

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*): GEORGIA: Presente en el Lago Lisi, donde había bastantes ejemplares. KUWAIT: Muy frecuentes en muchos lugares, siempre que hubiera algo de vegetación herbácea, y más si había agua. Así, había muchos ejemplares en las charcas de Jahra Pools, había en Al Abra, sobre todo en las zonas de cultivo, concentrándose muchos ejemplares después de que regaran algún campo. Y también había machos en los jardines de Kuwait City, en todos los prados cerca de Sharq Port. Había ejemplares de varias subespecies, fundamentalmente de *lutea*, *feldegg*, *beema*, pero los últimos días, en Al Abra también identificamos *thunbergi*, y el grupo de finlandeses vieron también en Al Abra, un ejemplar de *leucocephala*, que no llegamos a ver.

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*): KUWAIT: un ejemplar en Al Abra, en un depósito de agua el día 22. GEORGIA: Varios en Kazbegi en torno al río Terek.

Bisbita Gorguirrojo (*Anthus cervinus*): KUWAIT: Muy frecuente en todos los lugares con algo de vegetación por todo el país: los jardines de Kuwait, Jahra Pools, Jahra Farms, Al Abra.

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*): GEORGIA: Muy abundante en todas las zonas altas, hasta cerca de los pueblos, en los entornos de Kazbegi. Todas ellas pertenecientes a la subespecie *coutelli*.

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*): KUWAIT: Abundante en las zonas con vegetación y ajardinadas, como los jardines de Kuwait, Green Island.

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*): KUWAIT: Un ejemplar en los eriales de Pivot Fields, el día 25.

Bisbita Común (*Anthus pratensis*): KUWAIT: Un ejemplar en los jardines de Kuwait City, cerca de Sharq Port.

Pinzón Común (*Fringilla coelebs caucasica*): GEORGIA: Algunos en los jardines y bosquecillos de Georgia. Por ejemplo, había algunos en el parquecillo cerca del hotel en Kazbegi.

Verderón Común (*Carduelis chloris bilkevitchi*): GEORGIA: Algunos en las zonas arboladas bajas del país. Por ejemplo, había algunos en los bosquecillos del monasterio de Shio Mghvime.

Verdecillo Frentirrojo (*Serinus pusillus*): GEORGIA: Relativamente abundante en las zonas altas de Kazbegi. Así había grupillos o parejas en las pastizales alpinos, que veíamos cuando buscábamos al perdigallo. Y en el pinar que había al bajar de Sumeba había muchos ejemplares, que además eran muy ruidosos.

Jilguero (*Carduelis carduelis loudoni*): GEORGIA: Algunos ejemplares por todo el país, por ejemplo en el parque de Kazbegi.

Pardillo Piquigualdo (*Carduelis flavirostris brevirostris*): GEORGIA: Muy abundante en las zonas alpinas de Kazbegi y del Kassov Pass, además, muy ruidosos. Los reportajes no citan muchos ejemplares, pero nosotros sí que vimos muchos.

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula rossikowi*): GEORGIA: Una pareja en el parque de Kazbegi.

Camachuelo Grande (*Carpodacus rubicilla*): GEORGIA: UN ejemplar visto a mucha distancia en Kazbegi en una zona muy alta, la mañana del día 30, cerca de la zona cubierta por nieve; a lo largo de la mañana debían seguir subiendo.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*): KUWAIT: Frecuente en zonas de eriales (Pivot Fields); o con arboledas como en Green Island. Posiblemente los vimos todos los días. Pero nunca había grandes bandos; el día que vieron el **Escribano Cabecigrís** (*Emberiza buchanani*) en Pivot Fields, sí que había grandes grupos, quizás de cientos de ejemplares.

Escribano Cabecinegro (*Emberiza melanocephala*): KUWAIT: Pivot Fields.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*): GEORGIA: Varios ejemplares, siempre hembras o inmaduros, vistos en el Lago Lisi.

Triguero (*Miliaria calandra*): GEORGIA: Varios en las zonas bajas del país, como en el aeropuerto de Tbilisi, y en los alrededores del Lago Lisi.