

VIAJE A FINLANDIA Y NORUEGA, VERANO 2011

JAVIER PORTILLO



Fraillecillo, Hornoya, Noruega. Foto: Javier Portillo

Participantes: César Bermejo, Javier Portillo

Finlandia es un país imprescindible para cualquier observador de la avifauna paleártica, que además se suele combinar con el norte de Noruega, el fiordo Varanger, para añadir otras especies árticas. Nosotros habíamos pensado hacer ese viaje el año 2010, pero al final hubo que posponerlo a 2011. Sin embargo, no había muchos días para tal viaje, solamente 9, así que había que organizarlo en detalle para optimizar las visitas en función de las especies que queríamos ver.

Así que lo que decidimos fue volar hasta el punto más norteño del país, Ivalo, y desde allí en coche de alquiler llegar al Varanger tras haber hecho las compras en Finlandia, país considerablemente más barato que Noruega. En el fiordo Varanger íbamos a pasar tres días. Desde allí volveríamos a Finlandia para observar aves forestales, en los entornos de Ivalo y Kuusamo. La última etapa sería en el sureste del país, en Vartsila, cerca de la frontera con Rusia, donde este año estaban citando zarcero escita y buscarla lanceolada, además de ser lugar habitual de algunas otras especies orientales. Allí estaríamos dos noches. Nuestra vuelta

iba a ser desde Vaasa, una ciudad del Báltico, donde pasaríamos una noche antes de regresar a España.

La información disponible sobre esta ruta es enorme, es un recorrido muy habitual entre los ornitólogos. Hay muchos reportajes en internet, algunos tan recientes como de 2010, e incluso disponíamos de alguna información de un viaje que había acabado poco antes de nuestra salida. Sin embargo, la información más detallada, y que en muchas ocasiones resultó más útil, sería la de Dave Gosney, que hizo el viaje para actualizar su guía en el año 2010. Algunos de los lugares más interesantes los obtuvimos en esos libritos. Por último, los ornitólogos locales fueron muy importantes, sobre todo en Vartsila, que nos llevaron a ver las especies emblemáticas.

RECORRIDO

9-VII- Salida de Madrid, llegada a Helsinki y vuelo desde allí a Ivalo. Cuando llegamos a Ivalo nos sorprende una temperatura que supera los 30 grados. Hacemos un recorrido en coche hasta el norte de Kaamanen, para dormir en el Neljän Tuulen Tupa. Es un lugar muy conocido pues es visitado por los ornitólogos que hacen la ruta hacia el norte, y que paran a ver los comederos donde suele acudir el camachuelo picogruoso. Cuando llegamos, había una hembra, además de varios pardillos sizerines, y a un comedero cercano acudía una familia de arrendajos funestos.



Camachuelo picogruoso, Kaamanen, Finlandia. Foto: Javier Portillo

10-VII. Por la mañana, muy pronto, a las 5:00, hay sol y hace mucho calor. Los comederos están llenos, con unos 15 o quizás más, camachuelos picogruosos, de todas las edades, muchos pardillos sizerines, verderones, algún carbonero común, y varios roedores, sobre todo un leming, el leming vulgar, lemmus lemmus, que iba a ser muy abundante durante todo el viaje.

Viaje hacia el Varanger, con recorridos por el fiordo para dormir en Ekkeroy en el Edvin and Asta. Es una casa cerca del puerto, un alojamiento caro, pero menos que los demás que hemos visto por la zona, donde se puede cocinar, por lo que todos los desayunos y cenas los íbamos a hacer allí con las comidas traídas de Finlandia.

De camino, la primera parada la hicimos en las cercanías de Ustoki, donde había una pareja de ratoneros calzados. Nada más llegar al fiordo, paramos en Varangerbotn, lugar citado por Gosney, donde hay un pequeño recorrido entre abedules. Allí vemos criando papamoscas cerrojillo, varios pardillos de Hornemann, y algunos leming. En el fiordo vemos eider común, que estará omnipresente en el fiordo, y algunos limícolos.

11-VII. Recorrido por todo el fiordo y después la zona de interior, de algo más de altura, que se dirige a Berlevag.

12-VII. Visita a Vardo, desde donde pasamos a la isla Hornoya. Después vamos hacia el norte hasta Henningberg.



Gaviota tridáctila criando en las casas de Vardo, Noruega. Foto: Javier Portillo

13-VII. Abandonamos el Varanger, paramos en Neiden para buscar el mosquitero boreal, y nos dirigimos a Ivalo donde dormimos. Se podía cocinar en el alojamiento.

14-VII. Hacemos algunas visitas por la mañana en el entorno de Ivalo (carreteras de Kopelo, y de Murmansk), vamos a la carreta de Kitila, visitamos una montaña, la de Kilopaa, visitamos el entorno de Soadankyla, y finalmente vamos a dormir a Kuusamo.

15-VII. Por la mañana vamos a la zona de Liivara, y a un lago en el entorno de Kuusamo, para ir a dormir a Vartsila, pasando la noche en JÄNISTOEN TUVAT (Tel: 0400-840309). Es un lugar muy apropiado. La mayoría de los ornitólogos se quedan en el SINILINTU, hotelillo que estaba lleno cuando llegamos, y que es muy agradable. Pero donde estuvimos nosotros, es una gran casa, con varios dormitorios, cocina, baño..., de forma que en caso de ir varios, es mucho más práctico y barato.

16-VII. Todo el día, desde muy temprano pajareando en la zona.

17-VII. Pajareamos por la mañana en Vartsila, vamos también a Tomaharvi, y nos vamos en dirección a Vaasa. Paramos de camino en Pyyaharvi. En Vaasa dormimos en el hotel, Sokos, sorprendentemente bueno para su precio. Cenamos una pizza en la calle.

18-VII. Visitamos pronto las islas Replotfjarden, para desde allí ir al aeropuerto y regresar a España.

PRINCIPALES ESPECIES OBSERVADAS.

CISNE CANTOR (*Cygnus cygnus*), algunos vistos en lagunillas en la zona de Varanger

EIDER COMÚN (*Somateria mollissima*), muy frecuente en todas las costas de Varanger, en todos los plumajes. En algunas zonas, como a iglesia de Nesseby, toda la orilla estaba llena de hembras con crías, y en Ekkeroy, había una hembra incubando, muy confiada, en un campo relativamente lejos de la costa.

NEGRÓN COMÚN (*Melanitta nigra*), varios en la zona de Varanger, por ejemplo en la zona de Bastfjord


NEGRÓN ESPECULADO (*Melanitta fusca*), también en Bastfjord

PORRÓN OSCULADO (*Bucephala clangula*), algunos en Bastfjord

HAVELDA (*Clangula hyemalis*), algunas en lagunillas de la península de Varanger, por ejemplo a las afueras de Vardo

SERRETA GRANDE (*Mergus merganser*), muy abundante en todas las costas de Varanger, siempre con plumaje de hembra, y en grupos numerosos

UROGALLO (*Tetrao urogallus*), vistos varios en Kuusamo, al amanecer en el recorrido hacia Liivara. Primero vimos un macho, después una hembra con cuatro pollos, después otro macho que permaneció junto al camino bastante confiada, y después otro ejemplar volando.



Urogallo macho, Kuusamo, Finlandia. Foto: Javier Portillo

GALLO LIRA (*Lyrurus tetrix*), una hembra con tres pollos que pese a su pequeño tamaño hicieron un corto vuelo. Lo vimos poco antes de llegar a Kuusamo, en zona de campos y cerca de unas casas y algún bosquecillo

GUIÓN DE CODORNICES (*Crex crex*), varios en la zona de Vartsila. Siempre andaban en zona de campos de cereal, de no mucha altura, y en ocasiones muy cerca de zonas habitadas (de hecho, generalmente allí). Se les escuchaba cantando a todas horas, aunque más activo por la noche o al amanecer. Uno que vimos en Vartsila, cantaba en el mismo campo por la noche y la mañana, por la tarde cantaba cerca, pero a unos 30 metros, y después ya no le volvimos a escuchar. Otro estaba en otro campo de cereal, cerca de una casa en medio del bosque al norte de Vartsila, en Tomaharvi.



Guión de codornices, Vartsila, Finlandia. Foto: Javier Portillo

SOMORMUJO CUELLIRROJO (*Podiceps griseigena*), un ejemplar en plumaje de verano en un lago en el camino a Pyyaharvi

ZAMPULLÍN CUELLIRROJO (*Podiceps auritus*) algunos en plumaje nupcial en las islas cercanas a Vaasa.

RATONERO CALZADO (*Buteo lagopus*), vistos varios: dos muy activos en Utsjoki, otro en los cantiles del río Tana, alguno también en los cantiles de la carretera de Bastfjord, y también yando a Henningberg.



Ratonero calzado, Utsjoki, Noruega. Foto: Javier Portillo

PIGARGO (*Haliaetus albicilla*), varios, a veces varios ejemplares juntos en todas las carreteras alrededor del Varanger, en zonas costeras. Siempre había varios en la zona de Komagvaer, en la carretera de Vardo; también algunos en las cercanías de Bastfjord, en Henningberg...

ESMEREJÓN (*Falco columbarius*), alguno en Varanger, en la carretera de Berlevag

HALCÓN COMÚN (*Falco peregrinus*), uno atacando a las aves marinas de la colonia de Ekkeroy la mañana del día 12; cuando lo hacían había un gran escándalo de las aves, pero este ejemplar se legó a posar unos minutos en una roca sobre la colonia.

GRULLA (*Grus grus*), dos ejemplares en unos campos en el camino a Piyaharvi

CHORLITEJO GRANDE (*Charadrius hiaticula*), varios en Varanger. La tarde del 11 encontramos un nido con dos huevos en una playa en la carretera de Vardo.

CHORLITO CARAMBOLO (*Charadrius morinellus*), un adulto, con dos pollos correteaban por la tundra de altura de Kilopaa, en Finlandia, y otro adulto, muy desconfiado, en la tundra de la carreta de Berlevag, en Noruega.



Chorlito carambolo, Kilopaa, Finlandia. Foto: Javier Portillo

CORRELIMOS DE TEMMINCK (*Calidris tamminckii*), varios en charcas pequeñas, algunas con vegetación de abedules, en la carretera de Berlevag en Noruega.

ARCHIBEBE OSCURO (*Tringa erythropus*), dos ejemplares en plumaje de invierno, en una charca en la zona de la carreta de Kopelo, en Finlandia

FALAROPO PCOFINO (*Phalaropus lobatus*), varios en las charcas de Varranger. Había dos o tres en la charca de Neseby, donde lo citan los reportajes.

PÁGALO RABERO (*Stercorarius longicaudatus*), varios, en las zonas altas de Varanger

PÁGALO PARÁSITO (*Stercorarius parasiticus*), algunos en Varanger

GAVIOTA CANA (*Larus canus*), varias en las costas, tanto en el norte, en Ekkeroy (Varranger), como en la zona de Vaasa en Finlandia

GAVIOTA TRIDÁCTILA (*Rissa tridactyla*), muchísimas en las costas de Noruega. En Ekkeroy había una gran colonia de aves marinas, de las que la mayoría de los ejemplares eran

tridáctilas. En Hornoya había también muchas, y lo más sorprendente es cómo crían en las casas de algunos pueblos costeros. Había una pequeña colonia en Vardo, en unas casas, donde han aprovechado una viga de la fachada para colocar encima sus nidos, lo mismo que hacían sobre las ventanas.

FRAILECILLO (*Fratercula arctica*), muchos en Hornoya



Frailecillo, Hornoya, Noruega. Foto: Javier Portillo

ARAO COMÚN (*Uria aalge*), muchos en Hornoya, también algunos en Ekkeroy

ARAO ALIBLANCO (*Ceppus grylle*), algunos en las colonia de Hornoya, pero siempre en los bordes de la colonia, alejados de la gran cantidad de álcidos; también había algunos en Ekkeroy



Arao aliblanco, Hornoya, Noruega. Foto: Javier Portillo

ARAO DE BRUNNICH (*Uria lomvia*), algunos en la colonia de Hornoya, siempre con los demás álcidos; también había uno en el puerto de Vardo.

ALCA (*Alca torda*), bastantes en Hornoya

LECHUZA GAVILANA (*Surnia ulula*), familia en los bosquecillos de abedules pasado Tana Bru, en el norte del Varanger, al atardecer.



Lechuza gavihana, camino de Berlevag, Noruega. Foto: Javier Portillo

BUHO CAMPESTRE (*Asio flammeus*), uno descansando en lo alto de un árbol, en la carretera que se dirige a Kopelo desde Ivalo, vista al amanecer.

BISBITA GORGUIRROJO (*Anthus cervinus*), frecuente en prados en Noruega

AMPELIS (*Bombicilla garrulus*), solo vimos una pareja con inmaduros en un bosque maduro según íbamos en la carretera entre Neiden y kaamanen

PECHIAZUL (*Luscinia svecica*), un macho cebando un pollo casi volandero en los brezales de Kilopaa

BUSCARLA PINTOJA (*Locustella naevia*), la escuchamos en Vartsila

BUSCARLA LANCEOLADA (*Locustella lanceolata*), un macho cantor en Vartsila. Estaba en un gran campo de gramíneas altas con algún arbustillo, y algunos carrizos. La vimos cantando a las 3-4 de la madrugada, donde también había pintojas, de la cual se diferencia claramente su canto. Unos días antes habían citado un macho cantor en la zona, el quinto del año en Finlandia, uno de ellos incluso al oeste de Finlandia. El año pasado no había sido citado ninguno en el país. Nos llevó a verla un ornitólogo local, y con otro que estuvimos hablando, también conocía el lugar.

BUSCARLA FLUVIAL, (*Locustella fluviatilis*), escuchamos una en Vartsila en unos campos adonde nos llevó el ornitólogo local con quien nos encontramos. Pese a que se la escuchaba bien, y la buscamos en varias ocasiones, ya nos dijo quien nos llevó que iba ser difícil de ver, y de hecho, no la llegamos a observar.

CARRICECERO POLÍGLOTA (*Acrocephalus palustris*), algunos en unos arbustos a las afueras de Vartsila.

CARRICERO DE BLYTH (*Acrocephalus dumetorum*), abundante y ruidoso en vegetación herbácea alta en Vartsila, particularmente en la carretera llamada Ilomantsintie. En Tomahjarvi, había también bastantes en jardines y parques, algunos con cebo, cebando pollos. (según Gosney, en la zona es muy abundante, como también nos confirmaron los pajareros locales con quienes hablamos).

ZARCERO ESCITA (*Iduna lánguیدا*), una familia a las afueras de Vartsila, a unos 12 km de la localidad. Era una zona de campos con muros y setos; en uno de estos setos, con dos sauces y un abedul más alto estaba la familia de esta especie, que andaban por los arbolillos y por un seto con vegetación sobre todo de umbelíferas que lo cubría. El macho se puso a cantar. Según los pajareros locales, se han encontrado por la zona hasta 15 parejas, y varios nidos, algunos de los cuales se habían perdido. Lo habíamos buscado en el camino llamado Tapiolantie, al norte de Vartsila, lugar citado por Gosney, pero no vimos ninguno por la zona.

MOSQUITERO MUSICAL (*Phylloscopus trochilus*), aunque no muy abundante, estaba presente en los bosquecillos y setos, en muchas localidades tanto de Noruega como de Finlandia. Había uno en un arbustillo en Berlevag, en Noruega, una de las localidades más norte que viajamos; también los había en Henningberg.

MOSQUITERO BOREAL (*Phylloscopus borealis*), lo buscamos en varios lugares citados en la bibliografía, pero solo lo localizamos en uno de ellos, en que vimos un ejemplar fugazmente: fue en los árboles en la carretera de Sodankyla, en Finlandia. Es un lugar citado por Gosney, en el punto 67.3885N 26.1681E, en la carretera 952 al sur de Sodankylä, según se cruza la que lleva a Lansirante. En la iglesia de Neiden, en Noruega, donde es citado por muchos reportajes, y nos lo había citado David González Ortega, estuvimos buscándolo, pero era un día lluvioso, y además había mucha gente, pues había entierro, y solo lo escuchamos por poco tiempo. También lo buscamos en los árboles de la carreta de Kopelo (desde Ivalo, en el kilómetro 6,3), pero sin éxito.

PAPAMOSCAS GRIS (*Muscicapa striata*), frecuente en los bosques de coníferas

PAPAMOSCAS CERROJILLO (*Ficedula hypoleuca*), algunos. Vimos una pareja criando en los abedules de Varangerbotn, un lugar muy norteño

CARBONERO SIBILINO (*Parus montanus*), algunos ejemplares en la carretera de Kopelo, mientras buscábamos el mosquitero boreal. Era una hilera de árboles caducifolios.

CARBONERO LAPÓN (*Parus cinctus*), vistos solo un par de ejemplares en el bosque maduro de la carretera de Kitila, en Finlandia

ARREDAJO FUNESTO (*Perisoreus infaustus*), vimos bastantes ejemplares, todos en Finalndia. Los primeros, una familia en el famoso comedero de camachuelo picogruoso al norte de kaamanen, que acudían a otro comedero, otros cruzando la carretera, y en el bosque maduro de Kitila, cerca de Ivalo, vimos primero un ejemplar, y después otro muy confiado; también los vimos volando en la carretera entre Neiden y kaamanen



Arrendajo funesto, camino de Kitila, Finlandia. Foto: Javier Portillo

CASCANUECES (*Nucifraga caryocatactes*), los vimos en las plantaciones de Piyaharvi, donde lo cita Gosney. Estaban en una zona más avanzada de donde los cita dicho autor, y estaban allí bastante activos y ruidosos.

PINZÓN REAL (*Fringilla montfringilla*), muy abundante en todos los bosques de coníferas, desde los del norte hasta por ejemplo, en las islas cercanas a Vaasa.

PARDILLO SIZERÍN (*Carduelis flammea*), frecuente en Finlandia y Noruega, llegando en cantidad hasta el Varanger, donde se veían comiendo en los pueblos



Pardillo sizerín, Nesseby, Noruega. Foto: Javier Portillo

PARDILLO DE HORNEMANN (*Carduelis hornemanni*); lo vimos en varias ocasiones: en Varangerbotn, había al menos una pareja. En un talud de Ekkeroy, había al menos un macho muy confiado. Y en la zona alta de la carretera que va a Berlevag, había uno o dos en arbustos bajos.



Pardillo de Hornemann, Ekkeroy, Noruega. Foto: Javier Portillo

CAMACHUELO PICOGRUESO (*Pinicola enucleator*), vistos bastantes ejemplares. En Kaamanen, había una hembra la tarde del día 9 cuando llegamos, y unos 15 ejemplares a la mañana siguiente. Pero también los vimos en el bosque maduro de la carretera de Kitila, donde llegamos a ver un macho adulto cebando aun volandero, y también lo vimos en Kuusamo,

CAMACHUELO COMÚN (*Pyrrhula pyrrhula*), alguno en el bosque en la carretera de Liivara, desde Kuusamo

PIQUITUERTO COMÚN (*Loxia curvirostra*), solo vimos uno relativamente bien en el bosque de Piyaharvi; en otras ozonas vimos algunos piquituertos volando, aunque no se podía identificar la especie.

CAMACHUELO CARMINOSO (*Carpodacus erythrinus*), algunos en los setos de Vartsilla, sobre todo en el camino que había pasada la iglesia, camino muy interesante entre sauces, setos...

ESCRIBANO PALUSTRE (*Emberiza schoeniclus*), uno en Varanger, en la tundra, y un macho en la zona de los pigmeos, en Finlandia, cerca de Ivalo; también en Tohmaharvi (Finlandia), a las afueras de la iglesia, zona de jardines, donde estaba cebando jóvenes

ESCRIBANO LAPÓN (*Calcarius lapponicus*), un inmaduro en tundra en la carretera de Berlevag, y una pareja en plumaje nupcial en la tundra en el acceso a la colonia de marinas de Ekkeroy.

ESCRIBANO PIGMEO (*Emberiza pusilla*), visto en la carretera de Murmansk, desde Ivalo, cerca de donde lo cita Gosney. Las coordenadas que aparecen en el Gosney son 68.6784N 27.6305E. Dichas coordenadas corresponden a un punto en esa carretera de Ivalo a Murmansk, pero nosotros los vimos unos 100-200 metros más adelante. En ambas ocasiones había jóvenes y adultos, cebando estos a los pollos volanderos. La mañana del día 14, había un mínimo de tres parejas en un espacio reducido. El paisaje era de árboles dispersos en un suelo en parte húmedo y cubierto de arbustos bajos.

ESCRIBANO CERILLO (*Emberiza citrinella*), alguno en la zona de Vartsila, en bosques claros de caducifolios.

En cuanto a mamíferos, vimos alce en dos ocasiones, varios lemmings, algún topillo, varias ardillas y un perro mapache. En Varanger se vieron aletas de cetáceos que no pudimos identificar.