

Tailandia en el mes de Julio

2007 y 2010

Ferran López

Durante los últimos años Tailandia se ha consolidado como uno de los grandes lugares para llevar a cabo un birding de invierno. Entre varias razones, destaca la gran variedad de aves invernantes en esta región del Sudeste Asiático, donde se llega a obtener un número sustancialmente elevado de especies en pocos días sin necesidad de desplazarse distancias excesivamente grandes. Esta razón, combinada con la ventaja de unos costes muy bajos, los cuales se incluyen los vuelos internos, hace que los birders más indecisos finalmente caigan en la tentación. Otro de los grandes alicientes para llevar a cabo una visita invernal es la observación casi asegurada del Correlimos cucharita *Eurynorhynchus pygmeus* en Samut Sakhon, a unos 40 Km. al sur de la capital. Se trata de uno de los pocos lugares estratégicos del mundo donde poder observar este peculiar limícola tan amenazado. Investigaciones recientes durante el año 2010 han descubierto que una de las principales razones de su alarmante declive se debe a la caza indiscriminada en sus áreas de invernada en el país vecino de Birmania <http://www.shorebird-network.net/PDFs/Sbs-WSG-article.pdf>.

Pero aún conociendo todos estos sustanciosos condicionantes, un viaje a Tailandia durante los meses de verano puede resultar también muy provechoso. Los costes son un más bajos ya que viajaremos en temporada de lluvias y, aunque coincidiremos con bastantes turistas, no es comparable a la masificación que uno puede encontrarse durante los meses de invierno. Las lluvias en esta región del sudeste asiático no suponen un problema y suelen ser muy poco duraderas. Durante mis dos visitas en esta época he podido comprobar varias mini tormentas que nunca han superado la hora de duración aunque si fueron algo intensas. El país está muy adaptado al turismo haciendo que las gestiones diarias se resuelvan en pocos minutos y sin ningún esfuerzo. Por poner un ejemplo, uno puede salir a cenar tranquilamente por el barrio de Banglampoo de la capital y al mismo tiempo comprar los billetes de avión para tu próximo vuelo nacional de la mañana siguiente y, además, reservar tu taxi para que te recoja a la puerta de tu hotel para ir al aeropuerto. Todo sin ningún coste adicional, siempre y cuando lo hagas en uno de los muchos puestos turísticos oficiales. Todas estas facilidades y más, ayudan a ahorrar un valioso tiempo que luego puedes invertir en la visita de cualquiera de los muchos parques naturales o para chequear con mayor intensidad en busca de algún endemismo o especialidad como sucede con el *Pitta gurneyi* en la Reserva de Khao Nor Chuchi. Antes del año 2003, se creía que esta especie era un endemismo tailandés pero gracias a diferentes prospecciones llevadas a cabo en la parte sur de Birmania se localizó en al menos 4 localidades diferentes dentro de la región de Tenasserim <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=4003>).

Por tanto, para todos aquellos que no pueden realizar sus vacaciones fuera de los típicos meses de veraniegos, se trata de una excelente opción, ideal para combinar con tu pareja ya que es muy factible hacer un “mixt” entre ornitología y turismo convencional. Es posible visitar no solo las zonas más típicas y conocidas sino que también los parajes naturales más espectaculares, como es el caso de la famosa isla Kho Phi Phi Lee, donde Leonardo Di Caprio rodó la película The Beach o Khao Yai National Park, uno de los parques más extensos y mejor conservados de todo el sudoeste asiático.

Khao Nor Chuchi Birdlife Sanctuary (N7.92408 E99.25908)

Esta pequeña reserva es uno de los lugares más conocidos donde poder ver el Gurney's Pitta *Pitta gurney*. Se encuentra a unos 50 minutos en coche de la población de Krabi dirección sur o a unos 40 minutos desde el mismo aeropuerto de Krabi. Puedes negociar el precio con los taxis pero lo normal es acabar pagando entre 800 y 1000 Bahts por trayecto (entre 19 y 24 euros). Aunque muchos desconocen la reserva natural, si que conocen el Morakot Resort (N7.92220 E99.25374), sin lugar a dudas la mejor opción para alojarse si uno desea pasar la noche allí. Este pequeño resort situado a unos 500 metros de la entrada del parque está formado por unos pocos bungalows con aire acondicionado y baño en el interior y que están situados en el mismo jardín del complejo. En él, al margen de otras tantas especies, era fácil observar algún que otro ejemplar de Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis*. Su cocina es excepcional y sus precios son muy económicos 550 Bahts por bungalow/noche. Aunque en esta época de año no suelen haber mucha ocupación, uno puede reservar con antelación en la siguiente dirección de mail: pittagurney@yahoo.com. En la recepción hay un par de libros donde los birders dejan escritas sus observaciones recientes siendo de gran utilidad para estar al corriente de donde se ha visto últimamente el *Pitta gurney*. Es recomendable pedir en la recepción una fotocopia del mapa de la reserva.

La opción menos económica pero más segura para ver el Pitta es contratar los servicios de Mr. Yothin Meekaeo, quien tiene escondido un pequeño hide justo delante de una de las parejas. Mi opción fue prescindir de los servicios de Yothin e intentar por mi mismo encontrarlo. Tras dos días de intensa búsqueda finalmente apareció en el B-Trail en la siguiente coordenada: N7.92688 E99.26012. Además también pude ver el Banded Pitta *Pitta guajana* en la misma pista en la siguiente coordenada N7.92762 E99.26050 y Green Broadbill *Calyptomena viridis* en N7.93453 E99.26573. Desconozco si los lugares de las coordenadas son territorios de respectivas especies pero quizás puedan servir de orientación.

Es importante evitar KNC durante los fines de semana ya que muchas son las familias tailandesas que, escandalosamente, se acercan a las dos piscinas naturales (Emerald Pool y Blue Pool) que se encuentran en el interior de la reserva. No está permitido entrar comida dentro de la reserva (agua si) y a partir de las 08:00h de la mañana te cobran la entrada. Se puede entrar gratuitamente si se accede antes de esta hora, hecho altamente aconsejable, que te permite aprovechar las primeras horas de luz cuando la actividad de los pájaros es muy elevada.

Khao Phanom Bencha National Park

El parque está situado a unos 21 Km. al norte de la población de Krabi. Un taxi es la mejor opción para llegar ya que no hay transporte público que te lleve. Es importante saber que en el interior del parque tampoco hay alojamiento ni restaurantes y, por tanto, es necesario llevarse algo de comida y bebida. También es necesario pactar con el taxista una hora de recogida. La entrada al parque cuesta 400 Bahts y protege una zona de pluvisilva virgen de las partes más altas de Khao Phanom Bencha. Un día entero

puede resultar muy productivo sobretodo si se prospecta los jardines de la misma entrada donde se concentra gran variedad de especies a primera hora de la mañana. Los diferentes caminos que te llevan a las cascadas son también muy interesantes. Se trata también de una zona muy frecuentada por los turistas y por tanto, es mejor visitarlo evitando el fin de semana.

Khao Yai National Park (N14.50918 E101.37797)

Alberga uno de los mayores bosques monzónicos y mejor conservados de todo el sureste asiático continental considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con una extensión de 2168 Kilómetros cuadrados acoge hasta cinco hábitats diferentes en función de la altitud (máxima 1351 m): bosque pluvial perennifolio, bosque pluvial semiperennifolio bosque caducifolio mixto, bosque perennifolio de montaña y, sabana y bosque de crecimiento secundario. La entrada cuesta 400 Baths y su horario es de 08:00 a 20:00h siempre y cuando no duermas en los bungalows del interior del parque. Es muy recomendable comprar un par de calcetines anti-sanguijuelas en el centro de información situado en N14.43945 E101.37103.

Se calcula una población de unos 250 Elefantes *Elephas maximus* que pueden ser vistos durante todo el año y en cualquier momento cruzando las diferentes pistas del parque, aunque durante los meses de noviembre y diciembre su posibilidad aumenta de forma notable. Aunque los últimos censos de 1999 y 2000, con cámaras nocturnas, estimaron una población de unos 10 Tigres *Panthera tigris* en el interior del parque, su observación se hace casi imposible. Es relativamente fácil observar Common Barking Deer *Muntiacus muntjak* y Sambar *Cervus unicolor*. La población de Gaur *Bos gaurus* se estima sobre los 100 ejemplares pero sus hábitos nocturnos hace muy difícil su observación. Es habitual encontrarse en medio de las pistas grupos familiares de Pig-tailed Macaque *Macaca nemestrina* y por los diferentes recorridos por la selva se suele ver sin muchas dificultades Pileated Gibbon *Hylobates pileatus* y White-handed Gibon *Hylobates lar*.



Macaca nemestrina, Khao Yai National Park © Ferran López



Hylobates lar, Khao Yai National Park © Ferran López



Macaca nemestrina, Khao Yai National Park © Ferran López

Sorprende la facilidad para observar tres especies de calaos, **Oriental Pied Hornbill** *Anthracoceros albirostris*, **Great Hornbill** *Buceros bicornis* y **Wreathed Hornbill** *Aceros undulatus*.

La mejor opción para llegar desde la capital es ir en autobús y parar en el pueblo Pak Chong (unas 2:30h de trayecto) en la siguiente coordenada N14.70875 E101.41681, aunque también es posible ir en tren, mucho más lento. Una vez en el pueblo, los diferentes caza-turistas te abordan para que elijas su hotel. Llega entonces la hora de negociar precios en función de lo que a uno le interese. La carretera que sube hacia el parque está plagada de numerosos hoteles de gran variedad y que te permiten contratar allí mismo los servicios de guía para los diferentes tours.

Merece la pena acercarse a última hora de la tarde a una de las diferentes cuevas para ver la salida en masa de millones de murciélagos. Una de esas cuevas se encuentra fuera de los límites del parque, en la siguiente coordenada N14.55082 E101.54222, y por tanto no requiere contratar un guía.



Alrededores de Khao Yai National Park © Ferran López

KY – Khao Yai National Park
KR – Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary
DI – Doi Inthanon National Park
KP – Khao Phanom Bencha National Park
AN – Ao Nang
KR – Krabi mangroves (y alrededores)
CM – Chiang Mai (y alrededores)
KI – Kho Phi Phi Islands
BK – Bangkok (ciudad)
SS – Samut Sakhon

Lista de Aves

Barred Buttonquail <i>Turnix suscitator</i>	KY
Lesser Whistling-Duck <i>Dendrocygna javanica</i>	KY
Rufous Piculet <i>Sasia abnormis</i>	KN
Common Flameback <i>Dinopium javanense</i>	KY
Green-eared Barbet <i>Megalaima faiostricta</i>	KY
Gold-whiskered Barbet <i>Megalaima chrysopogon</i>	KP
Moustached Barbet <i>Megalaima incognita</i>	KY



Megalaima incognita, Khao Yai National Park © Ferran López

Blue-eared Barbet *Megalaima australis*
Red-crowned Barbet *Megalaima rafflesii*
Red-throated Barbet *Megalaima mystacophanos*

DI
KP
KN



Megalaima mystacophanos, Khao Phanom Bencha National Park © Ferran López

Brown Barbet *Calorhamphus fuliginosus*
Oriental Pied Hornbill *Anthracoceros albirostris*
Great Hornbill *Buceros bicornis*

KP
AN
KY





Anthracoceros albirostris, Ao Nang y *Buceros bicornis*, Khao Yai National Park © Ferran López

Wreathed Hornbill *Aceros undulatus*

KY

Red-headed Trogon *Harpactes erythrocephalus*

KY

Brown-winged Kingfisher *Halcyon amauroptera*

KM



Halcyon amauroptera, Crabi mangroves © Ferran López

White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis*

KN

Collared Kingfisher *Todirhamphus chloris*

AN



Todirhamphus chloris, Samut Sakhon © Ferran López

Rufous-backed kingfisher <i>Ceyx rufidorsa</i>	KN
Blue-bearded Bee-eater <i>Nyctyornis athertoni</i>	KY
Green Bee-eater <i>Merops orientalis</i>	CM
Greater Coucal <i>Centropus sinensis</i>	KN
Lesser Coucal <i>Centropus bengalensis</i>	KY
Banded Bay Cuckoo <i>Cacomantis sonneratii</i>	KP
Plaintive Cuckoo <i>Cacomantis merulinus</i>	KP
Asian Koel <i>Eudynamys scolopacea</i>	KY
Green-billed Malkoha <i>Phaenicophaeus tristis</i>	KY
Chestnut-breasted Malkoha <i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	KN
Indian Roller <i>Coracias benghalensis</i>	KY
Dollarbird <i>Eurystomus orientalis</i>	KY
Red-breasted Parakeet <i>Psittacula alexandri</i>	KY
Common Hoopoe <i>Upupa epops</i>	CM
Himalayan Swiftlet <i>Collocalia brevirostris</i>	DI
Black-nest Swiftlet <i>Collocalia maxima</i>	KN
Germain's Swiftlet <i>Collocalia germani</i>	KI
Silver-rumped Needletail <i>Rhaphidura leucopygialis</i>	KN
Asian Palm Swift <i>Cypsiurus balasiensis</i>	AN
House Swift <i>Apus affinis</i>	BK
Brown-backed Needletail <i>Hirundapus giganteus</i>	KY



Hirundapus giganteus, Khao Yai National Park © Ferran López

Grey-rumped Treeswift <i>Hemiprocnis longipennis</i>	KN
Crested Treeswift <i>Hemiprocnis coronata</i>	CM
Rock Pigeon <i>Columba livia</i>	BK
Pied Imperial Pigeon <i>Ducula bicolor</i>	KI

Spotted Dove *Streptopelia chinensis*
Red-collared Dove *Streptopelia tranquebarica*

BK
BK



Streptopelia tranquebarica, Chiang Mai © Ferran López

Barred Cuckoo Dove <i>Macropygia unchall</i>	DI
Peaceful Dove <i>Geopelia striata</i>	BK
Thick-billed Green Pigeon <i>Treron curvirostra</i>	KN
Emerald Dove <i>Chalcophaps indica</i>	KY
Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>	SS
Asian Dowitcher <i>Limnodromus semipalmatus</i>	SS
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	SS
Eurasian Curlew <i>Numenius arquata</i>	SS
Spotted Redshank <i>Tringa erythropus</i>	SS
Common Redshank <i>Tringa totanus</i>	SS
Marsh Sandpiper <i>Tringa stagnatilis</i>	SS
Common Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	SS
Red Knot <i>Calidris canutus</i>	SS
Red-necked Stint <i>Calidris ruficollis</i>	SS
Dunlin <i>Calidris alpina</i>	SS
Black-winged Stint <i>Himantopus himantopus</i>	SS
Oriental Pratincole <i>Glareola maldivarum</i>	BK
Lesser Sand Plover <i>Charadrius mongolus</i>	SS
Greater Sand Plover <i>Charadrius leschenaultii</i>	SS
Pacific Golden Plover <i>Pluvialis fulva</i>	SS
Red-wattled Lapwing <i>Vanellus indicus</i>	SS
Bridled Tern <i>Sterna anaethetus</i>	KI



Sterna anaethetus, Islas Kho Phi Phi © Ferran López

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis*

KI

Common Tern *Sterna hirundo*

KI

Black-naped Tern *Sterna sumatrana*

KI

Little Tern *Sterna albifrons*

SS

Black Eagle *Ictinaetus malayensis*

KY



Ictinaetus malayensis, Khao Yai National Park © Ferran López

Black Kite *Milvus migrans*

KY

Brahminy Kite *Haliastur indus*

KM



Haliastur indus, Crabi mangroves © Ferran López

White-bellied Sea Eagle *Haliaeetus leucogaster*

KI



Haliaeetus leucogaster, Kho Phi Phi Islands © Ferran López

Crested Goshawk *Accipiter trivirgatus*

KR

Crested Serpent Eagle *Spilornis cheela*

KY

Rufous-bellied Eagle *Hieraeetus kienerii*

DI

Mountain Hawk Eagle *Spizaetus nipalensis*

DI

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

SS

Little Cormorant *Phalacrocorax niger*

SS

Indian Cormorant *Phalacrocorax fuscicollis*

SS

Little Egret *Egretta garzetta*

SS

Pacific Reef Heron *Egretta sacra*

KI



Egretta sacra, Kho Phi Phi Islands © Ferran López

Great White Egret <i>Egretta alba</i>	SS
Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	SS
Javan Pond Heron <i>Ardeola speciosa</i>	SS
Black-crowned Night Heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	SS
Little Heron <i>Butorides striatus</i>	SS
Cinnamon Bittern <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	DI
Milky Stork <i>Mycteria cinerea</i>	BK
Asian Openbill <i>Anastomus oscitans</i>	BK
Great Frigatebird <i>Fregata minor</i>	KI
Banded Pitta <i>Pitta guajana</i>	KR
Gurney's Pitta <i>Pitta gurneyi</i>	KR



Pitta gurneyi, Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis*
Green Broadbill *Calyptomena viridis*

KR
KR



Calyptomena viridis, Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Lesser Green Leafbird *Chloropsis cyanopogon*
Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis*

KP
KY



Chloropsis cochinchinensis, Khao Yai National Park © Ferran López

Golden-fronted Leafbird *Chloropsis aurifrons*
Asian Fairy Bluebird *Irena puella*
Long-tailed Shrike *Lanius schach*
Black Drongo *Dicrurus macrocercus*
Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus*
Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos*
Red-billed Blue Magpie *Urocissa erythrorhyncha*
Common Green Magpie *Cissa chinensis*
Black-naped Oriole *Oriolus chinensis*
Scarlet Minivet *Pericrocotus flammeus*
Yellow-bellied Fantail *Rhipidura hypoxantha*

KY
KP
BK
BK
KI
BK
DI
DI
SS
KY
DI



Rhipidura hypoxantha, Doi Inthanon National Park © Ferran López

Pied Fantail *Rhipidura javanica*

Common Iora *Aegithina tiphia*

Great Iora *Aegithina lafresnayei*

Black-naped Monarch *Hypothymis azurea*

BK

AN

KR

KR






Hypothymys azurea, Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Asian Paradise-Flycatcher *Terpsiphone paradisi*

KR





Terpsiphone paradisi (adulto y un pollo), Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Blue Rock Thrush *Monticola solitarius*
Blue Whistling Thrush *Myophonus caeruleus*
Snowy-browed Flycatcher *Ficedula hyperythra*

KI
 KI
 DI



Ficedula hyperythra, Doi Inthanon National Park © Ferran López

Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae*

KI



Cyornis tickelliae, Kho Phi Phi Islands © Ferran López

Grey-headed Canary Flycatcher *Culicicapa ceylonensis*

KY

Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis*

BK



Copsychus saularis, Samut Sakhon © Ferran López

White-rumped Shama *Copsychus malabaricus*

CM



Copsychus malabaricus, Chiang Mai © Ferran López

White-browed Shortwing *Brachypteryx montana*

DI



Brachypteryx montana, Doi Inthanon National Park © Ferran López

Chestnut-naped Forktail *Enicurus ruficapillus*
Pied Bushchat *Saxicola caprata*

KP
KY

Asian Glossy Starling <i>Aplonis panayensis</i>	KP
Ashy Woodswallow <i>Artamus fuscus</i>	KY
Asian Pied Starling <i>Sturnus contra</i>	BK
Black-collared Starling <i>Stunus nigricollis</i>	BK
Common Myna <i>Acridotheres tristis</i>	BK
White-vented Myna <i>Acridotheres grandis</i>	BK
Hill Myna <i>Gracula religiosa</i>	DI
Yellow-cheeked Tit <i>Parus spilonotus</i>	DI
Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i>	BK
Pacific Swallow <i>Hirundo tahitica</i>	KM
Red-rumped Swallow <i>Hirundo daurica</i>	BK
Black-headed Bulbul <i>Pycnonotus atriceps</i>	KI
Black-crested Bulbul <i>Pycnonotus melanicterus</i>	DI
Red-whiskered Bulbul <i>Pycnonotus jocosus</i>	CM



Pycnonotus jocosus, Chiang Mai © Ferran López

Sooty-headed Bulbul <i>Pycnonotus aurigaster</i>	CM
---	----



Pycnonotus aurigaster, Bangkok © Ferran López

Puff-backed Bulbul <i>Pycnonotus eutilotus</i>	KR
Stripe-throated Bulbul <i>Pycnonotus finlaysoni</i>	KI
Yellow-vented Bulbul <i>Pycnonotus goiavier</i>	KI
Streak-eared Bulbul <i>Pycnonotus blanfordi</i>	CM



Pycnonotus blanfordi, Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Red-eyed Bulbul <i>Pycnonotus brunneus</i>	KR
Spectacled Bulbul <i>Pycnonotus erythrophthalmos</i>	KP
Buff-vented Bulbul <i>Iole olivacea</i>	KP
Puff-throated Bulbul <i>Alophoixus pallidus</i>	DI
Ochraceous Bulbul <i>Alophoixus ochraceus</i>	KR
Grey-cheeked Bulbul <i>Alophoixus bres</i>	KR
Yellow-bellied Bulbul <i>Alophoixus phaeocephalus</i>	KR
Ashy Bulbul <i>Hemixos flavala</i>	DI
Golden-bellied Gerygone <i>Gerygone sulphurea</i>	KP
Zitting Cisticola <i>Cisticola juncidis</i>	BK
Rufescent Prinia <i>Prinia rufescens</i>	SS
Plain Prinia <i>Prinia inornata</i>	SS
Common Tailorbird <i>Orthotomus sutorius</i>	CM
Ashy-throated Warbler <i>Phylloscopus maculipennis</i>	DI



Phylloscopus maculipennis, Doi Inthanon National Park © Ferran López

White-tailed Leaf Warbler *Phylloscopus davisoni*
Oriental White-eye *Zosterops palpebrosus*

DI
KY



Zosterops palpebrosus, Khao Yai National Park © Ferran López

Black-throated Laughingthrush *Garrulax chinensis*
Chestnut-crowned Laughingthrush *Garrulax erythrocephalus*
Abbott's Babbler *Malacocincla abbotti*
Buff-breasted Babbler *Pellorneum tickelli*
Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps*
Black-capped Babbler *Pellorneum capistratum*
Coral-billed Scimitar Babbler *Pomathorinus ferruginosus*
Large Wren Babbler *Napothera macrodactyla*
Ferruginous Babbler *Trichastoma bicolor*
Striped Tit Babbler *Macronous gularis*
Rufous-fronted Babbler *Stachyris rufifrons*
Chestnut-rumped Babbler *Stachyris maculata*
Chestnut-winged Babbler *Stachyris erythroptera*
Chestnut-tailed Minla *Minla strigula*

KY
DI
BK
DI
DI
KR
KY
KR
KR
KR
DI
KR
KR
DI



Minla strigula, Doi Inthanon National Park © Ferran López

Rufous-winged Fulvetta *Alcippe castaneiceps*
White-bellied Yuhina *Yuhina zantholeuca*
Dark-backed Sibia *Heterophasia melanoleuca*

DI
KY
DI



Heterophasia melanoleuca, Doi Inthanon National Park © Ferran López

Scarlet-breasted Flowerpecker *Prionochilus thoracicus*
Orange-bellied Flowerpecker *Dicaeum trigonostigma*
Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum*

KP
KP
BK



Dicaeum cruentatum (juv.), Khao Nor Chuchi Wildlife Sanctuary © Ferran López

Purple-naped Sunbird *Hypogramma hypogrammicum*
Plain Sunbird *Anthreptes simplex*
Brown-throated Sunbird *Anthreptes malacensis*

KR
KR
KI

Copper-throated Sunbird *Nectarinia calcostetha*
Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis*

KI
CM



Nectarinia jugularis (macho y hembra), Kho Phi Phi Islands © Ferran López

Crimson Sunbird *Aethopyga siparaja*
Green-tailed Sunbird *Aethopyga nipalensis*
Little Spiderhunter *Arachnothera longirostra*
Yellow-eared Spiderhunter *Arachnothera chrysogenys*
Grey-breasted Spiderhunter *Arachnothera affinis*
Paddyfield Pipit *Anthus rufulus*
Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus*
White-rumped Munia *Lonchura striata*
White-bellied Munia *Lonchura leucogastra*
Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata*

DI
KR
KP
KR
KP
KM
CM
KR
KR
DI

- Sompong Srikosamatara & Troy Hansel 2004 (3th edition). Mammals of Khao Yai National Park.
- Zöckler, C., Htin Hla, T., Clark, N., Syroechkovskiy, E., Yakushev, N., Daengphayon, S. & Robinson, R. 2010. Hunting in Myanmar is probably the main cause of the decline of the Spoon-billed Sandpiper *Calidris pygmeus*. *Wader Study Group Bull.* 117(1): 1–8.



Ferran López Sanz: ferranlopez@hotmail.com