

SOUTH-WESTERN AUSTRALIA MAYO 2014

María José Valencia Sánchez-Arévalo (majovet7@hotmail.com)

Tras una estancia de 10 meses pajareando en Australia, a mi regreso a España decidí preparar reports de cada una de las zonas visitadas. He comenzado por la última que visité, Western Australia, que es el mayor de los estados australianos, ocupando toda la parte occidental del país. Allá visité solamente localidades del suroeste del estado, en donde concentré los esfuerzos en intentar ver todas las aves endémicas y subespecies propias de la zona, así como algunas otras que en este área resultan más fáciles observar y se me habían escapado en otras regiones de Australia.

En posteriores reports comentaré otros estados (Queensland, Victoria, etc...) donde estuve de pajareo.

He escrito con letra negrita cada vez que observé por primera vez las aves que iba buscando.

Mis días de pajareo fueron distribuidos de la siguiente manera:

-Pajareo alrededor de la casa donde estuve alojada durante una semana con unos amigos. Se encontraba en Kalamunda (este de Perth), donde pude disfrutar de las primeras endémicas.

-Durante un día entero ruta por los alrededores de Perth con un ornitólogo local.

- 5 días alquiler de caravana y me dirigí hacia la zona más al sudoeste del país, zona imprescindible.

Intenté realizar una salida pelágica desde Albany pero debido a la escasez de ornitólogos en la zona solo se realizan dos por año, por lo que no coincidió con las fechas en las que yo estuve.

El pajareo por la zona no me resultó difícil, a pesar de la dificultad de algunas de estas aves, pero también he de decir que contaba con información bastante precisa y reciente de los sitios. Fueron de gran ayuda tanto trip reports leídos en diferentes blogs y webs (<http://www.cloudbirders.com>), como la información recibida de amigos australianos que ya habían visitado la zona con anterioridad (Scott Baker y John Weigel) así como la recibida por parte de ornitólogos locales (John Graff y Nigel Jackett). No considero imprescindible un guía.

El mes de mayo (otoño austral) no es mala época para visitar la zona, aunque no la mejor, ya que south-western Australia es famosa por su primavera, por la preciosidad de sus árboles en flor. Hablando ornitológicamente es buena época ya que la temperatura es agradable, no habiendo altas temperaturas durante el día, que te permiten pajarear durante todas las horas de luz, aunque cuidado porque las primeras y últimas horas del día si hace más frío.

Los lugares a visitar son de fácil acceso sin necesidad de utilizar un vehículo 4x4. Hay que ir provisto de alimentación y bebida ya que los lugares son algo remotos sin restaurantes ni supermercados cercanos.

La zona sur de Western Australia es la más turística por lo que encuentras campings y hoteles para dormir sin problema, eso sí, puede ocurrir que te encuentres tu

solo en ellos como me pasó a mi todas las noches. Cuidado! Que allí los horarios son muy distintos a España y generalmente todo se encuentran cerrado a partir de las 18.00, eso si, si se llama por teléfono con antelación se llega a un acuerdo sin ningún tipo de problemas.

No tuve acceso a Internet ni cobertura telefónica en los días que estuve por la zona sur. Al ser la zona más alejada de Australia y ser turística los precios son más altos, tanto gasolina, dormir, comida...(siendo ya éste, de por sí, un país bastante caro)

ITINERARIO:

- 05/05/14: Kalamunda
- 07/05/14: alrededores de Perth (Victoria Dam, Collins Road, Northam)
- 12/05/14: Dryandra NP
- 13/05/14: Stirling Ranges NP y Cheynes Beach
- 14/05/14: Cheynes Beach
- 15/05/14: Cheynes Beach
- 16/05/14: Two Peoples Bay y Albany
- 17/05/14: diferentes paradas en sitios de camino a Perth.

05/05/14: KALAMUNDA

Suburbio de Perth, se encuentra al este de la ciudad. Es un área de importancia para las aves, reconocido por BirdLife International, sobre todo por ser zona de Baudin's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*)(ave endémica escasa).

Aquí tuve mi primer contacto con las aves del western y pude ver mis primeros bimbos endémicos: **Red-capped Parrot** (*Purpureicephalus spurius*), **Western Spinebill** (*Acanthorhynchus tenuirostris*) y **Baudin's Black-cockatoo** (*Calyptorhynchus baudinii*).

Los dos primeros son aves fáciles y comunes de observar en el área, fueron especies vistas la mayoría de los días que estuve por dicha zona y por el sur de WA.

Sin embargo Baudin's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) resulta cada vez más difícil poder localizarlos y disfrutar de ellos. Tuve la suerte de encontrar un dormidero muy cercano a la casa donde me alojaba, por lo que todos los días al atardecer me deleitaban con sus cantos rumbo al lugar donde pernoctarían. Importante saber diferenciarlos de sus parecidos Carnaby's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*), aquí os dejo un enlace en el que explica con todo detalle como aprender a distinguirlos: <http://wabirdingblog.blogspot.com.au/2011/04/id-feature-white-tailed-black-cockatoos.html>

Otras aves destacadas en la zona: Australasian Ringneck (ssp) (*Barnardius zonarius*), Laughing Kookaburra (*Dacelo novaeguineae*), Spotted Pardalote (*Pardalotus punctatus*), etc..



Baudin's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*)



Baudin's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*)

07/05/14: ALREDEDORES PERTH

Este día estuve pajareando con Nigel Jakett, con el cual contacté previamente a través de Birding Pal (<http://www.birdingpal.org/>). Planificamos la ruta para poder observar el mayor número de endémicas o nuevas para mi lista australiana en zonas no muy lejanas a Perth. Utilizamos su propio vehículo.

Nuestra primera parada fue Victoria Dam, presa que suministra agua a Perth. Cuenta con una zona de baños, picnic, paseo arbolado.... Por lo que aquí podemos encontrar la mayoría de las endémicas. También llamada Victoria Reservoir por el éxito que suele tenerse cuando le dedicas tiempo a esta zona. Se encuentra a 37.5 km al este de Perth.

Especies nuevas: **Western Thornbill** (*Acanthiza inornata*), **Red-winged Fairy-wren** (*Malurus elegans*) y **Western White-naped Honeyeater** (*Melithreptus whitlocki*).

Estuvimos buscando sin éxito Red-eared Firetail (*Stagonopleura oculata*), sitio típico cerca de Perth.

También pudimos observar otras endémicas como Western Spinebill (*Acanthorhynchus superciliosus*) y Red-capped Parrot (*Purpureicephalus spurius*), a destacar un bonito macho de Scarlet Robin (*Petroica boodang*) y Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*) que estuvo sobrevolando nuestras cabezas durante más de cinco minutos.

Continuamos la ruta hasta llegar a Collins Rd. en la cual fuimos haciendo diferentes paradas breves a ambos lados de la carretera. Parábamos y andábamos unos cientos de metros hasta que localizábamos o escuchábamos ciertas especies. Nuestra primera parada fue fructífera ya que observamos a placer (a escasos 50m) una pareja de Painted Buttonquail (*Turnix varius*) (especie bastante esquiva) y **Blue-breasted Fairy-wren** (*Malurus pulcherrimus*). Continuamos y la segunda parada la hicimos ya que desde el coche pudimos escuchar el canto de **Rufous Treecreeper** (*Climacteris rufus*), bajamos y rápidamente pudimos localizar un individuo que se alejó al vernos pero continuamos andando y localizamos otras dos parejas.



Rufous Treecreeper (*Climacteris rufus*)

El día estaba siendo exitoso pero se convirtió en más aún cuando de repente Nigel pudo escuchar **Western Crested Shrike-tit** (*Falcunculus frontatus*, *race leucogaster*), alzamos nuestros prismáticos y ahí estaba, un bonito ejemplar que nos deleitó con su música y del que estuvimos disfrutando más de cinco minutos.

La tercera parada la hicimos un par de kilómetros después de la anterior. En ésta observamos una pareja de **Western Rosella** (*Platycercus icterotis*) y un bonito **Western Yellow Robin** (*Eopsaltria griseogularis*).



Western Rosella (*Platycercus icterotis*)

Decidimos continuar la ruta en busca de nuestras últimas endémicas del día. Nos dirigíamos hacia Northam cuando de repente encontramos un bando de loros en un árbol cercano a la carretera, paramos y ...ahí estaban! **Regent Parrot** (*Polytelis anthopeplus*), un bando de unos 10 aprox, bastantes confiados con nosotros y de los cuales pudimos tomar buenas fotografías.

Llegamos hasta el pueblo de Northam (97 km al NE de Perth) ya que en ocasiones se pueden ver bandos de Western Corellas (*Cacatua pastinator*) alrededor del parque, campo de fútbol...Esta vez no tuvimos éxito, pero ya que estábamos en el sitio aproveché para sumarme dos especies nuevas a mi lista australiana: White Swan (*Cygnus olor*) en el lago del parque de la pequeña ciudad, donde cría desde hace varias décadas y Laughing Dove (*Streptopelia senegalensis*) sobrevolando un bando por una de las calles de la ciudad.

No nos queríamos rendir y quedarnos sin ver la bonita pero a veces confusa Corella, por lo que continuamos la carretera dirección York donde tuvimos que parar a chequear varios bandos de miles de Corellas hasta que encontramos uno en el que por fin el

bando era mixto, por lo que TICK!! **Western Corella (subespecie norte)** (*Cacatua pastinator*). Una vez que vimos tranquilamente las diferencias con las otras dos presentes en el área, continuamos de vuelta a casa, el día estaba siendo agotador.

Pero la grata sorpresa llegó cuando atravesando una pequeña aldea pudimos escuchar y ver bandos de Black-cockatoo, decidimos parar por si acaso y....tachan! **Carnaby's Black-cockatoo** (*Calyptorhynchus latirostris*)! Volvimos hacia casa, que aún nos quedaba otra hora de coche.



Western Corella (*Cacatua pastinator*)

12/05/2014:

Recogí la furgoneta de alquiler y con mucho entusiasmo y nerviosismo comencé mi ruta marcada. Iban a ser 5 días y medio de intenso pajareo por mi misma. Tenía por delante muchos kilómetros por recorrer, muchos lugares por visitar, gente por conocer y varias aves difíciles y esquivas que localizar.

La furgoneta-caravana era sencilla y pequeña, no necesitaba mucho más. Disponía de la parte de atrás que se convertía en cama (no la desmonté en ningún momento), pequeño frigorífico, utensilios básicos de cocina, hornillo, fregadero... Suficiente para permitirme dormir en ella sin necesidad de buscar ningún hostel.

La meteorología no me acompañó durante este primer día, ya que se pasó todo el día lloviendo a mares. No me permitió realizar mucho pajareo de a pie, pero al menos pude hacerlo desde el coche y disfruté de los paisajes.

Mi primera parada fue en Dryandra cuyo objetivo era **Elegant Parrot** (*Neophema elegans*), conseguido con éxito entre la lluvia al principio de uno de los recorridos que duraba 2 km. Con el coche hice bastantes recorridos intentando buscar Numbat (marsupial en peligro de extinción) cuya única población persiste entre estos bosques. Debido a la dificultad del objetivo y que la meteorología no era buena decidí continuar el camino. Entre otros mamíferos pude disfrutar de un bonito equidna.



Short-toed Echidna (*Tachyglossus aculeatus*)

Me dirigí a Starling Ranger para dormir en Mt Trio carpark (<http://mttrio.com.au/>), donde llegué bien entrada la noche. Por el camino pude observar un par de Eastern Barn Owl (*Tyto delicatula*). El camping es muy sencillo pero tiene lo suficiente: cocina, duchas con agua caliente...

13/05/2014:

Comencé el día pajareando por los alrededores del carpark, estuve 2 horas aproximadamente haciendo diferentes caminatas, ya que el día había amanecido soleado. Estuve bastante ocupada y distraída debido a la gran cantidad de aves que revoloteaban la zona que no me dejaban descansar ni un minuto. Pude disfrutar de la mayoría de las aves endémicas observadas anteriormente y de un gran número de no endémicas. Debido a que la especie que me había llevado hasta allí no aparecía, decidí cambiar de punto a ver si tenía más suerte. Me dirigí hacia Camel Lakes y tras cinco minutos de espera pude escuchar un ejemplar de **Rufous (Western) Fieldwren**

(*Calamanthus fuliginosus*), acto seguido pude localizarlo y estuve disfrutando de él casi media hora. Me dejó acercarme bastante y no se presentó esquivo. A pesar de la facilidad con la que lo vi, he de decir que es una de las especies más difíciles de buscar en south-western Australia. En ese mismo punto pude disfrutar de mi primer individuo de **Tawny-crowned Honeyeater** (*Glyciphila melanops*).



Rufous (Western) Fieldwren (*Calamanthus fuliginosus*)



Camel Lakes (Starling Ranger)

Con el objetivo conseguido, habiendo pajareado casi tres horas por la zona y haber visto gran cantidad de especies, decidí dirigirme a Cheyne Beach con el fin de llegar con algo de luz y familiarizarme con el entorno.



Western Grey Kangaroo (*Macropus fuliginosus*) (Cheynes Beach)

Llegué al camping de Cheynes Beach donde en recepción me dieron un mapa de la zona y me explicaron las localizaciones más frecuentes donde se suelen observar las especies estrellas del lugar: Noisy Scrub-bird, Western Bristlebird y Western Whipbird.

Me quedaba apenas media hora de luz, pero fue bien aprovechada, pude ver más de 30 especies y una de las especialidades: **Western Bristlebird** (*Dasyornis longirostris*). Lo escuché a lo lejos de un camino, esperé y al final terminó cruzándolo e incluso se subió a un arbusto a cantar. Decidí irme al camping (<http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/>), ya que el día había sido muy largo, muchas horas de carretera y al día siguiente había que levantarse muy temprano para continuar consiguiendo los objetivos, eso sí, me iba a la caravana con una sonrisa que nadie me podía quitar.



Cheyne Beach

14/05/2014:

Me dirigí hacia el punto clásico donde se suele observar **Noisy Scrub-bird** (*Atrichornis clamosus*) antes de que vieran las primeras luces. Desde que llegué al sitio pude escucharlo a escasos 20 metros, se mostraba bastante cantarín y haciendo caso a los consejos que me habían dado otros compañeros, decidí hartarme de paciencia y esperar a que éste cruzara. Tras más de una hora deleitándome con su música (y con la impotencia de no poder verlo entre la vegetación y no poder hacer nada.....) de repente decidió cruzar como una bala. Fueron apenas unos segundos de observación, pero los suficientes para observar sus detalles característicos. Decidí esperar porque seguía escuchándolo, pero tras otra hora de paciencia, ésta se acabó y decidí continuar en busca del resto. Bueno, al menos la especie más difícil de south-western Australia la había visto!!!! El día había comenzado bien.....

Tenía que ir en busca de mi tercer objetivo: **Western Whipbird** (*Psophodes nigrogularis*). Me costó todo el día entero recorrerme el parque natural de Cheynes Beach de punta a punta, pude escucharlo en varias ocasiones, pero a pesar de la paciencia y la testarudez nada..... Por fin pude verlo en vuelo con las últimas luces del día.

El día fue amenizado con los bonitos paisajes y la presencia de otras aves, como por ejemplo: Western Spinebill, Western Rosella, White-cheeked Honeyeater (*Phylidonyris niger*), Fan-tailed Cuckoo (*Cacomantis flabelliformis*), Southern Emu-wren (*Stipiturus malachurus*), Common Bronzewing (*Phaps chalcoptera*), Baudin's Black-cockatoo, Swamp Harrier (*Circus approximans*), Wedge-tailed Eagle (*Aquila audax*), Eastern Osprey (*Pandion cristatus*), Red-capped Parrot.... Y muchas más!!

A destacar: **Rock Parrot** (*Neophema petrophila*) pude identificar por el canto un grupo de 5 que pasaron volando por la playa y se dirigieron a zonas rocosas, los perdí en vuelo. **Red-eared Firetail** (*Stagonopleura oculata*) tuve a un ejemplar a escasos 5 metros en una zona ajardinada en el camping, no paraba de alimentarse. **White-breasted Robin** (*Eopsaltria georgiana*) visto sin dificultad en el camping, ave bastante confiada y divertida. **Western Wattlebird** (*Anthochaera lunulata*), visto un solo individuo.

Volvía a dormir en el mismo camping que el día anterior:
<http://www.cheynesbeachcaravanpark.com.au/>



White-breasted Robin
(*Eopsaltria georgiana*)



Red-eared Fantail
(*Stagonopleura oculata*)

15/05/2014:

Volví al terreno de campo antes de que aparecieran las primeras luces del día. Pude volver a escuchar Noisy Scrub-bird (*Atrichorus clamosus*), pero esta vez no quise esperar a que cruzara porque prefería mejorar mi observación de Western Whipbird (*Psophodes nigrogularis*). Tras horas de búsqueda y espera, finalmente pude verle otra vez en vuelo.... Al menos la observación había sido mejor que la del día anterior. Me despedí de Cheynes Beach con un bonito Western Bristlebird (*Dasyornis longirostris*) cantando en lo alto de un arbusto durante 5 minutos. Orgullosa de que en una misma mañana había sido capaz de detectar estas tres difíciles endémicas australianas.



Cheynes Beach

De camino a Albany intenté hacer una espera (durante 6 h) para Australasian Bittern (*Botaurus poiciloptilus*) en diferentes lagunas, sin éxito ninguno. Me fui a dormir a un carpark cerca de mi siguiente punto: Two Peoples Bay. No recuerdo el nombre del camping ya que no lo reservé con antelación, al llegar a Albany me encontré con varios y paré en el primero que vi abierto.

16/05/2014:

Comencé el día en Two Peoples Bay, área totalmente recomendada tanto por el pajareo como por la belleza de la zona. No quise entretenerme mucho, ya que quería visitar muchos sitios en un solo día, los objetivos ya estaban cumplidos por lo que ahora me quedaban dos días de pajareo con tranquilidad y conocer sitios nuevos.

En Little Beach pude escuchar cuatro ejemplares diferentes de W. Bristlebird (*Dasyornis longirostris*), pero ninguno se dejó ver. La sorpresa llegó cuando observé durante más de un minuto un individuo de Noisy Scrub-bird (*Atrichorus clamosus*) en mitad de un camino (le estuve haciendo una espera de más de media hora).

Continúe hacia Albany para intentar ver a placer Rock Parrot (*Neophema petrophila*) ya que la anterior observación fue en vuelo y no pude disfrutar de sus características. Me dirigí hacia Middleton Beach, playa preciosa, donde encontré entre las dunas un grupo de unos 40 loros aproximadamente. El sitio es el ideal para ellos pero debido a las molestias humanas (obras en la playa, gente jugando al fútbol, paseando, perros sueltos...) tienen que refugiarse en zonas más distantes, lo que dificulta bastante su búsqueda hasta el punto de poder llegar a no observarlos. Tras disfrutar durante una hora de su compañía decidí continuar a otro punto.

En la misma localidad de Albany visité Seppings Lake Reserve donde estuve durante casi una hora. Buen sitio para acuáticas y otras especies nuevas para la lista del viaje.

Me dirigí hacia Lake Muir, donde estuve haciendo diferentes trayectos por carretera (Geordinup rd, Unicup rd, Rocky Gully rd) hasta que conseguí localizar un bando de Western Corella (*Cacatua pastinator*) (subespecie sur). El hábitat son bosques

secos y granjas donde te puedes entretener bastante ya que se ven la mayoría de las endémicas del oeste Australiano.

Ya sin luz me dirigí hacia el norte para dormir en Baldivis (habiendo llamado por teléfono esa misma tarde, ya que llegaría al sitio alrededor de las 23.00)
(http://www.bonneyswaterskipark.com.au/Bonneys_Waterski_Park/Welcome.html)



Rock Parrot (*Neophema petrophila*)

17/05/2014:

Realicé una visita rápida a Baldivis Explosive Reserve, Lake Cooloongup, Tamworth wetlands y diversos humedales de la zona.

Ya casi sin tiempo me dirigí hacia Perth donde hice unas paradas rápidas en Kings Park y Bold Park.

Llegaba el momento de tener que dejar el vehículo de alquiler.

ESPECIES Y SUBESPECIES ENDÉMICAS DE SOUTH-WESTERN AUSTRALIA

- Carnaby's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus latirostris*): muy común en Perth y alrededores. En Perth se puede encontrar en Kings Park y Bold Park (sobre todo en pinos introducidos). La mayoría de Black-cockatoos que vemos en la costa suelen ser éstos, pero cuidado que también existe una gran población de Red-tailed Black-cockatoo. También los pude observar en Dryandra, Stirlings Rangers y Cheynes Beach.

- Baudin's Black-cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*): sólo pude observarlos con total seguridad en Kulamunda y Cheynes Beach (aunque éstos últimos los identifiqué en vuelo por el canto). Ave cada vez más escasa y difícil de localizar.

- Western Corella (*Cacatua pastinator*): La subespecie norte la pude localizar en un bando mixto con Little Corella cerca de Northam. Otros sitios típicos son los alrededores de Wongan Hills, Moora y New Norcia. La subespecie del sur la encontré en el sitio clásico alrededor de Lake Muir haciendo pequeños trayectos por carreteras de granjas.

Cuidado con ellas en Perth, no confundirlas, ya que hay Little Corella y Long-billed Corella, pero no la Western.

- Western Rosella (*Platycercus icterotis*): muy común pero bastante discreta, no tan "cantarina" como el resto de Rosellas australianas. La observé en Collins Road, Dryandra, alrededores de Albany, Cheynes Beach, Starling Ranger....

- Red-capped Parrot (*Purpureicephalus spurius*): muy común en zonas arboladas alrededor de Perth. También observado en Starling Rangers, Cheynes Beach y Albany.

- Noisy Scrub-bird (*Atrichornis clamosus*): Observado en Cheynes Beach y Two Peoples Bay. Lo más importante para observar a esta especie es conocer el canto. El truco consiste en escucharlo y esperar a que cruce el camino, con las primeras luces del día.

Cheynes Beach: se conoce un camino por el que la mayoría de las mañanas al amanecer el ave termina cruzando. Cuando vienes por la carretera que te dirige a Cheynes Beach, te dejas el pueblo a la izquierda y después te sale un camino a la derecha que te lleva al Caravan Park; justo pasado ese desvío a la derecha sale un caminito a la izquierda que te lleva a la playa (camino peatonal), esperar al principio de este camino. Para cualquier duda preguntar en la oficina del Caravan Park ya que ellos te proporcionan mapas de la zona y guardan una carpeta con mapas anteriores y todas las observaciones apuntadas por otros ornitólogos. En Cheynes Beach pude escucharlo a la siguiente mañana en otra zona diferente.

Two Peoples Bay: sitio clásico en el pasado, aunque ésta población ya se había dado por desaparecida hacía más de cinco años. Pude escuchar un ejemplar y verlo a placer durante más de un minuto en mitad de un camino.

- Red-winged Fairy-wren (*Malurus elegans*): residente y bastante fácil de observar en Victoria Dam. También pude localizarlo en Lake Seppings en Albany. En teoría fácil en cualquier humedal del sur.

- Western Bristlebird (*Dasyornis longirostris*): común en Cheynes Beach, fácil escucharlo pero elusivo y difícil de localizar en las zonas bajas de los matorrales. Al igual que Noisy Scrub-bird el truco consiste en escucharlo y esperar a que cruce el camino, aunque éste se deja observar bastante más que el anterior, pudiéndose ver sin dificultad incluso cantando en lo alto de los matorrales. Otro sitio clásico es por la mañana temprano en los aparcamientos de Little Beach en Two Peoples Bay, allí no pude ni escucharlo...
- Rufous (Western) Fieldwren (*Calamanthus fuliginosus*): la mejor oportunidad para verlo es en Starling Ranger en cualquier hábitat adecuado. Yo lo pude observar en Salt River Rd enfrente de Camel Lakes NR. Ave escasa, difícil de localizar, importante conocer el canto, pero una vez que la has localizado se deja ver bastante bien. Otro sitio tradicional es en los alrededores de Mt Trio carpark (Starling Ranger). También se ha citado en la carretera que lleva a Cheynes Beach, yo no tuve demasiada suerte en estos dos últimos puntos.
- Western Thornbill (*Acanthiza inornata*): común en zonas arboladas alejadas de Perth. Victoria Dam es la mejor oportunidad, también en Dryandra.
- Western White-naped Honeyeater (*Melithreptus whitlocki*): muy común en zonas arboladas alrededor de las colinas de Perth, Victoria Dam, Dryanda y alrededor de Albany. Una vez más, importante conocer el canto.
- Western Spinebill (*Acanthorhynchus superciliosus*): al igual que el anterior muy común en zonas alrededor de Perth, Dryandra, Victoria Dam, Cheynes Beach, Albany, Kings Park...
- Western Whipbird (*Psophodes nigrogularis*): Cheynes Beach y Little Beach en Two Peoples Bay. Para mí fue con diferencia el ave más difícil de observar, le dediqué dos días enteros, era capaz de escucharlo pero nunca lo encontraba. Al final tuve una observación fugaz del ave volando. También estuve intentando localizar la subespecie *mallee* en Starling Ranger, pero fui incapaz. He de decir que el canto es totalmente diferente y yo lo desconocía.
- White-breasted Robin (*Eopsaltria georgiana*): muy fácil de ver y bastante confiado. En el carpark de Cheynes Beach no falla nunca, otro de los sitios clásicos es Victoria Dam.
- Red-eared Firetail (*Stagonopleura oculata*): ave bastante confiada. Pude observarla sin dificultad en el carpark de Cheynes Beach. Otro de los sitios clásicos es Victoria Dam y zonas colindantes, lo intenté en varios de estos sitios sin resultados.
- Western Wattlebird (*Antochaera lunulata*): a mi percepción no tan común como otros Wattlebird. Lo vi únicamente en Cheynes Beach y un solo ejemplar. También era posible en Victoria Dam y Kings Park.
- Crested (Western) Shrike-tit (*Falcunculus frontatus*): tuve bastante suerte y lo observé en Collins Road. Otros sitios donde buscar son Dryanda y Starling Ranger. Subespecie difícil de observar.

OTRAS ESPECIES DE INTERÉS:

- Australasian Bittern (*Botaurus poiciloptilus*): estuve en varios lagos que crían varias parejas pero no tuve éxito. En uno de ellos pude escucharlo al anochecer.
- Regent Parrot (*Polytelis anthopeplus*): no difícil de ver. Pude localizar varios grupos en carretera conduciendo al este de Perth y yendo hacia Albany. Visto a placer en Starling Ranger varios ejemplares.
- Elegant parrot (*Neophema elegans*): solo vi un ejemplar en Dryandra, aunque más tarde pude disfrutar de ellos en Starling Ranger. Collins Rd es otro de los sitios clásicos.
- Rock Parrot (*Neophema petrophila*): observado por primera vez en vuelo al atardecer en Cheynes Beach un grupo de cinco (identificado por el canto). Pude ver a placer en Albany, en las dunas que se encuentran en Middleton Beach, un bando de unos cuarenta aprox, estuve fotografiándolos durante más de una hora; este es el sitio clásico, aunque a veces puede resultar muy difícil de localizar debido a que tienen bastantes molestias humanas y de animales de compañía, por lo que al ser la playa muy larga es fácil para ellos esconderse en cualquier rincón. A veces pueden verse en Two Peoples Bay, yo lo intenté pero no tuve éxito. Otro sitio clásico (ya no llegué a ir) es Cape Leeuwin, cerca de Augusta.
- Rufous Treecreeper (*Climacteris rufus*): lo observé sin ninguna dificultad en Collins Road, Dryandra y Stirling Rangers. La llamada ayuda.
- Blue-breasted Fairy-wren (*Malurus pulcherrimus*): observado en Collins Road (Brookton Hwy) y muy común en Dryandra, también buen sitio para esta especie es Starling Ranger.
- Tawny-crowned Honeyeater (*Glyciphila melanops*): visto en Starling Ranger y Cheynes Beach.
- Western Yellow Robin (*Eopsaltria griseogularis*): Collins Rd y Starling Ranger.