

Birding in OMAN


02nd- 14th December 2016



Sykes's Nightjar. © Albert Burgas.



Miembros del viaje:
Pere Serrano, Albert
Burgas, Àlex Ollé,
Ricard Font and Anna
Planella.



Este report quiere mostrar la diversidad tan grande que tiene el sultanato de Omán, ya que en pocos días puedes superar fácilmente las 200 especies, la inmensa mayoría muy interesantes para los ornitólogos europeos que quieran adquirir cierta experiencia con aquellos taxones que tienen cierta llegada natural en el Western Palearctic.



Este report quiere mostrar la diversidad tan grande que tiene el sultanato de Omán, ya que en pocos días puedes superar fácilmente las 200 especies, la inmensa mayoría muy interesantes para los ornitólogos europeos que quieran adquirir cierta experiencia con aquellos taxones que tienen cierta llegada natural en el Western Palearctic. A nivel de información general de país, ya hay algunos reports al respecto, y que mencionamos aquí alguno de ellos:

<http://www.avesibericas.es/oman0.htm>
http://www.club300.se/Files/TravelReports/Oman2008_MG.pdf
<http://www.birdtours.com.uk/tripreports/oman/Oman-5/Oman-jan-08.htm>
https://www.cloudbirders.com/tripreport/repository/COOK_Oman_01_2014.pdf
<http://www.stephenmenzie.com/oman2013/>

Nosotros tan solo hemos querido hacer un listado sistemático rápido y visual, incluyendo también un listado comentado sobre aquellas especies más interesantes para el ornitólogo, con algunos comentarios que creemos de cierta utilidad en cuando a identificación se refiere. Para las localidades más conocidas se utilizan las numeraciones del libro obligado *Birdwatching guide to Oman* en su segunda edición. Por aquellas otras localidades que no salen en el libro, se han anotado las coordenadas.

Además, como para algunos de los miembros de este equipo representa su segundo viaje en invierno a Omán, también se añaden algunos comentarios y aves del primer viaje, realizado en enero de 2015 por Miguel Ángel Fuentes, Gerard Dalmau, Ferran



Vaquero, Pere Serrano y Àlex Ollé. En este sentido, hay un apéndice donde figuran aquellas especies vistas en el primer viaje y que no se han detectado en el segundo a modo de suplemento.

Las listas que se muestran a continuación siguen el orden y la nomenclatura recomendada por el AERC (<http://www.aerc.eu/>). En el caso de aquellas especies que no salen citadas en ella, se sigue la lista de las aves de Omán en su última versión 7.6 publicada online (<http://www.birdsoman.com/>). A nivel taxonómico también hemos seguido a lo publicado en el Handbook of the Birds of the World versión Alive (<http://www.hbw.com/>).

Finalmente, también hemos incorporado un listado de las especies de mamíferos y anfibios observados.

Esperamos que este report sirva para ayudar a futuros viajes de ornitólogos ilusionados en conocer este maravilloso paraíso natural.

CONTACTO:

Si se desea comentar algo al respect sobre cualquier comentario de este report, se pueden dirigir a cualquier de estos correos electrónicos:


aolletorner@gmail.com / aburgas@gmail.com.



Localitzation	Bird species
Shannah	<i>Dromas ardeola</i> , <i>Limicola falcinellus</i> , <i>Xenus cinereus</i> , <i>Larus cachinans</i> , <i>Larus canus</i>
Ferry	<i>Sternula saundersi</i>
Sur Masirah (8.3)	<i>Lanius palidirostris</i> , <i>Buteo rufinus</i>
Hilf (8.2)	<i>Anser albifrons</i> , <i>Anser anser</i> , <i>Pernis ptilorhynchus x apivorus</i> , <i>Pernis ptilorhynchus</i> , <i>Turdus atrogularis</i> , <i>Sturnus vulgaris</i> , <i>Turdus atrogularis</i> , <i>Iduna pallida</i>
Khawr Dhurf (9.2)	<i>Anser albifrons</i> , <i>Anser anser</i> , <i>Calidris tenuirostris</i> , <i>Butorides striatus</i> , <i>Netta rufina</i>
Al Lakbi	<i>Falco amurensis</i>
Khawr Ghawi (9.3 F)	<i>Calidris tenuirostris</i>
Filim (8.1 C)	<i>Anthus hodgsoni</i> , <i>Calidris tenuirostris</i> , <i>Limicola falcinellus</i> , <i>Butorides striatus</i> , <i>Ficedula parva</i>
Wadi As Shuwaymiyya (9.4)	<i>Phalacrocorax nigrogularis</i> , <i>Strix hadorami</i>
Ras Nuss (Hasik)	<i>Strix hadorami</i>
Ras Abu Rasas (8.4)	<i>Larus ichthyæus</i> , <i>Puffinus persicus</i>
Tawi Atayr (10.9)	<i>Crithagra menachensis</i>
Ras Janjari (10.11)	<i>Bulweria fallax</i> , <i>Puffinus persicus</i>
Jabal Samhan	<i>Aquila verreauxii</i> , <i>Buteo rufinus</i>
Taqah (10.6)	<i>Glareola lactea</i> , <i>Milvus aegyptius</i> , <i>Calidris temminckii</i>
Khawr Rawri (10.7)	<i>Ceryle rudis</i> , <i>Egretta intermedia</i>
Wadi Darbat (10.8)	<i>Iduna pallida</i> , <i>Ficedula parva</i> , <i>Falco pelegrinoides</i>
Jarziz Farms (10.1)	<i>Falco amurensis</i> , <i>Circus pygargus</i> , <i>Pernis ptilorhynchus x apivorus</i> , <i>Mirafra cantillans</i>
Ayn Hamran (10.4)	<i>Phylloscopus humei</i> , <i>Lanius phoenicuroides</i> , <i>Iduna pallida</i> , <i>Ficedula parva</i>
Raysut lighthouse	<i>Sula leucogaster</i> , <i>Phalacrocorax nigrogularis</i>
Raysut Sewage Plant	<i>Ciconia abdimii</i> , <i>Grus virgo</i> , <i>Vanellus leucurus</i> , <i>Luscinia megarhynchos golzii</i> , <i>Ficedula parva</i> , <i>Tadorna ferruginea</i>
Al Mughsayl (10.15)	<i>Gallinago stenura</i> , <i>Porzana pusilla</i> , <i>Sterna represa</i> , <i>Egretta intermedia</i> , <i>Ixobrychus sinensis</i>
Fazaya Beach	<i>Anous stolidus</i> , <i>Phaeton anathereus</i> , <i>Sula leucogaster</i>
Mudhay (10.19)	<i>Hypocolius ampelinus</i> , <i>Hedydipna metallica</i> , <i>Sylvia atricapilla</i> , <i>Torgos tracheliotus</i>
Road between Mudhay and Al Mazyunah	<i>Eremalauda dunni</i>
Wadi Aydam	<i>Amomanes cinctura</i> , <i>Pterocles coronatus</i>
Rub' al Khali Desert	

Ubar	<i>Falco naumani</i> , <i>Lanius pallidirostris</i>
Al Balid Farm (7.5)	<i>Turdus atrogularis</i> , <i>Eudynamis scolopaceus</i> , <i>Sylvia atricapilla</i>
Qatbit (7.4)	<i>Phylloscopus humei</i> , <i>Sylvia curruca blithi</i> , <i>Caprimulgus aegyptius</i> , <i>Streptopelia orientalis</i>
Muntasar (7.3)	<i>Caprimulgus mahrattensis</i>
Sayq Plateau (4.3 N)	<i>Turdus atrogularis</i> , <i>Phoenicurus erythronotus</i>
Wadi Bani Habib (4.3 L)	<i>Torgos tracheliotus</i>
Wadi Al Muaydin	<i>Erithacus rubecula</i> , <i>Turdus atrogularis</i>
Al Ansab Wetland (1.1)	<i>Aquila clanga</i>

Lista de las principales localizaciones y especies



Abdim's Stork © Albert Burgas.

Lista sistemática de las aves observadas

Scientific name	English name	Observations and ssp.* (*según hbw alive - december 2016-)
<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose	
<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	Eastern Greylag Goose <i>Anser anser rubrirostris</i>
<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	
<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	
<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon	
<i>Anas strepera</i>	Gadwall	
<i>Anas crecca</i>	Eurasian Teal	
<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	
<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	
<i>Anas querquedula</i>	Garganey	
<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	
<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	
<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	
<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	
<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	
<i>Alectoris melanocephala</i>	Arabian Partridge	
<i>Ammoperdix heyi</i>	Sand Partridge	
<i>Francolinus pondicerianus</i>	Grey Francolin	
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	
<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	
<i>Bulweria fallax</i>	Jouanin's Petrel	
<i>Puffinus persicus</i>	Persian Shearwater	
<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby	
<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby	
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i>	Socotra Cormorant	
<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern	Feather
<i>Ixobrychus sinensis</i>	Yellow Bittern	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	
<i>Butorides striata</i>	Striated Heron	
<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	
<i>Ardeola grayii</i>	Indian Pond Heron	

<i>Bulbucus ibis</i>	Cattle Egret	
<i>Egretta gularis</i>	Western Reef Heron	
<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	
<i>Egretta intermedia</i>	Intermediate Egret	
<i>Egretta alba</i>	Great Egret	
<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	
<i>Ciconia abdimii</i>	Abdim's Stork	
<i>Ciconia ciconia</i>	Western White Stork	
<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	
<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo	
<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Crested Honey Buzzard	Two intermediates with European Honey Buzzard <i>Pernis apivorus</i>
<i>Milvus (migrans) aegyptius</i>	Yellow-billed Kite	'arabicus'
<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian Vulture	
<i>Torgos tracheliotus</i>	Lappet-faced Vulture	negevensis
<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Snake Eagle	
<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh Harrier	
<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier	
<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	
<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	
<i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard	Presumed ssp. <i>rufinus</i>
<i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle	
<i>Aquila pennata</i>	Booted Eagle	
<i>Aquila verreauxii</i>	Verreaux's Eagle	
<i>Aquila fasciata</i>	Bonelli's Eagle	
<i>Aquila nipalensis</i>	Steppe Eagle	
<i>Aquila heliaca</i>	Eastern Imperial Eagle	
<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	
<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel	Some influence of ssp. <i>pekinensis</i>
<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	
<i>Falco amurensis</i>	Amur Falcon	
<i>Falco (peregrinus) pelegrinoides</i>	Barbary Falcon	
<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crake	
<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	
<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	
<i>Grus virgo</i>	Demoiselle Crane	

<i>Burhinus capensis</i>	Spotted Thick-knee	Listened
<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	
<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher	
<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden Plover	
<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	
<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Pheasant-tailed Jacana	
<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing	
<i>Vanellus leucurus</i>	White-tailed Lapwing	
<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	
<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	
<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sand Plover	
<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sand Plover	
<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	
<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	
<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	
<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	
<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	
<i>Calidris tenuirostris</i>	Great Knot	
<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	
<i>Calidris falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	
<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	
<i>Calidris subminuta</i>	Long-toed Stint	
<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	
<i>Calidris alba</i>	Sanderling	
<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	
<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	
<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	
<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper	
<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	
<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	
<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	
<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	
<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	
<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	
<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	

<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	
<i>Gallinago stenura</i>	Pin-tailed Snipe	
<i>Dromas ardeola</i>	Crab-plover	
<i>Glareola lactea</i>	Small Pratincole	
<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy	
<i>Sternula albifrons</i>	Little Tern	
<i>Sternula saundersi</i>	Saunders's Tern	
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	
<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	
<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	
<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sandwich Tern	
<i>Sterna bergii</i>	Great Crested Tern	
<i>Sterna bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	
<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	
<i>Sterna repressa</i>	White-cheeked Tern	
<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull	
<i>Larus ridibundus</i>	Common Black-headed Gull	
<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas's Gull	
<i>Larus hemprichii</i>	Sooty Gull	
<i>Larus canus</i>	Mew Gull	
<i>Larus (fuscus) heuglini</i>	Heuglin's Gull	
<i>Larus (fuscus) barabensis</i>	Sttepe Gull	
<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull	
<i>Pterocles lichtensteinii</i>	Lichtenstein's Sandgrouse	
<i>Pterocles coronatus</i>	Crowned Sandgrouse	
<i>Pterocles exustus</i>	Chestnut-bellied Sandgrouse	
<i>Columba livia</i>	Rock Dove	
<i>Streptopelia risoria</i>	African Collared Dove	
<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	
<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle dove	Listened
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Laughing Dove	
<i>Oena capensis</i>	Namaqua Dove	
<i>Treron waalia</i>	Bruce's Green Pigeon	
<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet	
<i>Eudynamys scolopaceus</i>	Asian Koel	

<i>Otus pamela</i>	Arabian Scops Owl	
<i>Bubo (africanus) milesi</i>	Arabian Spotted Eagle-owl	
<i>Athene noctua</i>	Little Owl	One individual of <i>lilith</i> phenotip
<i>Strix butleri</i>	Omani Owl	
<i>Strix hadoramii</i>	Desert Tawny Owl	
<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	Feather
<i>Caprimulgus mahrattensis</i>	Sykes's Nightjar	
<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Egyptian Nightjar	
<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	
<i>Ceryle rudis</i>	Pied Kingfisher	
<i>Merops orientalis</i>	Green Bee-eater	
<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller	
<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	
<i>Mirafra cantillans</i>	Singing Bush Lark	
<i>Eremopterix nigriceps</i>	Black-crowned Sparrow-Lark	
<i>Eremalauda dunni</i>	Dunn's Lark	Listened
<i>Ammomanes cinctura</i>	Bar-tailed Lark	
<i>Ammomanes deserti</i>	Desert Lark	
<i>Alaemon alaudipes</i>	Greater Hoopoe-Lark	
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Greater Short-toed Lark	
<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	
<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	
<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>	Pale Crag Martin	
<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	
<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit	
<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	
<i>Anthus similis</i>	Long-billed Pipit	
<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit	
<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	
<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	
<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail	
<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	
<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	
<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	
<i>Pycnonotus leucotis</i>	White-eared Bulbul	
<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	White-spectacled Bulbul	
<i>Hypocolius ampelinus</i>	Grey Hypocolius	

<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	
<i>Luscinia (megarhynchos) golzii</i>	Eastern Nightingale	
<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	
<i>Phoenicurus erythronotus</i>	Eversmann's Redstart	
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Black Redstart	
<i>Cercomela melanura</i>	Blackstart	
<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheatear	
<i>Oenanthe deserti</i>	Desert Wheatear	
<i>Oenanthe chrysopygia</i>	Red-tailed Wheatear	
<i>Oenanthe lugentoides</i>	Arabian Wheatear	
<i>Oenanthe albonigra</i>	Hume's Wheatear	
<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock Thrush	
<i>Turdus atrogularis</i>	Black-throated Thrush	
<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	
<i>Prinia gracilis</i>	Graceful Prinia	
<i>Scotocerca inquieta</i>	Scrub Warbler	
<i>Iduna pallida</i>	Eastern Olivaceous Warbler	<i>elaeica</i>
<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Clamorous Reed Warbler	
<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétriés's Warbler	
<i>Sylvia nana</i>	Asian Desert Warbler	
<i>Sylvia leucomelaena</i>	Arabian Warbler	
<i>Sylvia (curruca) halimodendri</i>	Desert Lesser Whitethroat	Presumed
<i>Sylvia (curruca) blythi</i>	Siberian Whitethroat	Presumed
<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap	
<i>Zosterops abyssinicus</i>	Absyssinian White-eye	
<i>Phylloscopus humei</i>	Hume's Leaf Warbler	
<i>Phylloscopus neglectus</i>	Plain Leaf Warbler	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	
<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher	
<i>Anthodiaeta metallica</i>	Nile Valley Sunbird	
<i>Cinnyris osea</i>	Palestine Sunbird	
<i>Cinnyris habessinicus</i>	Shining Sunbird	
<i>Cinnyris asiaticus</i>	Purple Sunbird	
<i>Tchagra senegalus</i>	Black-crowned Tchagra	
<i>Lanius isabellinus</i>	Isabelline Shrike	

<i>Lanius (isabellinus) phoenicuroides</i>	Turkestan Red-tailed Shrike	
<i>Lanius meridionalis</i>	Southern Grey Shrike	
<i>Lanius (meridionalis) pallidirostris</i>	Sttepe Grey Shrike	
<i>Terpsiphone viridis</i>	African Paradise Flycatcher	
<i>Corvus splendens</i>	House Crow	
<i>Corvus ruficollis</i>	Brown-necked Raven	
<i>Corvus rhipidurus</i>	Fan-tailed Raven	
<i>Onychognathus tristramii</i>	Tristram's Starling	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	
<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna	
<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Some <i>Passer (domesticus) indicus</i>
<i>Ploceus galbula</i>	Rüppell's Weaver	
<i>Euodice malabarica</i>	Indian Silverbill	
<i>Euodice cantans</i>	African Silverbill	
<i>Crithagra menachensis</i>	Yemen Serin	
<i>Emberiza striolata</i>	Striolated Bunting	
<i>Emberiza tahapisi</i>	Cinnamon-breasted Bunting	



* Las especies en **negrita** se encuentran en la lista comentada.

Pere Serrano (arriba) y Àlex Ollé en acción !!



Lista comentada de las especies más interesantes

Greylag Goose *Anser anser*. Vimos 2 ejemplares en Masirah (8.2 B) i 2 en Khawr Dhurf (9.2). Los que pudimos ver de cerca pertenecían a *rubrirostris*.

Jouanin's Petrel *Bulweria fallax*. Tan solo un ejemplar en dirección norte en Ras Janjari (10.11), Mirbat.

Brown Booby *Sula leucogaster*. 1 ejemplar en el faro de Raysut 16°55'47.3"N 54°00'19.0"E y hasta 4 en Fazaya beach 16°50'25.7"N 53°43'21.4"E.

Socotra Cormorant *Phalacrocorax nigrogularis*. 1 ejemplar cerca de Ash Shuwaymiyyah 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E, mas de 50 ejemplares en el faro de Raysut 16°55'47.3"N 54°00'19.0"E, y otros pocos en Fazaya beach 16°50'25.7"N 53°43'21.4"E.

Eurasian Bittern *Botaurus stellaris*. Restos de un ejemplar depredado en Al Mughsayl (10.15), probablemente por alguno de los juveniles presentes en la zona de Bonelli's Eagle *Aquila fasciata*.

Yellow Bittern *Ixobrychus sinensis*. Dos ejemplares en Khawr Al Mughsayl (10.15).

Indian Pond Heron *Ardeola grayii* and Squacco Heron *Ardeola ralloides*. Más de 20 *Ardeola* en el viaje. Nos fijamos en algunos de ellos, siendo aproximadamente la mitad de cada especie. Indian presenta un dorso más oscuro, pero sobretodo una franja oscura bien definida entre el ojo y la base de la mandíbula superior; ausente en Squacco.



Indian Pond Heron. Àlex Ollé. Taqah. December 2016.

Intermediate Egret *Egretta intermedia*. Tres ejemplares, dos en Khawr Rawri (10.7) y el otro en Al Mughsayl (10.15).

Abdim's Stork *Ciconia abdimii*. Más de 300 aves en la depuradora de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E.

Crested Honey Buzzard *Pernis ptilorhynchus*. Dos aves juveniles en Masirah (8.2 B) y otro juvenil en Salalah en los Jarziz Farm (10.1 A). Uno de Masirah y el de Salalah tienen una clara influencia de European Honey Buzzard *Pernis apivorus*.



Crested Honey Buzzard. Àlex Ollé. Masirah. Diciembre 2016. El individuo de la izquierda parece ser un Crested aparentemente puro. El de la derecha tiene una cierta influencia de *apivorus*, así las secundarias tan solo muestran 3 bandas oscuras.

Yellow-billed Kite *Milvus aegyptius*. Un juvenil de la ssp. *aegyptius* 'arabicus' en Taqah (10.6).



Yellow-billed Kite. Albert Burgas. Taqah. Diciembre 2016. Nótese la p5 o el 6º dedo muy corto, con la base del pico ya muy amarilla.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*. Dos aves juveniles en las Dhofar, otras tres aves juveniles i inmaduras en la zona de camellos de Mudday 17°29'20.1"N 53°21'32.1"E, y cuatro aves mas en el Wadi Bani Habib (4.3 L), Al Hajar mountains. Todas las aves pertenecen a la ssp. *negevensis*.



Lappet-faced Vulture. Àlex Olle. Mudday. Diciembre 2016. Perteneció a un *negevensis* en su 2cy, con pp1-3 mudadas y p4 creciendo.

Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*. Un adulto en Masirah, con caracteres de la ssp. *rufinus*. Y otro ejemplar en las Dhofar 17°06'09.3"N 54°41'53.1"E.

Greater Spotted Eagle *Aquila clanga*. 13 aves en el dormidero de Al Ansab Lagoons (1.1) Masqat. Otras 15 aves en la planta depuradora de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E, una de ellas de la forma '*fulvescens*'. En la zona de Salalah vimos otras 10 aves. La mayoría se tratan de ejemplares juveniles, aunque se encuentran todas las edades.



Greater Spotted Eagle. Àlex Ollé. Salalah. Diciembre 2016. Juvenil.



Greater Spotted Eagle. Àlex Ollé. Raysut. Diciembre 2016. (I): un ave juvenil con cierta aberración en el plumaje. (D): un juvenil de la forma '*fulvescens*'.

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii*. 1 adulto visto relativamente cerca y en varias ocasiones en las Dhofar 17°06'09.3"N 54°41'53.1"E.



Verreaux's Eagle. Àlex Ollé. Dhofar. Diciembre 2016.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*. Más de 400 aves en el vertedero de Raysut 16°59'00.1"N 53°57'03.5"E. Alguna otra ave solitaria en las Dhofar.

Eastern Imperial Eagle *Aquila heliaca*. Más de 20 aves de todas las edades, básicamente en la zona de los farms de Salalah y en el vertedero de Raysut, aunque también algunas aves dispersas por la zona S de Omán, tanto en el litoral como en el interior.



Eastern Imperial Eagle. Àlex Ollé. Salalah. Diciembre 2016. Ave inmadura que presenta dos frentes de muda activa en las primarias, con la p10 más alguna secundaria y rectrices juveniles.

Lesser Kestrel *Falco naumanni*. 1 macho adulto mudando p10, s1 y rr1, con caracteres intermedios entre *pekinensis* y *naumanni* en Ubar 18°14'47.1"N 53°39'03.5"E.



Lesser Kestrel. Àlex Ollé. Ubar. Diciembre 2016. Este ejemplar muestra caracteres intermedios entre *pekinensis* y *naumanni*, atendiendo a la extensa coloración gris de las cobertoras grandes, y especialmente en algunas cobertoras medians y pequeñas.

Amur Falcon *Falco amurensis*. 1 macho de 2cy en Lakabi 18°13'10.2"N 56°32'37.7"E, y una hembra en Jarziz Farm 17°02'53.3"N 54°08'05.7"E.



Amur Falcon. Àlex Ollé. Lakabi. Diciembre 2016. Macho de 2cy con la s1 retenida de juvenil.

Barbary Falcon *Falco pelegrinoides*. 1 macho adulto en Wadi Darbat (10.8).



Barbary Falcon. Àlex Ollé. Dhofar. Diciembre 2016. Las rémiges sin muda activa, lo que en estas fechas indica que no se trata de un nordic Peregrine Falcon.

Baillon's Crane *Porzana pusilla*. 1 ejemplar en Khawr Al Mughsayl (10.15).

Demoiselle Crane *Grus virgo*. 1 ejemplar de 1r invierno en la planta de depuración de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E junto con las Abdim's Stork.



Demoiselle Crane. Àlex Ollé. Raysut. Diciembre 2016. Ejemplar de 1r invierno.

Spotted Thick-Knee *Burhinus capensis*. Varios ejemplares escuchados en Masirah. En el primer viaje vistos dos ejemplares en el wadi de Al Mughsayl (10.15).

White-tailed Lapwing *Vanellus leucurus*. 1 ejemplar con los Red-wattled Lapwing en la planta de depuración de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E.



White-tailed Lapwing. Albert Burgas. Raysut. Diciembre 2016.

Great Knot *Calidris tenuirostris*. 1 ejemplar en Filim (8.1 C), 2 en Khawr Durf (9.2) y 1 en Khawr Ghawi (9.3 F).

Broad-billed Sandpiper *Calidris falcinellus*. Varios ejemplares en Shannah 20°44'41.2"N 58°43'21.0"E y otros tantos en Filim (8.1 C).

Long-toed Stint *Calidris subminuta*. 1 ejemplar ya controlado en East Khawr (10.2).

Pin-tailed Snipe *Gallinago stenura*. 1 solo ejemplar en Khawr Al Mughsayl (10.15). En el primer viaje dos ejemplares en Haima 19°57'39.4"N 56°17'00.7"E.

Crab Plover *Dromas ardeola*. Muchos ejemplares en Shannah 20°44'41.2"N 58°43'21.0"E y otros tantos en Filim (8.1 C).



Crab Plover. Àlex Ollé. UAE. Enero 2015. Ejemplar de 1r invierno.

Small Pratincole *Glareola lactea*. 1 ejemplar en Khawr Taqah (10.6).

Brown Noddy *Anous stolidus*. 2 ejemplares posados en una boya en Fazaya beach 16°50'25.7"N 53°43'21.4"E.

Saunders's Tern *Sternula saundersi*. Mínimo un ejemplar en vuelo en el ferry de Masirah 20°39'33.6"N 58°51'08.1"E. Se observan 5 primarias externas totalmente oscuras des de su base. Muchos Little Tern en Masirah y otros sitios del litoral.



Left: Saunders's Tern. Àlex Ollé. Liwa. Enero 2015. Se observan hasta cinco primarias externas oscuras.

White-cheeked Tern *Sterna repressa*. Mínimo un ejemplar en la playa de Al Mughsayl (10.15). Se observó una coloración uniformemente gris en todo el dorso y obispillo hasta la cola, a diferencia de los Common Tern más abundantes.



White-cheeked Tern. Àlex Ollé. Taqah. Enero 2015. Partes superiores uniformemente grises.

Pallas's Gull *Larus ichthyæetus*. Al menos varios ejemplares en Ras Abu Rasas, Masirah (8.4 C) y en Khawr Durf (9.2).

Mew Gull *Larus canus*. 1 ejemplar de 1r invierno en Shannah 20°44'50.1"N 58°43'52.8"E.

Caspian Gull *Larus cachinnans chachinnans*. Tan solo dos ejemplares de 1r invierno en Shannah 20°44'50.1"N 58°43'52.8"E. Más común en las playas del mar arábigo, N de Oman, vistos en el primer viaje de enero de 2015.

Crowned Sandgrouse *Pterocles coronatus*. 1 ejemplar en la pista entre Mudday a Ubar.



Crowned Sandgrouse. Àlex Ollé. Al Mazyunah-Ubar. Diciembre 2016.

Oriental Turtle Dove *Streptopelia orientalis*. Escuchado un ejemplar a última hora ya sin luz en el oasis de Qatbit (7.4 D).

Asian Koel *Eudynamys scolopaceus*. 1 ejemplar hembra en los Balid Farm (7.5) 18°21'20.7"N 54°00'41.4"E. En enero de 2015 se observó otro ejemplar en el mismo sitio.

Arabian Spotted Eagle Owl *Bubo (africanus) milesi*. Hasta 5 ejemplares observados en las Dhofar en una jornada nocturna de dos horas.



Arabian Spotted Eagle Owl. Albert Burgas. Dhofar. Diciembre 2016.

Little Owl *Athene noctua*. Algún ejemplar escuchado sin determinar, y un ejemplar visto a placer en las Dhofar con un fenotipo propio de *lilith*. Cabe comentar que existe contacto entre *saharae* y *lilith*, con ejemplares más próximos fenotípicamente a una u otra subespecie.



Little Owl. Albert Burgas. Dhofar. Diciembre 2016. Ejemplar con fenotipo de Lilith Owl *Athene (noctua) lilith*.

Desert Tawny Owl *Strix hadorami*. Un macho en el Wadi As Shuwaymiyyah 17°55'08.9"N 55°00'28'51.8"E., dos machos mas al final del Wadi de Al Mughasyl (10.15), y una hembra cerca de Hasik 17°13'55.0"N 55°15'17.1"E.



Desert Tawny Owl. Albert Burgas. Al Mughsayl. Diciembre 2016.

Omani Owl *Strix butleri*. 1 macho visto y escuchado en las Al Hajar mountains.



Omani Owl. Albert Burgas. Al Hajar. Diciembre 2016.

Sykes's Nightjar *Caprimulgus mahrattensis*. 1 ejemplar en vuelo y posado cazando insectos en el oasis de Muntasar (7.3 D). Se trata de la 1ª citación para Oman.

Egyptian Nightjar *Caprimulgus aegyptius*. 1 ejemplar en vuelo y parado a última hora en el oasis de Qatbit (7.4 D).

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*. 1 ejemplar en Khawr Rawri ya controlado con anterioridad (10.7).

Dunn's Lark *Eremalauda dunni*. 1 macho cantando al lado de la carretera entre Mudday y Al Mazyunah.

Bar-tailed Lark *Ammomanes cinctura*. 1 ejemplar en la pista de Mudday a Ubar.

Singing Bush Lark *Mirafra cantillans*. Muy abundante en los Jarziz Farm (10.1 A), Salalah.



Singing Bush Lark. Àlex Ollé. Jarziz Farm. Diciembre 2016. Juvenil.

Long-billed Pipit *Anthus similis*. Diferentes aves en las Dhofar, pertenecientes a *arabicus*.



Long-billed Pipit. Àlex Ollé. Dhofar. Enero 2015.

Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*. 1 ejemplar en Filim (8.1 C).



Olive-backed Pipit. Albert Burgas. Filim. Diciembre 2016.

Grey Hypocolius *Hypocolius ampelinus*. 1 hembra en Mudday 17°28'46.3"N 53°21'07.4"E. En el anterior viaje hasta 8 ejemplares en esta misma localidad.



Grey Hypocolius. Miguel Àngel Fuentes. Mudday. Enero 2015. 1 ejemplar macho.

European robin *Erithacus rubecula*. 1 ejemplar en el Wadi Muaydin 22°59'21.4"N 57°40'15.2"E que representa una de las pocas citas en Oman. Representaría la 8ª cita para Omán.

Eastern Nightingale *Luscinia megarhynchos*. 1 ejemplar en la depuradora de Raysut 16°59'31.3"N 53°56'18.6"E con caracteres de la ssp. *hafizi* (=golzii).



Eastern Nightingale. Albert Burgas. Raysut. Diciembre 2016. Ejemplar pálido y con la cola muy larga (sensación de Rufous Bush Robin).

Eversman's Redstart *Phoenicurus erythronotus*. 2 ejemplares en Sayq Plateau (4.3 N). Dos machos, uno adulto y uno de 1r invierno, en el que uno de ellos ya estaba localizado y el otro es nuevo.



Eversman's Redstart. Albert Burgas. Sayq Plateau. Diciembre 2016.

Black-throated Trush *Turdus atrogularis*. Influx en el invierno 2016-2017. Vimos ejemplares aislados: 2 en Masirah (8.2 B) y 1 en Balid Farm (7.5). No obstante, detectamos un grupo de un mínimo de 40 ejemplares en Sayq plateau (4.3 N) así como un ejemplar mas en Wadi Bani Habib (4.3 L).



Black-throated Trush. Albert Burgas. Hasta 12 ejemplares juntos. Esta observación de +40 ejemplares representa la más numerosa echa jamás en Omán.

Song Trush *Turdus philomelos*. Varios ejemplares aislados en el viaje, siendo en este último viaje menos abundante que Black-throated.

Scrub Warbler *Scotocerca inquieta*. 2 ejemplares pertenecientes a *grisea* en Sayq plateau (4.3 N).



Scrub Warbler. Àlex Ollé. Sayq Plateau. Diciembre 2016.

Eastern Olivaceous Warbler *Iduna pallida*. Ejemplares pertenecientes a *elaeica*: 1 en Wadi Darbat (10.8), 1 en la depuradora de Masirah (8.2 B) y 2 en Ayn Hamran (10.4).

Ménétriés Warbler *Sylvia mystacea*. Un ejemplar en Shisr (7.6) y otro ejemplar en Wadi Darbat (10.8).

Arabian Warbler *Sylvia leucomelaena*. Varios ejemplares en Ayn Hamran (10.4) pertenecientes a la ssp. nominal *leucomelaena*, las cuales presentan finas listas en las infracobertoras caudales. La corta proyección primaria es de una buena guía para diferenciar de Eastern Orphean Warbler.



Arabian Warbler. Albert Burgas. Ayn Hamran. Diciembre 2016.

Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*. El complejo Lesser Whitethroat es un tema difícil, especialmente con respecto a la variación en el lado este de su rango. En los últimos años ha habido algunas investigaciones que están arrojando algo de luz. En 2013, Olsson et al. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790313000055>) presentó la distribución de las diferentes subespecies, lo que indica que *minula* no inhierna en la Península Arábiga y su rango de cría se limita a China. Por lo tanto, Desert Little Whitethroat que inhiernan en Omán tienen que ser *halimodendri*, que tiene un reclamo muy característico de acuerdo a las grabaciones encontradas en Xeno-canto (<http://www.xeno-canto.org/species/Sylvia-curruca?query=ssp:%20halimodendri%20>). Para hacer la cuestión más compleja, muy recientemente Votier et al. (2016) encontraron algunas aves fenotípicamente tipo *halimodendri* que genéticamente e isotópicamente encajaban con *blythi* (<http://link.springer.com/article/10.1007/s10336-016-1351-5>). Aunque en esta investigación estudiaron

algunas aves de Omán que eran *halimodendri* perfectos en todos los sentidos, también tenían algunos *blythi* de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, aunque se supone que los *halimodendri* son los más comunes en invierno, ambas subespecies llegan a la región. Esto no es inesperado ya que *blythi* tiene una amplia distribución en Siberia, al norte de la distribución de *halimodendri*. No sabemos de ninguna referencia mejor para identificar *blythi* / *halimodendri* que usando su reclamo. Sólo hemos comparado con las grabaciones encontradas en Xeno-canto y allí la mayoría de los sonidos atribuidos a *blythi* son del área que Votier et al. atribuyó arbitrariamente a la supuesta zona de intergradación dentro de ambos taxones. Dicho esto, la mayoría de los reclamos que escuchamos en Omán coincidieron con *halimodendri* de Xeno-canto, y sólo un pájaro en Qatbit (7.4) tuvo reclamo idéntico a la siguiente grabación atribuida a *blythi* de la provincia de Aqmola, en el centro de Kazajstán (Xeno-canto.org/155770).

No estamos seguros si hemos encontrado ninguna *curruca* nominal, pero por lo menos escuchamos un par de pájaros reclamando como esta subespecie, sin embargo no fuimos tras ellos. Finalmente, encontramos dos pájaros con la apariencia de *althaea* por encima de 2.000 metros en las montañas de Al Hajar, uno durante este viaje y el otro en 2015. En ninguno de estos casos escuchamos su voz.



Desert Lesser Whitethroat 'presumed' *halimodendri*. Àlex Ollé. Enero 2015. Al Hajar mountains.

Hume's Leaf Warbler *Phylloscopus humei*. 1 ejemplar en Ayn Hamran (10.4) y 1 ejemplar en Qatbit (7.4).



Hume's Leaf Warbler. Albert Burgas. Qatbit. Diciembre 2016.

Plain Leaf Warbler *Phylloscopus neglectus*. Unos pocos ejemplares en el Wadi Al Muaydin (4.3 E).



Plain Leaf Warbler. Àlex Ollé. Enero 2015. Al Hajar mountains. Pequeño y colicorto, con reclamo diagnóstico.

Chiffchaff *Phylloscopus collybita*. Es sin duda uno de los temas más complejos presentes en Oman, siendo además uno de los passeriformes más comunes aquí. Todas las aves en las que se les ha escuchado el reclamo, este era el típico de *tristis*. En ningún caso se ha escuchado reclamo de *collybita*. No obstante, a menudo la divergencia entre patrones de coloración no se ajustan a los descritos para los *tristis* clásicos (Dean & Svensson 2005), y después de un buen análisis, aparecen ápices de coloraciones amarillentas que no encajan con estos. Además, en Masirah, algunos ejemplares que se pusieron a cantar, resultaban ser cantos mixtos entre *collybita* y *tristis*, e incluso una o dos aves con reclamo previo de *tristis* acabaron cantando como *collybita*. Esta opción apunta a un intergrade entre *collybita abietinus* y *tristis*, hablando pues de la forma '*fulvescens*' (Marova et al. 2013; Copete com. pers.)





Chiffchaff. Àlex Ollé. Masirah. Diciembre 2016. Ave con reclamo de *tristis* y canto de *collybita*. Coloraciones amarillas en la lista superciliar, pecho y flancos; aspectos típicos de intergrades '*fulvescens*'.

Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*. Diferentes ejemplares en Filim (8.1 C), Wadi Darbat (10.8), depuradora de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E. y Ayn Hamran (10.4).

Nile Valley Sundbird *Hedydipna metallica*. Algunos ejemplares en Mudday 17°28'46.3"N 53°21'07.4"E.

Turkestan Red-tailed Shrike *Lanius (isabellinus) phoenicuroides*. 1 macho en Ayn Hamran (10.4).



Turkestan Red-tailed Shrike. Àlex Ollé. Ayn Hamran. Diciembre 2016. Partes inferiores sin tonos ocre, con antifaz muy marcado y lista superciliar clara muy ancha y extensa. La coloración del pileo y del dorso también se ajusta a la especie propuesta. Aún así, en Omán se considera muy raro o ausente en invierno según la lista de Omán versión 7.6., y la variabilidad en los plumajes de Isabelline Shrike y su alta densidad hacen ser muy cautelosos en su identificación.

Steppe Grey Shrike *Lanius (meridionalis) pallidirostris*. 1 ejemplar en Masirah, y otros 5 ejemplares en Shisr (7.6).



Steppe Grey Shrike. Àlex Ollé. Liwa. Enero 2015.

Yemen Serin *Crithagra menachensis*. Unos pocos ejemplares en Tawi Atayr (10.9).

Especies solamente observadas en el 1r viaje (Enero 2015):

Lesser Whistling Duck 1 ejemplar en el Wall de Al Mughsayl (10.15); **Cotton Pygmy Goose** algunos ejemplares en el litoral sud; **Lanner Falcon** 1 juvenil Balid Farm (7.5); **Peregrine Falcon** 2 adultos de origen nórdico, macho y hembra en 18°07'52.7"N 56°32'56.1"E; **White-breasted Waterhen** 1 ejemplar en Al Mughsayl (10.15); **Spur-winged Lapwing** 1 ejemplar en la planta depuradora de Raysut 16°59'38.1"N 53°56'14.2"E; **Spotted Sandgrouse** muchos ejemplares en el desierto central, especialmente en Balid Farm (7.5); **Long-eared Owl** 1 ejemplar en Balid Farm (7.5); **Blyth's Pipit** 1 ejemplar en Jarziz Farm (10.1); **Masked Shrike** 1 ejemplar en Ayn Hamran (10.4) y otro en Salalah Farms (10.1); **Black Drongo** 1 ejemplar en Ayn Hamran (10.4); **Rosy Starling** varios ejemplares en Sahnawt Farm (10.1 E).



Anna Planella y Albert Burgas
rastreando por algún
lugar de la Mancha....



Blyth's Pipit © Àlex Ollé. 9a cita para Omán.



Ricard Font,
nuestro "guia"
local en Filim..

List de mamíferos y anfibios

MAMMALS

Scientific name	English name	Location (approximate number)	Observation
<i>Vulpes vulpes arabica</i>	Arabian red fox	Dhofar (≥ 7); Muntasar (1); Qatbit (1); Al Hajar (≥ 1); Mudday (≥ 1)	Seen and listened
<i>Canis lupus arabs</i>	Arabian wolf	Dhofar (8)	Seen and listened
<i>Mellivora capensis</i>	Honey badger	Dhofar (Ayn Hamran)	Signals and tracks
<i>Felis silvestris gordonii</i>	Arabian wildcat	Dhofar (≥ 1)	Seen
<i>Gazella gazella cora</i>	Mountain gazelle	Muntasar (2)	Seen
<i>Hystrix indica</i>	Indian Crested Porcupine	Dhofar (2)	Seen and signals
<i>Sousa chinensis</i>	Indo-Pacific humpback dolphin	Fararah (≥ 10) ; Fazaya Beach (≥ 5)	Seen

AMPHIBIANS

Scientific name	English name	Location (approximate number)	Observation
<i>Bufo dhufarensis</i>	Dhofar Toad	Ayn Hamran (3)	Seen
<i>Bufo arabicus</i>	Arabian Toad	Al Hajar (2)	Seen

Buen viaje !!

