


CENTRAL INDIA WINTER TOUR: 6 al 15 de Diciembre de 2017

Compilado por Alberto Bueno; Fotografías: Jesús Lavedán, Daniel Cazo y resto del grupo

Tour Group: Joséle Saiz, Oriol Campañá, Daniel Cazo, José María Canudo, Javier Bitrián, Jesús Lavedán y Alberto Bueno

Descripción: Viaje de corta duración a la zona central de la India (regiones de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh) visitando diferentes espacios naturales (Aravalli Biodiversity Park, Sultanpur Bird Sanctuary y los Parques Nacionales de Ranthambore, Keoladeo y Kanha), además de otras zonas de interés para aves: alrededores del Resort Heritage Haveli, cultivos cerealistas de Rasulpura, Taj Mahal, río Yamura, Mughal Riverfront Garden en Agra, Tuli Tiger Resort Gardens-río Banjer y planicies semiáridas de Hathitara entre Niwas y Gwara.



Anhinga Asiática
(Anhinga melanogaster)



Tigre de Bengala
(Panthera tigris tigris)



Drongo de Raquetas Grande
(Dicrurus paradiseus)

Itinerario y resumen de las aves observadas:

Día 6: Aravalli Biodiversity Park (Delhi)

La llegada a Delhi alrededor del mediodía permitió realizar una visita al Parque de Aravalli en la capital india. En un paseo de apenas dos horas de duración fueron observadas 41 especies y resultó una excelente introducción a la avifauna de la India Central.

Un mínimo de 20 pavos reales (*Pavo cristatus*), francolís gris (*Francolinus pondicerianus*), garcillas bueyeras (*Bubulcus ibis*), nuestra primera águila moteada (*Aquila clanga*), gavilán Chikra (*Accipiter badius*) -citado prácticamente todos los días del viaje-, un buen número de milaneros negros (*Milvus migrans*), paloma bravía (*Columba livia*), tórtola turca (*Streptopelia decaocto*), tórtola senegalesa (*Streptopelia senegalensis*) -especies muy comunes durante el resto del viaje- y hasta tres cucales chinos sureños (*Centropus parroti*) fueron observados con facilidad.



Águila moteada
(*Aquila clanga*)



Tórtola senegalesa
(*Streptopelia senegalensis*)

En el cielo sobrevolaban varios vencejos palmeros asiáticos (*Cypsiurus balasiensis*), indios (*Zoonavena sylvatica*), algunos aviones oscuros (*Ptyonoprogne concolor*) y golondrina común (*Hirundo rustica*), mientras tenían lugar los primeros contactos con otras especies comunes que en días posteriores nos resultarían muy familiares: Alción de Esmirna (Alción *smyrnensis*), barbudos caldereros (*Psilopogon haemacephalus*) y cabecipardos (*P. zeylanicus*), las omnipresentes cotorras de Kramer (*Pssitacula krameri*), la siempre confiada urraca vagabunda (*Dendrocitta vagabunda*) y el abundante cuervo indio (*Corvus splendens*).



Avión Oscuro
(*Ptyonoprogne concolor*)



Barbudo Calderero
(*Psilopogon haemacephalus*)

Nuestros primeros bulbules cafres (*Pycnonotus cafer*) y orfeo (*P. focusus*), el muy extendido por todo el país mosquitero de Hume (*Phylloscopus humei*), el pequeño sastrecillo común (*Orthotomus sutorius*) y hasta cinco especies de Prinias (*P. hodgsonii*, *P. sylvatica*, *P. socialis*, *P. inornata* y *P. buchanani*) que nos mantuvieron bien entretenidos y nos permitieron entrar de lleno en este género tan representativo de los passeriformes del subcontinente indio.



Prinia de Hodgson (*Prinia hodgsonii*)



Tarabilla Terrestre (*Copsychus fulicatus*)

La lista se completó con nuestras primeras currucas zarcerillas (*Sylvia curruca*), único sílvido presente en la India en época invernal y ampliamente distribuido por toda su geografía, además de los primeros turdoídes: el gris (*T. malcolmi*) y matorralero (*T. striata*), junto a la bonita tarabilla terrestre (*Copsychus fulicatus*), colirrojo tizón (*Phoenicurus ochrurus*) y colinegro indio (*Cercomela fusca*).



Colinegro Indio (*Cercomela fusca*)



Mosquitero de Hume (*Phylloscopus humei*)

No faltaron el estornino pío (*Gracupica contra*) y el miná común (*Acridotheres tristis*), además del bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*) y el gorrión común (*Passer domesticus*). Una lista a la que se unió la única y fugaz observación de un ejemplar de timalí ojigualdo (*Chrysomma sinense*), que desafortunadamente no se repitió en días venideros.



Estornino Pío (*Gracupica contra*)



Miná Común (*Acridotheres tristis*)

Día 7: Sultanpur National Park-Delhi-Ranthambore National Park (by train)

La visita a los humedales del lago Sultanpur (Haryana) sumó las primeras especies de aves acuáticas: Suirirí de Java (*Dendrocygna javanica*), ánsar común (*Anser anser*), ánsar indio (*A. indicus*), pato crestado (*Sarkidiornis melanotos*), ánades frisos (*A. strepera*), silbón (*A. penelope*), azulón (*A. platyrhynchos*), picopinto indio (*A. poecilorhyncha*), cuchara (*A. clypeata*), rabudo (*A. acuta*), cerceta común (*A. crecca*), pato colorado (*Netta rufina*) y porrones europeo (*Aythya ferina*), pardo (*A. nyroca*) y moñudo (*A. fuligula*).



Jabirú asiático (*Ephippiorhynchus asiaticus*)



Cormorán de Java (*Microcarbo niger*)

Además fueron vistos el zampullín común (*Tachybaptus ruficollis*), al menos cinco espectaculares jabirús asiáticos (*Ephippiorhynchus asiaticus*) -alguno en su nido-, varias decenas de tántalos indios (*Mycteria leucocephala*), cormorán de Java (*Microcarbo niger*), anhinga asiática (*A. melanogaster*), garzas real e imperial, intermedia, común, bueyera e india, moritos comunes (*Plegadis falcinellus*) y los ibises oriental (*Threskiornis melanocephalus*) y verrugoso (*Pseudibis papillosa*), junto a varias espátulas comunes (*Platalea leucorodia*).



Tántalo Indio (*Mycteria leucocephala*)



Garcilla India (*Ardeola grayii*)

Primeras anotaciones de gallineta pechiblanca (*Amaurornis phoenicurus*), calamón (*Porphyrio poliocephalus*), gallineta común y focha común, cigüeñuelas, avefría coliblanca (*Vanellus leucurus*), andarríos chico y archibebe claro, además de un distante alcaraván piquigruoso indio (*Esacus recurvirostris*) visto en el trayecto.



Calamón (*Porphyrio poliocephalus*)



Garceta Intermedia (*Mesophoyx intermedia*)

En el recorrido de por la mañana cabe destacar la observación de tres elanios comunes (*Elanus caeruleus*), especie que a la postre resultaría ser una de las rapaces más abundantes a lo largo de todo el tour, además del deleite que supuso la presencia de una pareja de águilas perdiceras (*Aquila fasciata*) que trataban de cazar muy activamente a las acuáticas presentes en las aguas de Sultanpur, mientras los mochuelos brahmanies (*Athene brama*) dormitaban plácidamente en sus posaderos.



Ardilla India de las palmeras (*Funambulus pennantii*)



Mochuelo Brahmanie (*Athene brama*)

Otras especies añadidas a la lista fueron el vencejo moro (*Apus affinis*), abubilla común (*Upupa epops*), pito bengalí (*Dinopium benghalense*), alcotán Turumti (*Falco chiquera*), alcaudón Schach (*Lanius schach*), drongo real (*Dicrurus macrocercus*), avión paludicola asiático (*Riparia chinensis*), golondrina daúrica (*Cecropsis daurica*), mosquitero común siberiano (*Phylloscopus collybita tristis*), cisticola buitron (*Cisticola juncidis*), shama oriental (*Copsychus saularis*), ruiseñor pechiazul (*Luscinia svecica*), papamoscas papirojo (*Ficedula parva*), estornino pinto (*Sturnus vulgaris*), lavandera cetrina (*Motacilla citreola*) y bengalí rojo (*Amandava amandava*).



Papamoscas Papirojo (*Ficedula parva*)



Bengali Rojo (*Amandava amandava*)

El desplazamiento en tren a mediodía que nos condujo desde Delhi a nuestro siguiente destino en la zona de Ranthambore duró unas seis horas, siendo lo más destacado en las innumerables paradas efectuadas, la anotación de nuestro primer cuervo picudo (*Corvus culminatus*) y un nutrido dormitorio de cotorras de Kramer (varios centenares) que acudían al anochecer a un dormitorio situado junto a la E.F. de Hindaun City.



Cuervo Picudo (*Corvus culminatus*)



Shama Oriental (*Copsychus saularis*)

Para el autor de este report la jornada acabó en la comisaría del pequeño pueblo de Sawai Modhapur, última parada del recorrido. El motivo fue el robo de mi documentación en la estación de tren de Delhi y la correspondiente gestión de la denuncia, que fue realizada en idioma hindú, manuscrita y con papel de calco. Lo único para lo que me ha servido es como motivo decorativo y recuerdo del desagradable evento.

Día 8: Ranthambore National Park (safari)-alrededores del Resort Heritage Haveli



Parque Nacional de Ranthambore



Sambar (*Rusa unicolor*) hembra

Este espacio protegido pasa por ser uno de los más grandes del país y se extiende por una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados, situándose en el borde de una vasta meseta con límites al norte en el río Banas y al sur el río Chambal. Recibe su nombre de la histórica fortaleza de Ranthambore, que queda ubicada dentro del Parque.



Entrada al P. N. De Ranthambore



Avefría India (*Vanellus indicus*)

En un safari previamente organizado para tratar de ver al tigre de Bengala -con resultado negativo- pudimos anotar algunas nuevas especies para la lista: tarro canelo (*Tadorna ferruginea*), picotenaza asiático (*Anastomus oscitans*), culebrera Chiila (*Spilornis cheela*), águila azor variable indiana (*Nisaetus cirrhatus*), águila esteparia (*Aquila nipalensis*), avefría india (*Vanellus indicus*), chorlito chico (*Charadrius dubius*), aguja colinegra (*Limosa limosa*), agachadizas común y colirrara (*Gallinago stenura*), andarríos grande, archibebe oscuro, archibebe fino, andarríos bastardo, archibebe común, pagaza piconegra, fumarel cariblanco y charrán indio (*Sterna aurantia*).



Cotornix cabeciazules (*Psittacula cyanocephala*)

Águila Azor Variable Indiana (*Nisaetus cirrhatus*)

Otras aves inéditas añadidas al listado en nuestra visita a Ranthambore fueron la tórtola moteada oriental (*Streptopelia chinensis*), vinago patigualdo (*Treron phoenicopterus*), martín pescador común (*Alcedo atthis*), martín pescador pío (*Ceryle rudis*), abejaruco esmeralda oriental (*Merops orientalis*), carraca india (*Coracias benghalensis*), cotornix alejandrinas (*Psittacula eupatria*) y cabeciazul (*P. cyanocephala*), alcaudones dorsicastaño (*Lanius vittatus*) y real (*L. excubitor*), abanico cejiblanco (*Rhipidura aureola*), tarabilla siberiana (*Saxicola maurus*), lavandera india (*Motacilla maderaspatensis*), capuchino picoplateado indio (*Euodice malabarica*) y correlimos común (*Calidris alpina*).



Tórtola Moteada Oriental
(*Streptopelia chinensis*)



Cotornix Alejandrinas
(*Psittacula eupatria*)

La semidesértica zona que circunda los alrededores del Hotel Heritage Haveli donde nos alojábamos y ya fuera de los límites del Parque, resultó ser el lugar escogido para buscar uno de los "highlights" del viaje: la ganga india (*Pterocles indicus*). Un agradecido paseo permitió obtener excelentes vistas de esta especie y al menos 20 diferentes ejemplares fueron observados a placer y a muy corta distancia.



Ganga India (*Pterocles indicus*)

En ese mismo área se anotaron otras especies “esteparias” como el alcaraván indio (*Burhinus indicus*), perdicilla golirroja (*Perdicula asiatica*), alcaudón isabel (*Lanius isabellinus*), alondra india (*Mirafra erythroptera*), terrera común (*Calandrella brachydactyla*), turdoide indio (*Turdoides caudata*), collalbas variable (*Oenanthe picata*) e Isabel (*O. isabellina*), además de estornino de las pagodas (*Sturnia pagodarum*), bisbita campestre (*Anthus campestris*), un inesperado torcecuello euroasiático (*Jynx torquilla*) y nuestro primer suimanga asiático (*Cinnyris asiaticus*) junto a la entrada del Resort.



Estornino de las Pagodas (*Sturnia pagodarum*)



Collalba Variable (*Oenanthe picata*)


Sin duda los pájaros del día fueron los tres faisancillos moteados (*Galloperdix lunulata*) -una pareja y un tercer individuo- observados muy de cerca en el Parque de Ranthambore por la totalidad del grupo, al ser una de las únicas y escasas especies propiamente endémicas del centro de la India interior.



Pareja de Faisancillos Moteados (*Galloperdix lunulata*) en el P. N. de Ranthambore

Día 9: Ranthambore-Rasulpura-Keoladeo National Park (by car)

Agradable y cómoda jornada en minibus, aunque como ya viene siendo habitual de larga duración y con muchos kilómetros de recorrido hasta llegar a la ciudad de Bharatpur, donde en sus alrededores se ubicaba nuestro alojamiento.



Parque Nacional de Keoladeo

El famoso Parque Nacional de Keoladeo -antes conocido como el Santuario de aves de Bharatpur- es un excelente lugar para el pajareo, aunque depende mucho del nivel de inundación de los humedales que lo componen (este invierno en niveles bastante bajos) y fue creado como un coto de caza para los majarás de Bharatpur a mediados del siglo XVIII.

Desde luego en este viaje han sido muchas las formas de llevar adelante el "birdwatching", pero la experiencia de pajarear en un asiento mientras eres arrastrado por un ciclista de avanzada edad supera todas las expectativas. Este tipo de vehículos conocidos como "Rickshaws" son sin duda una atracción añadida para visitar el Parque.

Aún teniendo en cuenta las condiciones hídricas del humedal, las cifras de las aves acuáticas más comunes en la India no fueron desdeñables y además pudimos anotar, entre otras, algunas nuevas especies para el listado: alimoche común (*Neophron percnopterus*), aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*), dos fabulosos ejemplares de grulla Sarus (*Antigone antigone*), jacana bronceada (*Metopidius indicus*), búho de Coromandel (*Bubo coromandus*), autillo oriental (*Otus sunia*), drongo cenizo (*Dicrurus leucophaeus*), bulbul orejiblanco (*Pycnonotus leucotis*), mosquitero verdoso (*Phylloscopus trochiloides*), carricero estentóreo (*Acrocephalus stentoreus*) y lavandera blanca (*Motacilla alba*).



Grullas Sarus (*Antigone antigone*)



Búho de Coromandel (*Bubo coromandus*)

Seis especies inéditas hasta esta jornada fueron sumadas a la lista. La primera de ellas el corredor indio (*Cursorius coromandelicus*) del que pudimos ver muy bien tres ejemplares en unos cultivos agrícolas cercanos a la localidad de Rasulpura junto a la única y distante collalba desértica (*Oenanthe deserti*) del tour, ceniciento chico (*Tephrodornis pondicerianus*), tejedor baya (*Ploceus philippinus*), anteojitos oriental (*Zosterops palpebrosus*) y avefría malabar (*Vanellus malabaricus*), vistas todas ellas en el trayecto de carretera entre Ranthambore y Bharatpur.



Avefría Malabar (*Vanellus malabaricus*)



Corredor Indio (*Cursorius coromandelicus*)

A estas se añade el único mosquitero sencillo (*Phylloscopus neglectus*) observado en el viaje y que pudo ser registrado en una pequeña charca cercana a Bharatpur. Merecido descanso en el Hotel Kadamb Kunj Resort y el repaso a una lista acumulada que ya alcanzaba la cifra de 168 diferentes especies vistas en los cuatro primeros días del viaje.

Día 10: Keoladeo National Park (Rickshaw vehicle)-Bharatpur Village

Visita de nuevo al paraíso del majará Surja Mal (Keoladeo) con el adictivo método - especialmente si no eres tú el que pedalea- del Rickshaw, que permitió disfrutar de numerosas anátidas y garzas, además de un buen surtido de águilas entre ellas varias moteadas, un águila india (*Clanga hastata*), un águila calzada (*Hieraaetus pennatus*), otra esteparia y un imponente adulto de águila imperial oriental (*Aquila heliaca*) perchando en lo alto de un árbol, que por momentos nos transportó - salvando las diferencias y la determinación específica- a las marismas de Doñana.



Daniel, Oriol, Javier, Cani, Jesús, Boletas y Alberto, en sus respectivos "Rickshaws"

Descanso al mediodía con baño incluido en la piscina del Hotel para alguno de nosotros y relajadas observaciones en los jardines del Resort, escuchando el ya familiar reclamo de los sastrecillos comunes (cuyo nombre hace honor a la costumbre de construir su nido en el interior de hojas "cosidas" por él) y nuevas observaciones de algún ejemplar de elanio común y carraca India, perchando en los cables y postes de las inmediaciones del complejo.



Elanio Común (*Elanus caeruleus*)



Carraca India (*Coracias benghalensis*)

En la tarde nuevamente alquilamos nuestros respectivos Rickshaws y tras observar mezclados con varios jabalíes hasta cuatro ejemplares de grulla Sarus, nos dejamos llevar placenteramente de la mano de nuestro guía Ratan Singh en busca del esquivo avetorillo negro (*Dupetor flavicollis*), sin que finalmente tuviéramos éxito y dedicando nuestro tiempo al disfrute de tan singular y agradecido espacio natural, donde la vida salvaje –especialmente los abundantes ciervos moteados, sambares y barasingas– convive en una armonía realmente inigualable con la avifauna presente.



Carricero de Blyth (*Acrocephalus dumetorum*)



Ciervo moteado o Chital (*Axis axis*) macho

Este día apuntamos nuestras primeras cigüeñas lanudas asiáticas (*Ciconia episcopus*), martinete común (*Nycticorax nycticorax*), autillo indio (*Otus bakkamoena*), hasta cuatro calaos grises indios (*Ocyrceros birostris*), oropéndola india (*Oriolus kundoo*), zarcero de Sykes (*Iduna rama*), carricero de Blyth (*Acrocephalus dumetorum*), tarabilla pía (*Saxicola caprata*), gorrión cuelligualdo (*Petronia xanthocollis*) y zarcero escita (*Iduna caligata*).



Observando aves limícolas en la ciénaga de Bharatpur

Acabamos la jornada en una pequeña localidad de las afueras de Bharatpur, donde en un infesto riachuelo –más bien una cloaca– observamos un macho de aguatero bengalí (*Rostratula benghalensis*) y donde en una pequeña zona inundada –todavía más infesta si cabe– añadimos a la lista chorlitejo patinegro, combatiente y correlimos de Temminck, elevando el cómputo total del viaje a las 186 especies.

Día 11: Bharatpur-Agra-Taj Mahal-Yamuna River-Mughal Riverfront Garden

Inevitable jornada con tintes culturales e históricos, en la que visitamos la considerada una de las siete maravillas arquitectónicas del mundo moderno: El Taj Mahal en Agra, que además ofreció algunas buenas oportunidades de pajareo en el propio recinto y en el cauce del adyacente río Yamuna.

Entre las 8 y las 10 de la mañana realizamos en minibús el trayecto que separaba Bharatpur y Agra, dedicando el resto del día hasta la hora de partida de nuestro tren nocturno hacia el próximo destino, a tratar de obtener el mayor rédito posible a las posibilidades de observar aves en esta concurrida ciudad india.



El grupo al completo en los jardines del Taj Mahal

El mausoleo situado a orillas del río Yamuna, construido a mediados del siglo XVII por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, no estaba demasiado concurrido y aunque la mayoría de las especies vistas ya habían sido anotadas previamente (alimoche, milano negro, fumarel cariblanco, charrán indio y diversas limícolas en el cauce del río), aún nos permitió aumentar la lista con registros de varios correlimos menudos, avoceta y zarapito real.



Lavandera India (*Motacilla maderaspatensis*)




Charrán Indio (*Sterna aurantia*)

Desde el propio recinto se obtiene una magnífica vista del río y aunque desafortunadamente no fue posible localizar ningún rayador indio (*Rynchops albicollis*), ni tampoco charrán ventinegro (*Sterna acuticauda*), pudimos certificar que parte de los milanos negros que sobrevolaban el cauce (al menos 10 de ellos) pertenecían inequívocamente a la especie milano negro orejinegro (*Milvus lineatus*).

Tras disfrutar de una agradable comida exenta de mucho picante en uno de los restaurantes de la ciudad y al objeto de emplear la tarde pajareando, decidimos trasladarnos al otro lado del río. Allí se sitúa una zona de jardines vigilada, en la que empleamos el tiempo buscando pequeños passeriformes (nada nuevo) e intentando acceder a las orillas del río. Acción que fue repetidas veces frenada por un insistente guarda privado empeñado en no dejarnos acceder.



Pito Bengalí (*Dinopium benghalense*)



Alción de Esmirna (*Alción smyrnensis*)

Vista la situación optamos por movernos río arriba, hasta un puente donde se ubicaban numerosos grupos de gente lavando ropa. Sorteando las defecaciones humanas que invadían todo el terreno, aún pudimos anotar nuestras primeras y únicas avefrías fluviales (*Vanellus duvaucelii*) -alrededor de 15 ejemplares- y no mediando mucho tiempo, tomamos la acertada decisión de trasladarnos a otro lugar algo más higiénico y a ser posible medianamente "civilizado".

El lugar elegido fueron los jardines de Mughal Riverfront, que nos dio excelentes vistas de varias prinias y dos bonitos barbudos caldereros (*Psilopogon haemacephalus*) los cuales insistentemente a pleno pulmón y con buena luz, no paraban de emitir su famoso reclamo de herrero martillando el yunque (de donde deriva su nombre anglosajón de Coppersmith).



Prinia cenicienta (*Prinia socialis*)



Capuchino Picoplata Indio (*Euodice malabarica*)

En los edificios de los jardines los vencejos moros (*Apus affinis*) ocupaban varios nidos y alguno de nosotros aún pudo anotar una nueva especie para el viaje: 3 gaviotas centroasiáticas (*Chroicocephalus brunnicephalus*) que volaban a última hora río abajo, mientras varias lavanderas boyeras de la subespecie "beema" (Sykes's Yellow Wagtail) se alimentaban cerca de un grupo de chavales que no tuvieron reparo en echarse algunos tragos de las poco cristalinas aguas de este principal afluente del Ganges.



Río Yamuna a su paso por Agra



Suimanga Asiático (*Cinnyris asiaticus*)

Traslado a la E.F. de Agra para tomar el "infernial" tren nocturno -ahorremos comentarios- que nos habría de conducir durante toda la noche a la ciudad de Jabalpur, con el objeto de alcanzar nuestro último y nada decepcionante destino: El Parque Nacional de Kanha que inspiró a Rudyard Kipling's para escribir su afamado "Libro de la Selva".

Día 12: Jabalpur-Safari Kanha National Park-alrededores del Tuli Tiger Resort-Río Banjer

Tras recorrer en coche un largo trayecto desde Jabalpur a nuestro Resort en Kanha, a las tres de la tarde pudimos disfrutar del primero de los cinco safaris contratados para visitar el Parque y tratar de cumplir con una de las mayores expectativas depositadas en este viaje: la observación del tigre de Bengala en su medio natural.

No hubo tigre, pero vista la potencialidad de este espacio natural y su selva, reforzamos nuestros ánimos de ir aumentando la lista de aves con algunas especies que aquí alcanzan su límite norte de distribución en el subcontinente indio, además de otras que hasta esta jornada se habían mostrado esquivas.



Buitre Indio (*Gyps indicus*)



Urraca Vagabunda (*Dendrocitta vagabunda*)

Buenas observaciones de varios calaos grises indios, barbudos caldereros y avefría malabar, abrieron la puerta a nuevas aves para el checklist: lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*), drongo de raquetas grande (*Dicrurus paradiseus*), alcaudón pardo (*Lanius cristatus*), vencejo arborícola coronado (*Hemiprocne coronata*), oropéndola encapuchada (*Oriolus xanthornus*) y buitre indio (*Gyps indicus*), además de dos mamíferos hasta entonces inéditos: muntíaco de la India (*Muntiacus muntjak*) y antílope indio (*Antelope cervicapra*), más varios chacales dorados (*Canis aureus*) muy bien vistos.



Alcaudón Pardo (*Lanius cristatus*)



Chacal Dorado (*Canis aureus*)

Merecido descanso en el fabuloso Resort del Tuli Tiger, cuyos jardines al anochecer ya prometían unas venideras jornadas muy fructíferas que deseosamente nos llevarán a aumentar las 203 especies anotadas hasta este día.

Día 13: Dos safaris en el interior del Parque Nacional de Kanha- jardines del Tuli Tiger Resort & río Banjer

Buena parte de esta larga jornada que comenzó antes del amanecer fue dedicada a visitar el interior del Parque, haciendo uso de otros dos de los safaris previamente contratados. El resto del día lo ocupamos pajareando por nuestra cuenta en los jardines del Resort hasta la hora de comer y por la tarde visitamos sus alrededores acompañados de un guía local.

El primero de los safaris comenzó puntual a las 6 de la mañana en la zona de control de entrada y documentación, donde se agolpaban los diferentes vehículos oficiales y los respectivos guardas forestales asignados a cada unidad, condición obligatoria para poder acceder al interior del Parque.



Barbudo Cabecipardo (*Psilopogon zeylanicus*)



Alción de Esmirna (*Alción smyrnensis*)

Como si de la salida de una prueba deportiva se tratara, los pequeños Suzukis "Gipsy" descubiertos y dotados de algunas barras de agarre (la versión india del popular Samurai), comenzaron a salir en tandas organizadas a los diferentes sectores asignados.

El Parque fue creado en la década de los cincuenta del pasado siglo y su núcleo central ocupa una superficie aproximada de 1000 kms. cuadrados. Destaca su exuberante vegetación con extensos bosques mixtos de sal (*Shorea robusta*) y bambú, a menudo salpicados por praderas de hierba "maidans" que son el hábitat idóneo para varias especies de ciervos y por supuesto para el tigre de Bengala.



Bulbul Cafre (*Pycnonotus cafer*)



Ciervo moteado o Chital (*Axis axis*) hembra

No faltan algunos pequeños lagos muy interesantes para la avifauna y numerosos pájaros forestales que habitan en el denso follaje de la selva, entre las plantas trepadoras, el estrato arbustivo y el sotobosque herbáceo. El Parque permanece cerrado desde el 1 de julio al 15 de octubre.



Buitre Dorsiblanco Bengalí (*Gyps bengalensis*)



Cuco Chikra (*Hierococcyx varius*)

Con toda nuestra atención puesta en tratar de localizar al tigre y dado que está absolutamente prohibido el abandonar los vehículos, pocas fueron las especies de interés registradas a lo largo de las seis horas invertidas en la realización de los dos safaris, excepción hecha de carbonero común (*Parus major*), buitre dorsiblanco bengalí (*Gyps bengalensis*), oropéndola encapuchada (*Oriolus xanthornus*), cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) y cuco Chikra (*Hierococcyx varius*).

Al mediodía regresamos al Tuli Tiger Resort y decidimos pajarear por nuestra cuenta hasta la hora de comer. Los jardines del Resort resultaron ser muy productivos con los primeros registros de iora común (*Aegithina tiphia*), minivet chico (*Pericrotus cinnamomeus*) -previamente visto de forma fugaz en los safaris matutinos-, trepador indio (*Sitta castanea*), drongo ventriblanco (*Dicrurus caerulescens*), orugueros de Macé (*Coracina macei*), alinegro (*Lalage melaschistos*) y dos magníficos e inesperados orugueros cabecinegros (*Coracina melanoptera*), además de verdín de Jerdon (*Chloropsis jerdoni*), pico Mahratta (*Dendrocopos mahrattensis*) y un alción picocigüeña (*Pelargopsis capensis*) en la balsa situada justo en frente del comedor del hotel.



Orugrero de Macé (*Coracina macei*)



Capuchinos Punteados (*Lonchura punctulata*)

Por la tarde y acompañados de un buen guía local recomendado por Asian Adventures (Pramod Bopche bopchepramod77@yahoo.com) e incluyendo la visita al cauce seco del río Banjer y bosques-cultivos adyacentes, la lista aumentó con verdín frentidorado (*Chloropsis aurifrons*), por fin zorzal citrino (*Zoothera citrina*), tórtola oriental (*Streptopelia orientalis*) y un magnífico mochuelo de Jungla (*Glaucidium radiatum*) que asomó en una rama, mientras varios ibis verrugosos (*Pseudibis papillosa*) ocupaban su dormitorio.



Mochuelo de Jungla (*Glaucidium radiatum*)



Zorzal Citrino (*Zoothera citrina*)

Colofón a una larga jornada con cena y hoguera incluida, que nos había permitido elevar la cifra total de especies registradas a 222 y que inició el turno de apuestas para ver si en los dos días restantes, íbamos a ser capaces de alcanzar las 250.

Día 14: Safaris en el interior del Parque Nacional de Kanha- jardines del Tuli Tiger Resort & río Banjer



Alcaudón Dorsicastaño (*Lanius vittatus*)



Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Dispuestos a reeditar una nueva jornada en la zona de Kanha y con el ánimo fundamental de tachar al esquivo tigre de Bengala de nuestra agenda de mamíferos observados, esta vez el guarda forestal asignado para acompañarnos tomó una ruta diferente y de mayor duración hacia el corazón del Parque.

No sabemos muy bien porqué, pero nuestras primeras impresiones señalaban que esta vez el éxito estaba garantizado. Quizás por la determinación del guía o bien por las ganas que teníamos (que incluían el axioma "no más pájaros y sí tigre"), obviarnos paradas intermedias para ver algunas especies y decidimos dejarnos llevar por nuestro "gurú" hasta que el fantasma de la selva hiciera su aparición.



La experiencia de observar al felino de mayor tamaño del planeta -el peso de los machos puede alcanzar los 250 Kgs.- en su medio natural, es ciertamente algo inolvidable para cualquier naturalista que se precie y en este caso la vivencia superó con creces las expectativas depositadas.

Tras localizar huellas recientes del animal en una de las pistas forestales que atraviesan la jungla y oír varios gritos de alarma de los diferentes cérvidos presentes, un extraordinario macho de tigre hizo acto de aparición a escasos metros del "Gipsy" y nos ofreció varios minutos de gloria mientras caminaba tranquilamente por el firme del camino, hasta que finalmente desapareció en la selva.



Macho de tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*) en el P. N. de Kanha; 14 de diciembre de 2017

Como buen conocedor de la zona nuestro "gurú" decidió emprender la marcha varios cientos de metros adelante hasta situarse en un claro, donde según su criterio el enorme felino tenía una senda de paso. La desbandada general de los abundantes pavos reales presentes, marcó la llegada del macho que de nuevo pudo ser observado a placer y elevó nuestra adrenalina hasta límites insospechados. Por fin el tigre !!!



Fotografiando al tigre en el Parque de Kanha, tras abandonar la espesura de la selva

Contentos y algo más tranquilos, continuamos ruta por la selva y aún tuvimos la oportunidad de avistar fugazmente un segundo ejemplar -en este caso una hembra- cuyo rayado dibujo se vislumbraba a escasos metros de la pista, entre el denso follaje de los bambúes y antes de adentrarse en la espesura del bosque.




Sambar (*Rusa unicolor*) macho



Prinia Fentrirufa (*Prinia buchanani*)

A modo de liberación divina, a partir de ese momento retomamos nuestra agenda ornitológica y prestamos mayor atención a todo lo que volaba o se movía entre la exuberante vegetación de Kanha y sus alrededores, incluido un segundo safari que disfrutamos por la tarde y varios paseos por nuestra cuenta en las inmediaciones del Resort y el cercano lecho del río Banjer.



Pico Crestipardo (*Dendrocopus nanus*)



Papamoscas de Tickell (*Cyornis tickelliae*)

Las nuevas especies avistadas en esta jornada fueron faisancillo rojo (*Galloperdix spadicea*), gallo Bankiva (*Gallus gallus*), un juvenil de cigüeña negra (*Ciconia nigra*), un magnífico adulto perchando de pigarguillo común (*Ichthyophaga ichthyaetus*), tres picos crestipardos (*Dendrocopus nanus*), avión común (*Delichon urbicum*), carbonero carigualdo indio (*Parus aplonotus*), los bonitos papamoscas de Tickell (*Cyornis tickelliae*), un incomparable minivet escarlata (*Periclorocorus speciosus*) y un inesperado macho de shama culiblanco (*Copsychus malabaricus*), a las que además se unió una hembra de tarabilla gris (*Saxicola ferreus*) -reproductora en las montañas del Himalaya- identificada posteriormente con ayuda del material fotográfico obtenido.



Tarabilla Gris (*Saxicola ferreus*) hembra




Pigarguillo Común (*Ichthyophaga ichthyaetus*)

La última velada nocturna en nuestro lujurioso Resort, esta vez más Tuli "Tiger" que nunca, permitió disfrutar de una excelente cena en que lo menos importante era el omnipresente aderezo picante y sí las succulentas cervezas nacionales de la marca "Kingfisher" que iban cayendo una detrás de otra, mientras recontábamos el checklist y anotábamos un cómputo acumulado de 236 especies registradas.

Día 15: Kanha-Mocha village-planicies semiáridas de Hathitara-Jabalpur-traslado en avión a Delhi

Nuestro último día de "birdwatching" en una jornada que nos iba a llevar a la capital india, tras recorrer en coche el trayecto que separa Kanha de Jabalpur y tomar un vuelo interior con destino a Delhi.



Verdín frentidorado (*Chloropsis aurifrons*)



Monarca Nuquinegro (*Hypothymis azurea*)

Antes de emprender la marcha algunos de nosotros aún tuvimos tiempo de pajarear por nuestra cuenta en los alrededores del Resort, mientras el resto descansaba o disfrutaba de otro safari extra para visitar el Parque.



Carpintero Rufo
(*Micropternus brachyurus*)



Drongo Real
(*Dicrurus macrocercus*)




Pito Bengalí
(*Dinopium benghalense*)

Los primeros pudimos anotar en nuestro paseo mañanero hasta cinco nuevas especies para la lista: abejero oriental (*Pernis ptilorhynchus*), papamoscas cabecigrís (*Culicicapa ceylonensis*), un carpintero rufo (*Micropternus brachyurus*), varios estorninos malabares (*Sturnia malabárica*) y algunos bonitos trepadores piquirrojos (*Sitta frontalis*), las tres últimas totalmente fuera de programación, además de un macho del endémico faisancillo moteado (*Galloperdix lunulata*) que previamente ya habíamos registrado durante nuestra estancia en el Parque de Ranthambore.



Antílopes Indios (*Antilope cervicapra*)



Ibis Verrugoso (*Pseudibis papillosa*)

Quienes optaron por la postrera visita al Parque de Kanha, pudieron observar a placer varios machos y hembras (hasta 13 ejemplares) del padre de todos los gallos: el Bankiva (*Gallus gallus*), que días antes se había mostrado de forma bastante esquiva.

Cargadas las mochilas (y también las pilas), hacia mediodía iniciamos nuestro periplo por carretera al aeropuerto de Jabalpur. En el trayecto diversas paradas y de forma más reseñable la realizada entre las localidades de Niwas y Gwara, en una zona de cultivos de secano y planicies semidesérticas conocida con el nombre de Hathitara, donde se sitúa un pequeño pantano de riego en el que pudimos ver una familia de jacanas bronceadas (*Metopidius indicus*).



Jacana Bronceada (*Metopidius indicus*)



Alondra India (*Mirafra erythroptera*)

Allí registramos como inéditas para la lista codorniz común (*Coturnix coturnix*) y aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), y en una parada previa realizada a las afueras de la localidad de Niwas, también pudimos anotar un hasta entonces mal detectado y precioso papamoscas verdín (*Eumyias thalassinus*), además de un pequeño grupito de alondras indias (*Mirafra erythroptera*) género que no se prodigó demasiado en este viaje.

Tras comer algo en la ciudad de Jabalpur y desplazarnos al aeropuerto local donde Joséle insistentemente reclamaba su ficticia nacionalidad norcoreana como respuesta a las indagaciones de las autoridades aeroportuarias (lo que afortunadamente no nos creó ningún problema), tomamos el vuelo a Delhi para pasar allí nuestra última noche, realizar a la mañana siguiente las inevitables compras de "souvenirs" y volar con destino a España para llegar a Madrid en la noche del sábado 16 de diciembre, con una lista final en nuestro bolsillo de 244 especies anotadas en poco más de una semana de intenso "pajareo".



A modo de conclusión:

La lista de aves que pueden ser vistas en esta época del año en la India central ronda las 350 especies, con mayoría de residentes y algunas invernantes.

Los meses de clima más fresco y sin lluvias (periodo entre monzones) son los que coinciden con nuestro otoño-invierno occidental y son los más idóneos para pajarear en buen parte de este extenso y poblado país del sur de Asia.

Debido a su gran superficie resulta complicado moverse entre las diferentes zonas por lo precario de su red vial, medios públicos de transporte y resto de infraestructuras, por lo que plantearse una visita de apenas diez días de duración no parece la opción más acertada para poder visitar buena parte de los mejores destinos ornitológicos.

Aún así, la puesta en marcha en 2017 de un vuelo directo Madrid-Delhi -tres días por semana- que opera la compañía Air India (con ofertas ida y vuelta desde 475€), permite evitar las siempre “engorrosas” escalas aeroportuarias que dilatan sobremanera la duración del viaje y es por eso, decidimos lanzarnos a la aventura.

Un aspecto de vital importancia de cara a optimizar la estancia y el “birdwatching” es contratar con antelación toda la logística del tour, incluidos alojamientos, vehículos y guías/conductores, además de las reservas de trenes y/o vuelos domésticos que en nuestro caso resultaron obligatorias para poder visitar el distante Parque Nacional de Kanha.



Autillo Oriental



Culebrera Chiila



Cormorán Indio

Hicimos uso de la compañía india “Asian Adventures” <http://www.asianadventures.net/> con resultados muy satisfactorios, tanto por el nivel de conocimientos mostrado por los diferentes guías, la idoneidad de los alojamientos y vehículos, el presupuesto final y la logística en general.

Con todo y pese a estar satisfechos de la lista final obtenida, pensamos que la mejor opción para un viaje introductorio a la avifauna india debería extenderse al menos otros cinco o siete días más, e incluir necesariamente varias jornadas de estancia en las faldas y estribaciones montañosas de la cordillera del Himalaya.

El Parque Nacional de Jim Corbett, Pangot-Nainital y Sat Tal, zonas todas ellas situadas en el norte del país y no lejos de Delhi, elevan la cifra de posibles especies a registrar por encima de las quinientas y suponen una gran oportunidad para poder observar algunas de las especialidades de los Himalayas que descienden altitudinalmente en esta época del año.

CHECKLIST CENTRAL INDIA WINTER TOUR : 6 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ANSERIFORMES: Anatidae											
1	Lesser Whistling-Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	Suirirí de Java		1		300	X		X	X	X
2	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	Ánsar Común		4		X	X				
3	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	Ánsar Indio		X	10	X	200				
4	Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Pato Crestudo		4		X	X				
5	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Tarro Canelo			15	X	X	X			
6	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	Ánade Friso		X		X	X				
7	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>	Silbón Europeo		X							
8	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade Real		X							
9	Indian Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Ánade Picopinto Indio		X		X	X				
10	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>	Cuchara Común		X	X	X	X	X			
11	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Ánade Rabudo		X		X	X		X		
12	Green-winged Teal	<i>Anas crecca</i>	Cerceta Común		X	X		X	X	X		
13	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	Pato Colorado		X							
14	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	Porrón Europeo		X		X					
15	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	Porrón Pardo		X							
16	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	Porrón Moñudo		X							
	GALLIFORMES: Phasianidae											
17	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	Pavo Real Común	20	X	X	X	X		X	X	X
18	Red Spurfowl (*)	<i>Gallus spadicea</i>	Faisancillo Rojo								1	
19	Painted Spurfowl (*)	<i>Gallus lunulata</i>	Faisancillo Moteado			3						1
20	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz Común									8
21	Jungle Bush-Quail	<i>Perdix asiatica</i>	Perdicilla Golirroja			1						
22	Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Francolín Gris	1	H	10	X	X				
23	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	Gallo Bankiva								X	13
	PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae											
24	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullín Común		X	X	X	X	X	X		
	CICONIIFORMES: Ciconiidae											
25	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	Picotenaza Asiático			4						
26	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	Cigüeña Negra								1	
27	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	Cigüeña Lanuda Asiática					2	2			
28	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Jabirú Asiático		5		1					
29	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabú Menor							2		
30	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	Tántalo Indio		60	6		X	4			

			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SULIFORMES: Phalacrocoracidae											
31	Little Cormorant	<i>Microcarbo niger</i>	Cormorán de Java		X	X	X	X	X	X	X	X
32	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Cormorán Indio			X		X	X			X
33	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorán Grande			X	X	X	X			
	SULIFORMES: Anhingidae											
34	Oriental Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	Anhinga Asiática		4	X	X	X				
	PELECANIFORMES: Ardeidae											
35	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Garza Real		X	X	X	X	X	X		X
36	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	Garza Imperial		X	X	X	X				
37	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	Garceta Grande			X	X	X	X	X	X	X
38	Intermediate Egret	<i>Mesophoyx intermedia</i>	Garceta Intermedia		X		X	X			X	X
39	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Garceta Común		X	X	X	X	X	X	X	X
40	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcilla Bueyera	2	X		X	X	X	X	X	X
41	Indian Pond-Heron	<i>Ardeola grayii</i>	Garcilla India		X	X	X	X	X	X	X	X
42	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	Garcita Verdosa							1		
43	Black-crowned Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete Común					X				
	PELECANIFORMES: Threskiornithidae											
44	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Morito Común		X			X				
45	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Ibis Oriental	20	X	X	X	X	X			
46	Red-naped Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	Ibis Verrugoso	2							15	X
47	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	Espátula Común		X	X		X	X			
	ACCIPITRIFORMES: Accipitridae											
48	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanio Común		3	5	15	X	X	X	X	X
49	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	Alimoche Común				1	X	5	1		
50	Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Abejero Oriental									1
51	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	Buitre Dorsiblanco Bengali								1	
52	Indian Vulture	<i>Gyps indicus</i>	Buitre Indio							3	5	X
53	Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	Culebrera Chiila			1					1	1
54	Crested Hawk-Eagle	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	Águila Azor Variable Indiana			2					1	1
55	Indian Spotted Eagle	<i>Clanga hastata</i>	Águila India					1				
56	Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i>	Águila Moteada	1			5	X				
57	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águila Calzada					1				
58	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	Águila Esteparia			1		1				
59	Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	Águila Imperial Oriental					1				

				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Bonelli's Eagle	<i>Aquila fasciata</i>	Águila Perdicera		2								
61	White-eyed Buzzard	<i>Butastur teesa</i>	Busardo Tisa							1			
62	Eurasian Marsh-Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho Lagunero Occidental				2	X					
63	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho Cenizo										1
64	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	Gavilán Chikra	1		2	1	X	1	1	1	1	X
65	Black-eared Kite	<i>Milvus lineatus</i>	Milano Negro Orejinegro						10				
66	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	Milano Negro	50	X	X	X		X	X			X
67	Gray-headed Fish-Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Pigarguillo Común									1	
	GRUIFORMES: Rallidae												
68	White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Gallineta Pechiblanca		X	X	X	X					
69	Gray-headed Swampphen	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	Calamón		X		X	X	X	X			
70	Eurasian Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallineta Común		X	X	X	X					X
71	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	Focha Común		X	X	X	X	X				
	GRUIFORMES: Gruidae												
72	Demoiselle Crane	<i>Anthropoides virgo</i>	Grulla Damisela							2			
73	Sarus Crane	<i>Antigone antigone</i>	Grulla Sarus				2	4					
	CHARADRIIFORMES: Burhinidae												
74	Indian Thick-knee	<i>Burhinus indicus</i>	Alcaraván Indio			5							
75	Great Thick-knee	<i>Esacus recurvirostris</i>	Alcaraván Piquigrueso Indio		X								
	CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae												
76	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Cigüeñuela Común		X	X	X	X	100				
77	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avoceta Común						2				
	CHARADRIIFORMES: Charadriidae												
78	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	Avefría Fluvial						15				
79	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	Avefría Malabar				6			1	X	X	X
80	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	Avefría India			20	X	X	X	X	X	X	X
81	White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	Avefría Coliblanca		6		X	X					
82	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Chorlitejo Patinegro					1					
83	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Chorlitejo Chico			1		1					
	CHARADRIIFORMES: Rostratulidae												
84	Greater Painted-Snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>	Aguatero Bengalí					1					
	CHARADRIIFORMES: Jacanidae												

				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	Jacana Bronceada				1	X					5
	CHARADRIIFORMES: Scolopacidae												
86	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	Zarapito Real						2				
87	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	Aguja Colinegra			X							
88	Ruff	<i>Calidris pugnax</i>	Combatiente					X	X				
89	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	Correlimos de Temminck					20	10				
90	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	Correlimos Común			25							
91	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Correlimos Menudo						50				
92	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Agachadiza Común			2	X	X					
93	Pin-tailed Snipe	<i>Gallinago stenura</i>	Agachadiza Colirrara			2	X						
94	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarrios Chico		1		X	X	X				
95	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Andarrios Grande			X	X		X		X	X	X
96	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	Archibebe Oscuro			X		X					
97	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Archibebe Claro		2	X		X	X				
98	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Archibebe Fino			X	X	X	X				
99	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Andarrios Bastardo			X	X	X	X				
100	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Archibebe Común			X	X	X	X				
	CHARADRIIFORMES: Glareolidae												
101	Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	Corredor Indio				3						
	CHARADRIIFORMES: Laridae												
102	Brown-headed Gull	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	Gaviota Centroasiática						3				
103	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Pagaza Piconegra			1							
104	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>	Fumarel Cariblanco			X							
105	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	Charrán Indio			6			2				
	PTEROCLIFORMES: Pteroclididae												
106	Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>	Ganga India			20							
	COLUMBIFORMES: Columbidae												
107	Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	Paloma Bravía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Oriental Turtle-Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tórtola Oriental								3	X	
109	Eurasian Collared-Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola Turca	X		X	X	X	X	X			
110	Red Collared-Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Tórtola Cabecigrís				X						
111	Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>	Tórtola Moteada Oriental			X				X	X	X	X
112	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tórtola Senegalesa	X	X		X	X	X	X			

Mangostas: Herpestidae															
Ruddy Mongoose	<i>Herpestes smithii</i>	Mangosta roja			1										
Indian Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>	Mangosta hindú gris	1						4						
Lobos, Coyotes, Zorros, Chacales: Canidae															
Golden Jackal	<i>Canis aureus</i>	Chacal dorado		1	H					2	X	X	X		
Bengal Fox	<i>Vulpes bengalensis</i>	Zorro de Bengala			2										
Jabalíes: Suidae															
Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>	Jabalí			X					X		X	X		
Ciervos: Cervidae															
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Spotted Deer	<i>Axis axis</i>	Chital o Ciervo moteado			X	X	X		X	X	X	X			
Sambar	<i>Rusa unicolor</i>	Sambar			X	X	X		X	X	X	X			
Common Barking Deer	<i>Muntiacus muntjak</i>	Muntíaco de la India							1		X				
Swamp Deer	<i>Cervus duvaucellii</i>	Barasinga			X	X	X		X	X	X	X			
Vacas, Antílopes, Carneros, Cabras: Bovidae															
Nilgai	<i>Boselaphus tragocamelus</i>	Nilgó o Toro azul		X	X	X	X		X						
Blackbuck	<i>Antelope cervicapra</i>	Antílope indio							X						
Murciélagos frugívoros del Viejo Mundo: Pteropodidae															
Indian Flying Fox	<i>Pteropus giganteus</i>	Zorro volador de la India				X	X								
REPTILES INDIA CENTRAL:															
Tortugas o Quelonios: Geoemydidae															
Indian Roofed Terrapin	<i>Pangshura tecta</i>						X								
Tortugas de caparazón blando: Trionychidae															
Indian Softshell Turtle	<i>Nilssonina gangetica</i>					X	X				X				
Culebras: Colubridae															
Checkered Keelbac	<i>Xenochrophis piscator</i>	Culebra de agua asiática						1							
Cocodrilos, Gaviales: Crocodylidae															
Mugger Crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>	Cocodrilo de las marismas			X										



Nilgó o Toro Azul (*Boselaphus tragocamelus*) en el Parque Nacional de Ranthambore