

Colombia

Agosto 2021



Introducción

Tras haber suspendido el tour previo de 2020 por razones de la covid, esta vez por fin pudimos llevarlo a cabo, entre el 6 y el 21 de agosto, manteniendo un grupo de diez participantes más los guías que, en esta ocasión, fueron Felipe Anaya (Colombia), Julio Delgado (Colombia) y Ferran López (España). Además, contamos con varios guías locales que sin lugar a dudas aportaron un plus de calidad en todos los espacios naturales visitados. Nuestro objetivo prioritario durante los quince días fue combinar los diferentes ambientes naturales posibles pajareando desde los bosques de niebla de la sierra occidental en el Valle del Cauca hasta altitudes de 4100 msnm donde se encuentra el páramo y bosque alto andino de la cordillera central del Parque Nacional Natural de Los Nevados. La diversidad ornitológica que albergan todos estos ambientes le deja a uno sin palabras, pero sin olvidar todos sus paisajes, mamíferos, anfibios, vegetación y cómo no, sus gentes que consiguieron que todo se convierta en una experiencia inolvidable. A lo largo del tour pudimos disfrutar de 455 especies de aves, 57 de las cuales fueron endémicas o casi endémicas, sumando hasta 48 especies de colibríes, 47 tanagers y mountain-tanagers, 13 antpittas, 12 palomas, 11 rapaces y hasta 11 woodpeckers, visitando además diferentes *leks* de algunas de las aves emblemáticas como el Cock-of-the-rock, al mismo tiempo que nos desplazábamos con nuestro vehículo minibús de quince plazas con aire acondicionado a través de las diferentes localidades. Y como otra de nuestras prioridades es el confort del cliente, los alojamientos y las comidas fueron pensados al detalle ofreciendo el máximo de comodidades y facilidades. Las tres especies más valoradas por todos los participantes fueron: Hooded Antpitta, Cock-of-the-rock y Toucan Barbet.



Día 1 – Finca Bosque de Niebla

Nuestro vehículo minibús ya nos estaba esperando a la llegada al aeropuerto de Cali. Junto a él su experimentado conductor Hermes y cómo no, nuestros dos guías colombianos Julio Delgado y Felipe Anaya de Piculet Birding. Una vez organizadas nuestras maletas nos dirigimos hacia nuestro primer punto: la Finca Bosque de Niebla, situado en el km 18 de la carretera entre Cali y Buenaventura. Nada más llegar nos sorprendieron sus diferentes bebederos para colibríes observando a corta distancia **White-necked Jacobin**, **Green Hermit**, **Tawny-bellied Hermit**, **Brown Violetear**, **Black-throated Mango**, **Speckled Hummingbird**, **Steely-vented Hummingbird** (**endémico junto a Venezuela**), **Rufous-tailed Hummingbird**, **Long-tailed Sylph**, **Bronzy Inca**, **Booted Racket-tail**, **Purple-throated Woodstar**, **Crowned Woodnymph** (**endémico junto a Panamá y Ecuador**) y **Andean Emerald** (**endémico**), y en sus comederos otras aves como **Red-headed Barbet**, **Crimson-**

rumped Toucanet, **Acorn Woodpecker**, **Black-billed Thrush**, **Orange-crowned Euphonia**, **Thick-billed Euphonia**, **Chestnut-capped Brushfinch**, **White-naped Brushfinch**, **Flame-rumped Tanager**, **Blue-winged Mountain Tanager**, **Multicoloured Tanager** (**endémico**), **Blue-grey Tanager**, **Palm Tanager**, **Golden-naped Tanager**, **Saffron-crowned Tanager**, **Golden Tanager** y **Green Honeycreeper** entre otras. Además, visitamos sus dos *hides*, zonas del jardín y alrededores donde también observamos **Black-billed Peppershrike**, **Spotted Barbtail**, **Nariño Tapaculo** o **Colombian Chachalaca** (**endémico**). Después de un primer día repleto de nuevos pájaros tocaba desplazarnos hacia el pueblo de El Queremal donde pasaríamos nuestras dos primeras noches, pero antes nos detuvimos en un punto donde una pareja de **Bat Falcon** posaba sobre un alto árbol. Tras una ducha y cena reparadoras, terminamos la jornada repasando la lista de aves y nos fuimos a descansar.



Primer pajareo desde la Finca Bosque de Niebla ©Ferran López

Día 2 – Anchicayá Alto y El Descanso Doña Dora

Tocaba levantarse muy temprano, bebernos el café y desplazarnos hacia el Descanso de Doña Dora antes que se hiciera de día. Nuestro objetivo era llegar al *lek* de los **Cock-of-the-rock** justo al amanecer. Vivimos una verdadera experiencia observando a muy corta distancia hasta tres machos compitiendo entre ellos, reclamando y realizando ciertos movimientos con el propósito de conseguir una pareja. Ya en Doña Dora y tras un merecido desayuno contemplábamos, al mismo tiempo, los primeros ejemplares de **Toucan Barbet** (hasta cinco ejemplares), y dos nuevas especies de colibríes, **Empress Brilliant** (**endémico junto con Ecuador**) y **Western Emerald** (subespecie de Blue-tailed Emerald), pero también caminamos diferentes tramos a lo largo de la carretera observando aves como **Squirrel Cuckoo**, **Greyish Piculet** (**endémico**), **Golden-olive Woodpecker**, **Parker's Antbird**, **Wedge-billed Woodcreeper**, **Red-faced Spinetail**, **Masked Tityra**, **Streak-necked Flycatcher**, **Slaty-capped Flycatcher**, **Scale-crested Pygmy-Tyrant**, **Common Tody-Flycatcher**, **Ornate Flycatcher**, **Golden-crowned Flycatcher**, **Golden-faced Tyrannulet**, **Rusty-margined Flycatcher**, **Tropical Kingbird**, **Slaty-capped Shrike-Vireo**, **House Wren**, **Sooty-headed Wren**, **Bay Wren**,

Tricoloured Brushfinch (también llamado **Choco Brushfinch**), **Tropical Parula**, **Buff-rumped Warbler**, **White-lined Tanager**, **Black-chinned Mountain Tanager** (**endémico junto a Ecuador**), **Rufous-throated Tanager** (**endémico junto a Ecuador**), **Grey-and-gold Tanager** (**endémico junto a Ecuador y Panamá**), **Golden-hooded Tanager**, **Bay-headed Tanager**, **Scrub Tanager**, **Silver-throated Tanager**, **Ochre-breasted Tanager**, **Glistening-green Tanager**, **Blue Dacnis**, **Slate-coloured Grosbeak**, **Saffron Finch**, **Yellow-faced Grassquit**, **Barred Hawk**, **Cinnamon Flycatcher**, **Ashy-throated Chlorospingus**, **White-collared Swift**, **Laughing Falcon**, **Mealy Parrot**, **Russet Antshrike**, **Plain Xenops**, **White-winged Becard** y **Scarlet-rumped Cacique** o también llamado **Subtropical Cacique**, terminando el tramo final de carretera con un grupo familiar del **endémico Crested Ant-tanager**. A última hora de la tarde ya de nuevo en el pueblo de El Queremal aún tuvimos tiempo de observar **Southern Lapwing**, **Vermilion Flycatcher**, **Cattle Tyrant**, **Blue-and-white Swallow** y **Shiny Cowbird**. Cena, repaso de la lista del día y a las habitaciones a por un merecido descanso.



Fotografiando en el lek del Cock-of-the-Rock © Ferran López



Toucan Barbet desde el Descanso de Doña Dora © Ferran López

Día 3 – Anchicayá Medio (Old Buenaventura road)

Nos levantamos temprano para iniciar el trayecto por el gradiente altitudinal de la antigua carretera hacia Buenaventura descendiendo por la vertiente pacífica de la sierra occidental de los Andes que, en buena parte, transcurre por la cuenca del Río Anchicayá junto al Parque Nacional Los Farallones. Esta diferencia altitudinal que empieza en el bosque nuboso a unos 1600 msnm y termina en el bosque tropical húmedo del Chocó biogeográfico a unos 200 msnm forma una de las zonas con mayor diversidad ornitológica colombiana. Nada más salir de nuestro minibús descubrimos el por qué, escuchando casi al mismo tiempo **Berlepsch's Tinamou** (endémico junto a Ecuador), **Choco Tinamou** (endémico junto a Panamá), **Barred Puffbird**, **Ocellated Antbird** y **Thicket Antpitta**! También vimos nuestro primer **Rufous-tailed Jacamar**, **Cinnamon Woodpecker**, **Brown-billed Scythebill**, **Cinnamon Becard**, **Tawny-breasted Flycatcher**, **Pacific Flatbill**, **Yellow-olive Flycatcher**, **Yellow-margined Flycatcher**, **Lemon-browed Flycatcher**, **Bananaquit**, **Rufous-winged Tanager**, **Emerald Tanager**, **Scarlet-browed Tanager**, **Scarlet-and-white Tanager** (endémico junto a Ecuador), **Blue-chested Hummingbird**, **Rufous Motmot**, **Broad-billed Motmot**, **Spot-crowned**

Barbet, **Blue-headed Parrot**, **Dot-winged Antwren**, **Black-capped Pygmy-Tyrant**, **Bright-rumped Attila**, **Scaly-breasted Wren**, **Chestnut-headed Oropendola**, **Dusky-faced Tanager**, **Tawny-crested Tanager** y **Golden-chested Tanager** (endémico junto a Ecuador). Ya durante el ascenso, hicimos varias paradas en diferentes puntos cercanos al río donde vimos nuestros primeros **Neotropic Cormorant**, **Fasciated Tiger-Heron**, **Black Phoebe** y **Whiskered Wren** (escuchado) y algo más arriba escuchamos **Little Tinamou** y vimos **Ruddy Pigeon**, **Smooth-billed Ani**, **Purple-crowned Fairy**, **American Black Vulture**, **Turkey Vulture**, **Collared Araçari**, **Choco Toucan**, **Golden-collared Manakin**, **White-thighed Swallow**, **Southern Rough-winged Swallow**, **White-headed Wren**, **Long-tailed Tyrant**, **Variable Seedeater** o también llamado **Black-breasted Seedeater** y **Buff-throated Saltator**. Además, pudimos fotografiar una venenosa ranita endémica de Panamá y Colombia incluida en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN, la **Yellow-bellied Poison Frog**. Ya de noche nos alojamos en nuestro hotel en la ciudad costera de Buenaventura donde algo más relajados tuvimos una buena cena, repasamos nuestras listas del día y nos fuimos a dormir.



Yellow-bellied Poison Frog © Ferran López



Durante nuestro almuerzo en el campo en el Medio Anchicayá © Ferran López

Día 4 – San Cipriano

Salimos muy temprano de nuestro hotel para llegar antes del amanecer a la Reserva Forestal de San Cipriano, un paraíso para muchas de las aves “hormigueras”. Sin embargo, el único modo de llegar a este lugar es mediante las llamadas “brujitas”, una especie de vagonetes conducidas con una moto que se impulsan sobre los mismos railes de la vía de un antiguo tren. Un modo práctico y a su vez divertido que te permite llegar a las mismas puertas del pueblo de San Cipriano donde iniciamos el recorrido por los diferentes senderos acompañados de nuestro guía local Never. Nada más empezar observamos **Lanceolet Monklet**, **Orange-billed Sparrow**, **Yellow-throated Toucan** y **Spotted Antbird**. A continuación y a medida que íbamos avanzando pudimos ver dos **Semiplumbeous Hawk** posados, **Baudo Guan** (endémico junto a Ecuador), **Dusky Pigeon**, **Pallid Dove** (escuchado), **Common Pauraque**, **Short-tailed Swift**, **White-whiskered Hermit**, **Green Ibis**, **White-tailed Trogon**, **Ringed Kingfisher**, **Black-breasted Puffbird**, **White-whiskered Puffbird**, **Moustached Puffbird**, **Black-cheeked Woodpecker**, **Lita Woodpecker** (endémico junto a Ecuador), **Saffron-**

headed Parrot, **Black-crowned Antshrike**, **Checker-throated Stipplethroat**, **Pacific Antwren** (escuchado), **White-flanked Antwren**, **Chestnut-backed Antbird**, **Esmeraldas Antbird** (escuchado), **Zeledon’s Antbird**, **Bicoloured Antbird**, **Black-headed Antthrush** (escuchado), **Black-striped Woodcreeper**, **Blue-crowned Manakin**, **Purple-throated Fruitcrow**, **Black-tipped Cotinga** (endémico junto a Panamá y Ecuador), **Black-crowned Tityra**, **Ruddy-tailed Flycatcher**, **Black-headed Tody-Flycatcher**, **Black-chested Jay**, **Grey-breasted Martin**, **Tawny-faced Gnatwren**, **Fulvous-vented Euphonia**, **White-shouldered Tanager** y **Blue-whiskered Tanager** (endémico junto a Ecuador). Aunque se intentó, no conseguimos ver Broad-billed Sapayoa, uno de los *targets* del lugar. Tras la comida en uno de los restaurantes de la zona tocaba regresar al minibús y emprender el trayecto hacia el norte con destino al Parque Nacional Natural Tatamá. En una de las breves paradas en una gasolinera pudimos ver también **Blue-winged Teal**, **Bare-faced Ibis** y **Fork-tailed Flycatcher**.



Preparados para el trayecto en “Brujita” © Ferran López



Por los senderos y a la salida de la Reserva Forestal de San Cipriano © Ferran López

Día 5, 6 y 7 – Montezuma (Parque Nacional Natural Tatamá)

Situado en las estribaciones y subtrópicos del Chocó este Parque Nacional con una extensión de 51.900 ha es conocido mundialmente por sus diferentes especies endémicas comprendidas a lo largo de su gradiente altitudinal, entre los 1300 msnm donde la bio región del Chocó se encuentra con todas las especies de los Andes Occidentales hasta las partes altas del bosque andino a 2900 msnm, dando como resultado una muy alta diversidad ornitológica en unos bosques de excelente estado de conservación. Nos alojamos tres noches en la Finca de Montezuma desde donde cada mañana salíamos con los vehículos 4x4 para acceder a las diferentes zonas observando las siguientes aves: **Sickle-winged Guan**, **Chestnut Wood-Quail** (escuchado)(**endémico**), **Band-tailed**

Pigeon, **Plumbeous Pigeo**, **Violet-tailed Sylph**, **Tourmaline Sunangel**, **Greenish Puffleg**, **Brown Inca**, **Collared Inca**, **Velvet-purple Coronet** (**endémico junto a Ecuador**), **Buff-tailed Coronet**, **Rufous-gaped Hillstar** (**endémico junto a Ecuador**), **Green-crowned Brilliant**, **Green Thorntail**, **Green-fronted Lancebill**, **Purple-bibbed Whitetip** (**endémico junto a Ecuador**), **Collared Trogon**, **Crested Caracara**, **Ornate Hawk-Eagle**, **Andean Motmot**, **Smoky-brown Woodpecker**, **Slaty Antwren**, **Yellow-breasted Antwren** (escuchado), **Streak-headed Antbird** (escuchado), **Plain-backed Antpitta** (escuchado), **Torrent Tyrannulet**, **Ocellated Tapaculo** (escuchado), **Tatama Tapaculo** (**endémico**), **Spillmann's Tapaculo** (escuchado), **Uniform Treehunter**, **Fulvous-dotted Treerunner**

(**endémico junto a Ecuador**), **Streaked Tuftedcheek**, **Rufous Spinetail** (escuchado), **Golden-winged Manakin** (escuchado), **Striolated Manakin**, **Club-winged Manakin** (escuchado), **Green-and-black Fruiteater**, **Orange-breasted Fruiteater**, **Scalet Fruiteater** (escuchado), **Barred Fruiteater**, **Bronze-olive Pygmy-Tyrant**, **Rufous-headed Pygmy-Tyrant**, **Olive-striped Flycatcher**, **Handsome Flycatcher**, **Yellow-bellied Elaenia**, **Smoke-coloured Pewee**, **Choco Vireo** (escuchado), **Green Jay** (escuchado), **Beautiful Jay** (escuchado), **Russet-backed Oropendola** (escuchado), **Sharpe's Wren**, **Munchique Wood-Wren** (**endémico**), **Grey-breasted Wood-Wren**, **Chestnut-breasted Wren** (escuchado), **Andean Solitaire**, **Black-winged Saltator**, **Tanager Finch** (**endémico junto a Ecuador**),

Chestnut-breasted Chlorophonia, **Yellow-collared Chlorophonia** (**endémico junto a Panamá y Ecuador**), **Dusky Chlorospingus** (**endémico**), **Olive Finch**, **Three-striped Warbler**, **Golden-bellied Warbler** o también llamado **Choco Warbler** (escuchado), **Slate-throated Redstar**, **Golden-fronted Redstart**, **Crimson-backed Tanager**, **Black-and-gold Tanager** (**endémico**), **Gold-ringed Tanager** (**endémico**), **Purplish-mantled Tanager** (**endémico junto a Ecuador**), **Grass-green Tanager**, **Beryl-spangled Tanager**, **White-sided Flowerpiercer**, **Indigo Flowerpiercer** (**endémico junto a Ecuador**), **Bluish Flowerpiercer** y **Masked Flowerpiercer**. Durante la última cena vino a visitarnos un **Zorro Cangrejero** o **Crab-eating Fox** (*Cerdocyon thous*).



Momentos de la observación del Tanager Finch en el PN de Tatamá © Ferran López

Día 8 – Montezuma (parte baja) y traslado a Pereira

Nuestra última mañana en el PN Tatamá consistió en un pajareo por el tramo de pista de la parte baja donde pudimos repasar todas aquellas especies que aún no habíamos podido disfrutar con detalle y un último vistazo a los bebederos y comederos de la finca. Con los vehículos 4x4 regresamos a la carretera principal donde subimos a nuestro minibús mientras algunos veíamos **Yellow-bellied Seedeater** y **Blue-black Grassquit** por los alrededores. Una vez en nuestro alojamiento a las

afueras de Pereira tocaba algo de relax y decidimos hacer un bañito en la piscina del hotel, aunque siempre con un ojo puesto por los jardines donde vimos **Ruddy-ground Dove, Eared Dove, Snowy Egret, Cattle Egret, Roadside Hawk, Yellow-headed Caracara, Yellow-crowned Parrot, Spectacled Parrotlet, Mouse-coloured Tyrannulet** y **Great Kiskadee**. Tras la cena y el repaso a nuestra lista del día, aún tuvimos tiempo de observar al menos dos **Tropical Screech-Owl**.

Día 9 – Reserva Bosque Cauquitá y traslado al Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya

Pasamos una mañana en uno de los más amenazados bosques colombianos, el bosque tropical seco de la Reserva Bosque Cauquitá. Pero también por sus alrededores, donde se encuentran algunos campos de pastos y pequeñas lagunas. Siendo zonas con nuevos hábitats, obtuvimos una muy buena inyección de especies nuevas como **Black-bellied Whistling-Duck, Crested Bobwhite, Least Grebe, Pied-billed Grebe, Plain-breasted Ground Dove, Striped Cuckoo, Dwarf Cuckoo, Blackish Rail, Grey-cowled Wood-Rail, Purple Gallinule, White-throated Crake** (escuchado), **Wattled Jacana, Striated Heron, Black-crowned Night-Heron, Yellow-crowned Night-Heron, Amazon Kingfisher, Red-crowned Woodpecker, Spot-breasted Woodpecker, Bar-crested Antshrike, Jet Antbird, Streak-headed Woodcreeper, Pale-breasted Spinetail, Cinereous Becard, Greenish**

Elaenia, Pied Water-Tyrant, Streaked Flycatcher, Tropical Gnatcatcher, Tricoloured Munia, Grassland Sparrow, Black-striped Sparrow, Red-breasted Meadowlark, Yellow Oriole, Ultramarine Grosbeak, Guira Tanager, Wedge-tailed Grass-Finch, Ruddy-breasted Seedeater, Thick-billed Seed-Finch, Large-billed Seed-Finch y **Grey Seedeater**. Tras la comida, nos dirigimos hacia Otún Quimbaya donde aún tuvimos tiempo para pajarear por la tarde a lo largo del río Otún con muy buenas observaciones de nuestra primera pareja de **Torrent Duck, Bronze-winged Parrot, Azara's Spinetail, Red-ruffed Fruitcrow, Southern Beardless-Tyrannulet** (escuchado), **Ashy-headed Tyrannulet, Orange-billed Nightingale-Thrush** y **Pale-eyed Thrush**. Nos alojamos en un encantador hotel del pueblo La Suiza y tras cenar y repasar la lista nos fuimos a descansar.



Nuestra primera pareja de Torrent Duck en el río Otún © Ferran López

Día 10 – Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya y Hotel Tinamú

Como de costumbre tocaba levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la mañana cuando la actividad de las aves es mucho más elevada. Volvimos a dejar nuestro minibús para subirnos a los 4x4 que nos subirían hasta la parte alta del santuario. Nada más llegar ya pudimos ver **Cauca Guan** (endémico), **Golden-headed Quetzal**, **Moustached Antpitta** (escuchado), **Hooded Antpitta** (endémico junto a Venezuela), **Tyrannine Woodcreeper** (escuchado), **Black-banded Woodcreeper**, **Olive-backed Woodcreeper**, **Streaked Xenops**, **Rufous-breasted Flycatcher**, **Marbled-faced Bristle-Tyrant** (escuchado), **Plumbeous-crowned Tyrannulet**, **Rufous-naped Greenlet**, **Brown-bellied Swallow**, **Common**

Chlorospingus, **Russet-crowned Warbler**, **White-capped Tanager**, **Fawn-breasted Tanager** y **Metallic-green Tanager**. Vimos también nuestros primeros **Monos aulladores rojos** (*Alouatta seniculus*) y una **Marmosa** (*Marmosa sp.*). Después de comer regresamos a nuestro minibús y nos dirigimos hacia el Hotel Tinamú observando a mitad de camino nuestra única **Carib Grackle** del tour. Llegamos a primera hora de la tarde. Sus jardines y comederos invitaban a pajarear por sus alrededores quedándonos sorprendidos de su belleza y diversidad ornitológica. Reclamaba un **Little Tinamou**, y nos sobrevolaban nuestros primeros **Lesser Swallow-tailed Swift**. Además también, **Lineated Woodpecker**, **Cocoa Woodcreeper**, **Brown-capped Vireo**,

Speckled-breasted Wren o también llamado **Colombian Wren** (**endémico**), **Cocoa Thrush**, **Blue-necked Tanager** y

Streaked Saltator. Después de la cena nuestro incansable guía Felipe (Pipe) encontró dos **Spectacled Owl**.



Grupo familiar de Mono aullador rojo en Otún Quimbaya © Ferran López

Día 11 – Hotel Tinamú y Río Claro

Despertábamos temprano y después de un buen desayuno iniciábamos un recorrido por uno de los senderos del hotel. Muy cerca ya nos esperaban las primeras **Grey-headed Dove**, **Chestnut-collared Swift**, **Great Antshrike**, **Blue-lored Antbird**, **Scaled Antpitta** y **Plain-brown Woodcreeper**. Disfrutamos en el lek de los **Golden-collared Manakin** y los **Green Hermit**, y seguimos con **Scaled-crested Pygmy-Tyrant**, **White-breasted Wood-Wren** (escuchado) y **Clay-coloured Thrush**. Tras el almuerzo tocaba trasladarse hacia Río Claro donde nos

esperaban algunas de sus especialidades sin desmerecer otros **Torrent Duck** que pudimos ver nada más llegar. Además, observamos **White-tipped Dove**, **Spotted Sandpiper**, **Gold-crowned Flycatcher**, **Hepatic Tanager** y la esperada **Turquoise Dacnis** (**endémica**). Con los deberes hechos, fue entonces el momento de desplazarnos hacia nuestro alojamiento de las tres próximas noches, El Recinto del Pensamiento, situado a las afueras de la ciudad de Manizales donde nos recibieron con una buena cena.

Día 12 – Reserva Natural de Río Blanco

Este espacio natural protegido propiedad de la empresa Agua de Manizales, genera el 35% del agua que consume la ciudad y es considerado una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Dejando a un lado a las aves, esta reserva de más de 4000 ha alberga unas 40 especies de orquídeas nativas, 61 especies de mamíferos y más de 180 especies de mariposas diurnas. Nuestra llegada a los comederos y bebederos de Río Blanco fue sencillamente espectacular. Las enormes concentraciones de colibríes, en su mayor parte, **Buff-tailed Coronet**, junto a las continuas visitas de varias de las especies de Mountain-tanager o los comederos de las diferentes especies de Antpitta hace que este sea un lugar totalmente indispensable para pajarear. Pasamos todo un día disfrutando de los diferentes grupos mixtos de aves por los senderos observando nuevas aves como **Lesser Violetear**, **Golden-headed Quetzal**, **Bicoloured Antpitta** (endémica junto a Ecuador), **Chestnut-crowned Antpitta**, **Brown-banded Antpitta** (endémica), **Blackish Tapaculo** (escuchado), **Montane Woodcreeper**, **Pearled Treerunner**, **Dusky**

Piha (escuchado), **Rufous-crowned Tody-Flycatcher**, **Pale-edged Flycatcher**, **Yellow-bellied Chat-Tyrant** (escuchado), **Mountain Wren**, **Yellow-bellied Siskin**, **Slaty Brushfinch**, **Black-crested Warbler**, **Black-capped Hemispingus**, **Black-eared Hemispingus**, **Blue-capped Tanager**, **Buff-breasted Mountain Tanager**, **Blue-and-black Tanager**, **Capped Conebill** (endémica junto a Venezuela), **Grey-hooded Bush Tanager**, **Masked Saltator**, entre muchas otras. Además, tuvimos la inmensa suerte de ver dos **Tayras** (*Eira barbara*) acercándose a los comederos. A última hora de la tarde decidimos prospectar las zonas más bajas donde observamos de nuevo a una pareja de **Golden-headed Quetzal** y también **White-throated Daggerbill** o también llamado **Choco Daggerbill**, **White-bellied Woodstar**, **Slaty-backed Chat-Tyrant**, **White-capped Dipper** y **Slaty-backed Nightingale-Thrush**, terminando al anochecer en uno de los *Ieks* de **Lyre-tailed Nighjar** donde pudimos ver un macho joven posado. Regresamos al hotel, cena, repaso de las listas y a descansar.



Tayra (*Eira barbara*) en los comederos de Río Blanco © Ferran López

Día 13 – Glamping El Color de Mis Rêves

Visitamos su increíble bosque de niebla situado a 2850 msnm de la Cordillera Central de los Andes y que mantiene una extensión de unas casi 4000 ha donde han sido registradas hasta 489 especies de aves. Para su acceso se hace indispensables unos vehículos 4x4 y para ello tuvimos que dejar una vez más nuestro minibús. Carlos Mario Aranzazu, quien gestiona a la perfección este espacio y sus comederos, nos recibió y junto a él pudimos ver nuevas especies como **Andean Guan**, **Tyrian Metaltail**, **Black-thighed Puffleg** (endémica junto a Ecuador), **Shining Sunbeam**, **Andean Pygmy-Owl**, **Chestnut-naped Antpitta**, **Slate-crowned Antpitta**, **Mountain Elaenia**, **Sedge Wren** o también llamado **Paramo**

Wren, considerado subespecie de **Grass Wren**, **Andean Siskin** (endémica junto a Ecuador), **Grey-browed Brushfinch**, **Superciliaried Hemispingus**, **Hooded Mountain Tanager**, **Lacrimose Mountain Tanager** y **Blue-backed Conebill**, entre muchas otras. A última hora de la tarde iniciamos la bajada con los 4x4 pero a medio camino tocó echar una mano a otro vehículo que subía pero que había quedado bloqueado por el barro. Y como no hay mal que por bien no venga, se nos hizo de noche y obtuvimos muy buenas observaciones de varias especies nocturnas como **Rufous-banded Owl**, **Common Potoo** y **White-throated Screech-Owl**.



Durante la espera a la Chestnut-naped Antpitta en El Color de Mis Rêves © Ferran López

Día 14 – Hacienda el Bosque y Parque Nacional Los Nevados

Por fin llegaba el momento de visitar este espectacular lugar situado a media subida del Parque Nacional Los Nevados. Comenzamos el día en el interior de la Finca Hacienda el Bosque con un buen desayuno y uno de nuestros primeros puntos fue uno de los comederos de *Grallaria*, concretamente con la recientemente *splitada* **Equatorial Antpitta**, que anteriormente pertenecía a una sola especie, Rufous Antpitta, pero que ésta ha sido dividida en nada más y nada menos en 16 especies. Además, observamos en otras zonas y en otros comederos otras nuevas aves como **Buff-winged Starfrontlet**, **Mountain Velvetbreast**, **Black Flowerpiercer**, **Paramo Seedeater** y por supuesto, una de las más bonitas *Grallarias*, la **Crescent-faced Antpitta**, entre muchas otras aves. Tras la comida tocaba regresar al minibús y continuar con la subida hacia las partes más altas del Parque Nacional Los Nevados hasta alcanzar más de 4100 msnm donde conseguimos ver uno de los colibríes que viven a mayor altitud, el **Buffy Helmetcrest** (*endémica*). También otras

aves como **Andean Teal**, **Andean Duck**, **Viridian Metaltail** (*endémica*), **Western Tawny Antpitta**, **Paramo Tapaculo**, **Andean Tit-Spinetail**, **Many-striped Canastero**, **Brown-backed Chat-Tyrant**, **Plumbeous Sierra Finch** y **Stout-billed Cinclodes**, entre otras. Poco antes de anoecer llegamos a nuestro alojamiento Termales del Ruiz, justo para poder ver algunos de los colibríes de sus bebederos como **Rainbow-bearded Thornbill**, **Golden-breasted Puffleg**, **Great Sapphirewing** y también **Scarlet-bellied Mountain Tanager**, **Glossy Flowerpiercer** y **Pale-naped Brushfinch** antes de darnos un baño en una de sus piscinas de aguas termales al mismo tiempo que contemplábamos su fabuloso paisaje a 3500 msnm. Esa fue nuestra última cena del grupo al completo ya que a la mañana siguiente parte de los participantes debíamos regresar hacia el aeropuerto de Pereira. El resto del grupo regresaría más tarde hacia Cali donde pasaría una última noche para luego dirigirse hacia el aeropuerto y regresar a España vía Bogotá.



Momentos de relax y diversión en la piscina termal © Felipe Anaya

Día 15 – Termales del Ruiz y regreso a Cali

Una última mañana por los alrededores de este fabuloso hotel disfrutando de las últimas especies nuevas como fueron **Purple-backed Thornbill**, **Black-chested Mountain Tanager** (endémica junto a

Venezuela), **White-throated Tyrannulet** y **Crowned Chat-Tyrant** y ya de regreso hacia Cali donde pasaríamos la última noche antes de regresar.



Los tres guías del tour, de izquierda a derecha: Felipe Anaya (Colombia/Piculet Birding), Ferran López (España/Icaro Birding Experience) y Julio Delgado (Colombia/Piculet Birding).

Lista total de aves (según el criterio taxonómico de BirdLife International)

(EN) – Especie y subespecie endémica o casi endémica

Berlepsch's Tinamou *Crypturellus berlepschi*

Little Tinamou *Crypturellus soui*

Choco Tinamou *Crypturellus kerriae* (EN)

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis*

Torrent Duck *Merganetta armata*

Blue-winged Teal *Anas discors*

Andean Teal *Anas andium*

Andean Duck *Nomonyx dominicus*

Colombian Chachalaca *Ortalis columbiana* (EN)

Baudo Guan *Penelope ortoni* (EN)

Andean Guan *Penelope montagnii*



Andean Guan en El Color de Mis Rêves © Ferran López

Cauca Guan *Penelope perspicax* (EN)

Sickle-winged Guan *Chamaepetes goudotii*

Crested Bobwhite *Colinus cristatus*

Chestnut Wood-Quail *Odontophorus hyperythrus*

Least Grebe *Tachybaptus dominicus*

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*

Rock Dove *Columba livia*

Southern Band-tailed Pigeon *Patagioenas albilinea*

Plumeous Pigeon *Patagioenas plumbea*

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea*

Dusky Pigeon *Patagioenas goodsoni* (EN)

Plain-breasted Ground-dove *Columbina minuta*

Ruddy Ground-dove *Columbina talpacoti*

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi*

Grey-headed Dove *Leptotila plumbeiceps*

Pallid Dove *Leptotila pallida*

White-throated Quail-dove *Zentrygon frenata*

Eared Dove *Zenaida auriculata*

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*

Striped Cuckoo *Tapera naevia*

Dwarf Cuckoo *Coccyua pumila*

Western Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*

Pauraque *Nyctidromus albicollis*

Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis lyra*



Macho joven de Lyre-tailed Nightjar en Río Blanco © Ferran López

Common Potoo *Nyctibius griseus*

Chestnut-collared Swift *Streptoprocne rutila*

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris*

Short-tailed Swift *Chaetura brachyura*

Lesser Swallow-tailed Swift *Panyptila cayannensis*

White-necked Jacobin *Florisuga mellivora*

White-whiskered Hermit *Phaethornis yaruqui*

Green Hermit *Phaethornis guy*

Tawny-bellied Hermit *Phaethornis syrmatorophorus*

Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae*

Choco Daggerbill *Schistes albogularis*



Choco Daggerbill en Río Blanco © Ferran López

Sparkling Violetear *Colibri coruscans*

Brown Violetear *Colibri delphinae*

Lesser Violetear *Colibri cyanotus*

Purple-crowned Fairy *Heliostyris barroti*

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis*

Tourmaline Sunangel *Heliangelus exortis*

Green Thorntail *Discosura conversii*

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys*

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingii*

Violet-tailed Sylph *Agelaiocercus coelestis*

Purple-backed Thornbill *Ramphomicron microrhynchum*

Rainbow-bearded Thornbill *Chalcostigma herrani*

Buffy Helmetcrest *Oxypogon stuebelii* (EN)

Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina*

Viridian Metaltail *Metallura williami*

Greenish Puffleg *Haplophaedia aureliae*

Black-thighed Puffleg *Eriocnemis derbyi* (EN)

Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera*

Shining Sunbeam *Aglaeactis cupripennis*



Shining Sunbeam en el hotel Termales del Ruiz © Ferran López

Bronzy Inca *Coeligena coeligena*

Brown Inca *Coeligena wilsoni*

Collared Inca *Coeligena torquata*

Buff-winged Starfrontlet *Coeligena lutetiae*

Mountain Velvetbreast *Lafresnaya lafresnayi*

Sword-billed Hummingbird *Ensifera ensifera*



Sword-billed Hummingbird en Hacienda El Bosque © Ferran López

Great Sapphirewing *Pterophanes cyanopterus*

Buff-tailed Coronet *Boissonneaua flavescens*

Velvet-purple Coronet *Boissonneaua jardini* (EN)

Booted Racket-tail *Ocreatus underwoodii*

Rufous-gaped Hillstar *Urochroa bougueri* (EN)

Purple-bibbed Whitetip *Urosticte benjamini* (EN)

Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides*

Green-crowned Brilliant *Heliodoxa jacula*

Empress Brilliant *Heliodoxa imperatrix* (EN)

White-bellied Woodstar *Chaetocercus mulsant*

Purple-throated Woodstar *Philodice mitchellii*

Blue-tailed Emerald *Chlorostilbon mellisugus*

Crowned Woodnymph *Thalurania colombica* (EN)



Crowned Woodnymph en el Descanso de Doña Dora © Ferran López

Steely-vented Hummingbird *Saucerottia saucerottei* (EN)

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl*

Andean Emerald *Uranomitra franciae* (EN)

Blue-chested Hummingbird *Polyerata amabilis*

Blackish Rail *Pardirallus nigricans*

Grey-cowled Wood-rail *Aramides cajaneus*

Purple Gallinule *Porphyrio martinicus*

White-throated Crake *Laterallus albigularis*

Southern Lapwing *Vanellus chilensis*

Wattlet Jacana *Jacana jacana*

Spotted Sandpiper *Actitis macularius*

Neotropic Cormorant *Nannopterum brasilianum*

Fasciated Tiger-Heron *Tigrisoma fasciatum*

Snowy Egret *Egretta thula*

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Striated Heron *Butorides striata*

Black-crowned Night-Heron *Hycticorax nycticorax*

Yellow-crowned Night-Heron *Nyctanassa violácea*

Green Ibis *Mesembrinibis cayennensis*

Bare-faced Ibis *Phimosus infuscatus*

American Black Vulture *Coragyps atratus*

Turkey Vulture *Cathartes aura*

Ornate Hawk-eagle *Spizaetus ornatus*



Ornate Hawk-eagle en el Parque Nacional Natural Tatamá © Ferran López

Barred Hawk *Morphnarchus princeps*

Roadside Hawk *Rupornis magnirostris*

Semiplumbeous Hawk *Leucopternis semiplumbeus*

White-throated Screech-Owl *Megascops albogularis*

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba*

Spectacled Owl *Pulsatrix perspicillata*

Andean Pygmy-Owl *Glaucidium jardiinii*



White-throated Screech-Owl en Manizales (izquierda) y Tropical Screech-Owl En Pereira (derecha) © Ferran López



Andean Pygmy-Owl en El Color de mis Rêves © Ferran López

Rufous-banded Owl *Ciccaba albitarsis*

Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps*

White-tailed Trogon *Trogon chionurus*

Collared Trogon *Trogon collaris*

Andean Motmot *Momotus aequatorialis*

Rufous Motmot *Baryphthengus martii*

Broad-billed Motmot *Electron platyrhynchum*

Ringed Kingfisher *Megasceryle torquata*

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*

Black-breasted Puffbird *Notharchus pectoralis*

Barred Puffbird *Nystalus radiatus*

White-whiskered Puffbird *Malacoptila panamensis*

Moustached Puffbird *Malacoptila mystacalis*

Lanceolated Monklet *Micromonacha lanceolata*

Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda*

Spot-crowned Barbet *Capito maculicoronatus*

Red-headed Barbet *Eubucco bourcierii*

Toucan Barbet *Semnornis ramphastinus*

Southern Emerald Toucanet *Aulacorhynchus albivitta*
(EN)

Crimson-rumped Toucanet *Aulacorhynchus*
haematopygus

Grey-breasted Mountain-toucan *Andigena*
hypoglauca (EN)

Black-billed Mountain-toucan *Andigena nigrirostris*



Southern Emerald Toucanet (izq) y Black-billed Mountain-toucan (dcha) en El Color de Mis Rêves © Ferran López



Crimson-rumped Toucanet en el Descanso de Doña Dora © Ferran López

Collared Araçari *Pteroglossus sanguineus* (EN)

Chestnut-mandibled Toucan *Ramphastos ambiguus*

Choco Toucan *Ramphastos brevis*

Greyish Piculet *Picumnus granadensis* (EN)

Acorn Woodpecker *Melanerpes formicivorus*

Black-cheeked Woodpecker *Melanerpes pucherani*

Red-crowned Woodpecker *Melanerpes rubricapillus*

Smoky-brown Woodpecker *Leuconotopicus fumigatus*

Yellow-vented Woodpecker *Veniliornis dignus*

Lineated Woodpecker *Hylatomus lineatus*

Cinnamon Woodpecker *Celeus loricatus*

Lita Woodpecker *Piculus litae* (EN)

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus*

Crimson-mantled Woodpecker *Colaptes rivolii*

Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula*

Crested Caracara *Caracara cheriway*

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima*

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans*

American Kestrel *Falco sparverius*

Bat Falcon *Falco ruficularis*

Saffron-headed Parrot *Pyrilia pyralia*

Blue-headed Parrot *Pionus menstruus*

Bronze-winged Parrot *Pionus chalcopterus*

Yellow-crowned Parrot *Amazona ochrocephala*

Mealy Parrot *Amazona farinosa*

Spectacled Parrotlet *Forpus conspicillatus*

Great Antshrike *Taraba major*

Bar-crested Antshrike *Thamnophilus multistriatus* (EN)

Black-crowned Antshrike *Thamnophilus atrinucha*

Russet Antshrike *Thamnistes anabatinus*

Checker-throated Stipplethroat *Epinecrophylla fulviventris*

Pacific Antwren *Myrmotherula pacifica*

White-flanked Antwren *Myrmotherula axillaris*

Slaty Antwren *Myrmotherula schisticolor*

Yellow-breasted Antwren *Herpsilochmus axillaris*

Dot-winged Antwren *Microrhopias quixensis*

Streak-headed Antbird *Drymophila striaticeps*

Parker's Antbird *Cercomacroides parkeri* (EN)

Jet Antbird *Cercomacra nigricans*

Chestnut-backed Antbird *Poliocrania exsul*

Esmeraldas Antbird *Sipia nigricauda*

Zeledon's Antbird *Hafferia zeledoni*



Macho de Zeledon's Antbird en San Cipriano © Ferran López

Blue-lored Antbird *Hafferia immaculata*

Bicoloured Antbird *Gymnopithys bicolor*

Spotted Antbird *Hylophylax naevioides*

Ocellated Antbird *Phaenostictus mcleannani*

Moustached Antpitta *Grallaria alleni*

Scaled Antpitta *Grallaria guatemalensis*

Plain-backed Antpitta *Grallaria haplonota*

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla*

Chestnut-naped Antpitta *Grallaria nuchalis*

Bicoloured Antpitta *Grallaria rufocinerea* (EN)

Tawny Antpitta *Grallaria quitensis*

Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* (EN)

Equatorial Antpitta *Grallaria saturata*

Thicket Antpitta *Hylopezus dives*

Hooded Antpitta *Grallaricula cucullata* (EN)

Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana*

Crescent-faced Antpitta *Grallaricula lineifrons*



Chestnut-crowned Antpitta (arriba) en Río Blanco y Bicoloured Antpitta (abajo) en El Color de Mis Rêves © Ferran López



Equatorial Antpitta en Hacienda El Bosque © Ferran López



Chestnut-naped Antpitta en El Color de Mis Rêves © Ferran López



Crescent-faced Antpitta en Hacienda el Bosque © Ferran López

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ocellated Tapaculo <i>Acropternis orthonyx</i> | Streak-headed Woodcreeper <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> |
| Paramo Tapaculo <i>Scytalopus opacus</i> | Montane Woodcreeper <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i> |
| Blackish Tapaculo <i>Scytalopus latrans</i> | Plain Xenops <i>Xenops genibarbis</i> |
| Nariño Tapaculo <i>Scytalopus vicini</i> (EN) | Streaked Xenops <i>Xenops rutilus</i> |
| Tatama Tapaculo <i>Scytalopus alvarezlopezi</i> (EN) | Streaked Tuftedcheek <i>Pseudocolaptes biossonneauii</i> |
| Spillmann's Tapaculo <i>Scytalopus spillmanni</i> | Uniform Treehunter <i>Thripadectes ignobilis</i> |
| Black-headed Antthrush <i>Formicarius nigricapillus</i> | Spotted Barbtail <i>Premnoplex brunescens</i> |
| Tyrannine Woodcreeper <i>Dendrocincla tyrannina</i> | Fulvous-dotted Treerunner <i>Margarornis stellatus</i> (EN) |
| Plain-brown Woodcreeper <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Pearled Treerunner <i>Margarornis squamiger</i> |
| Wedge-billed Woodcreeper <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | Andean Tit-Spinetail <i>Leptasthenura andicola</i> |
| Black-banded Woodcreeper <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Many-striped Canastero <i>Asthenes flammulata</i> |
| Cocoa Woodcreeper <i>Xiphorhynchus susurrans</i> | Red-faced Spinetail <i>Cranioleuca erythropis</i> |
| Black-striped Woodcreeper <i>Xiphorhynchus lachrymosus</i> | Slaty Spinetail <i>Synallaxis brachyura</i> |
| Olive-backed Woodcreeper <i>Xiphorhynchus triangularis</i> | Pale-breasted Spinetail <i>Synallaxis albescens</i> |
| Brown-billed Scythebill <i>Campylorhamphus pusillus</i> | Azara's Spinetail <i>Synallaxis azarae</i> |
| | Rufous Spinetail <i>Synallaxis unirufa</i> |

Golden-winged Manakin *Masius chrysopterus*

Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata*

Golden-collared Manakin *Manacus vitellinus*

Club-winged Manakin *Machaeropterus deliciosus*

Striolated Manakin *Machaeropterus striolatus*

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii*

Barred Fruiteater *Pipreola arcuata*

Orange-breasted Fruiteater *Pipreola jucunda*

Scaled Fruiteater *Ampelioides tschudii*

Andean Cock-of-the-rock *Rupicola peruvianus*



Orange-breasted Fruiteater en el PN Tatamá © Ferran López



Cock-of-the-rock en El Descanso de Doña Dora © Ferran López

Purple-throated Fruitcrow *Querula purpurata*

Red-ruffed Fruitcrow *Pyroderus scutatus*

Dusky Piha *Lipaugus fuscocinereus*

Black-tipped Cotinga *Carpodectes hopkei* (EN)

Black-crowned Tityra *Tityra inquisitor*

Masked Tityra *Tityra semifasciata*

Cinereous Becard *Pachyramphus rufus*

Cinnamon Becard *Pachyramphus cinnamomeus*

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus*

Ruddy-tailed Flycatcher *Terentotriccus erythrurus*

Tawny-breasted Flycatcher *Myiobius villosus*

Streak-necked Flycatcher *Mionectes striaticollis*

Olive-striped Flycatcher *Mionectes galbinus*

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris*

Rufous-breasted Flycatcher *Leptopogon rufipectus*

Marble-faced Bristle-tyrant *Pogonotriccus ophthalmicus*

Bronze-olive Pygmy-tyrant *Pseudotriccus pelzelni*

Rufous-headed Pygmy-tyrant *Pseudotriccus ruficeps*

Black-capped Pygmy-tyrant *Myiornis atricapillus*

Scale-crested Pygmy-tyrant *Lophotriccus pileatus*

Black-throated Tody-tyrant *Hemitriccus granadensis*

Rufous-crowned Tody-flycatcher *Poecilotriccus ruficeps*



Rufous-crowned Tody-flycatcher en Río Blanco © Ferran López

Common Tody-flycatcher *Todirostrum cinereum*

Black-headed Tody-flycatcher *Todirostrum nigriceps*

Pacific Flatbill *Rhynchocyclus pacificus* (EN)

Yellow-olive Flycatcher *Tolmomyias sulphurescens*

Yellow-margined Flycatcher *Tolmomyias assimilis*

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomeus*

Western Ornated Flycatcher *Myiotriccus ornatus*

Handsome Flycatcher *Nephelomyias pulcher*

Southern Beardless Tyrannulet *Camptostoma obsoletum*

Mouse-colored Tyrannulet *Phaeomyias murina*

Greenish Elaenia *Myiopagis viridicata*

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster*

Mountain Elaenia *Elaenia frantzii*

White-throated Tyrannulet *Mecocerculus leucophrys*

Torrent Tyrannulet *Serpophaga cinerea*

Ashy-headed Tyrannulet *Phyllomyias cinereiceps*

Plumbeous-crowned Tyrannulet *Phyllomyias plumbeiceps*

Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops*

Smoke-coloured Pewee *Contopus fumigatus*

Black Phoebe *Sayornis nigricans*

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus*

Pied Water-tyrant *Fluvicola pica*

Crowned Chat-tyrant *Silvicultrix frontalis*

Yellow-bellied Chat-tyrant *Silvicultrix diadema*

Slaty-backed Chat-tyrant *Ochthoeca cinnamomeiventris*

Brown-backed Chat-tyrant *Ochthoeca fumicolor*

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus*

Bright-rumped Attila *Attila spadiceus*

Pale-edged Flycatcher *Myiarchus cephalotes*

Cattle Tyrant *Machetornis rixosa*

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*

Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes cayanensis*

Lemon-browed Flycatcher *Conopias cinchoneti*

Golden-crowned Flycatcher *Myiodynastes chrysocephalus*

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus*

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana*

Black-billed Peppershrike *Cyclarhis nigrirostris*

Slaty-capped Shrike-vireo *Vireolanius leucotis*

Rufous-naped Greenlet *Pachysylvia semibrunnea*

Choco Vireo *Vireo masteri* (EN)

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys*

Beautiful Jay *Cyanolyca pulchra* (EN)

Black-chested Jay *Cyanocorax affinis*

Green Jay *Cyanocorax yncas*

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca*

Brown-bellied Swallow *Orochelidon murina*

White-thighed Swallow *Atticora tibialis*

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis*

Grey-breasted Martin *Progne chalybea*

Tawny-faced Gnatwren *Microbates cinereiventris*

Tropical Gnatcatcher *Polioptila plumbea*

Scaly-breasted Wren *Microcerculus marginatus*

House Wren *Troglodytes aedon*

Mountain Wren *Troglodytes solstitialis*

Paramo Wren *Cistothorus platensis*

White-headed Wren *Campylorhynchus albobrunneus*

Sooty-headed Wren *Pheugopedius spadix* (EN)

Whiskered Wren *Pheugopedius mystacalis*

Speckle-breasted Wren *Pheugopedius columbianus* (EN)

Bay Wren *Cantorchilus nigricapillus*

Sharpe's Wren *Cinnycerthia olivascens*

White-breasted Wood-wren *Henicorhina leucosticta* (EN)

Grey-breasted Wood-wren *Henicorhina leucophrys*

Munchique Wood-wren *Henicorhina negreti* (EN)



Munchique Wood-wren en el PN Tatamá © Ferran López

Northern Chestnut-breasted Wren *Cyphorhinus dichrous*

White-capped Dipper *Cinclus leucocephalus*

Andean Solitaire *Myadestes ralloides*

Orange-billed Nightingale-thrush *Catharus aurantiirostris*

Slaty-backed Nightingale-thrush *Catharus fuscater*

Black Solitaire *Entomodestes coracinus* (EN)

Cocoa Thrush *Turdus fumigatus*

Clay-coloured Thrush *Turdus grayi*

Pale-eyed Thrush *Turdus leucops*

Black-billed Thrush *Turdus ignobilis*

Great Thrush *Turdus fuscater*

Tricoloured Munia *Lonchura malacca*

Chestnut-breasted Chlorophonia *Chlorophonia pyrrhophrys*

Yellow-collared Chlorophonia *Chlorophonia flavirostris* (EN)

Orange-crowned Euphonia *Euphonia saturata*

Thick-billed Euphonia *Euphonia laniirostris*

Fulvous-vented Euphonia *Euphonia fulvicrissa*

Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanthogaster*

Andean Siskin *Spinus spinescens* (EN)

Yellow-bellied Siskin *Spinus xanthogastrus*

Tanager Finch *Oreothraupis arremonops* (EN)



Tanager Finch en el PN Tatamá © Ferran López

Ashy-throated Chlorospingus *Chlorospingus canigularis*

Common Chlorospingus *Chlorospingus flavopectus*

Dusky Chlorospingus *Chlorospingus semirufus* (EN)

Grassland Sparrow *Ammodramus humeralis*

Black-striped Sparrow *Arremonops conirostris*

Grey-browed Brushfinch *Arremon assimilis*

Orange-billed Sparrow *Arremon aurantirostris*

Chestnut-capped Brushfinch *Arremon brunneinucha*

Olive Finch *Arremon castaneiceps*

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*

White-naped Brushfinch *Atlapetes albinucha*

Choco Brushfinch *Atlapetes crassus*

Slaty Brushfinch *Atlapetes schistaceus*

Pale-naped Brushfinch *Atlapetes pallidinucha*

Red-breasted Meadowlark *Leistes militaris*

Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*

Chestnut-headed Oropendola *Psarocolius wagleri*

Subtropical Cacique *Cacicus uropygialis*

Yellow Oriole *Icterus nigrogularis*

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*

Carib Grackle *Quiscalus lugubris*

Tropical Parula *Setophaga pitayumi*

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus*

Three-striped Warbler *Basileuterus tristriatus*

Black-crested Warbler *Myiothlypis nigrocristata*

Buff-rumped Warbler *Myiothlypis fulvicauda*

Choco Warbler *Myiothlypis chlorophrys*

Russet-crowned Warbler *Myiothlypis coronata*

Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus*

Golden-fronted Whitestart *Myioborus chrysops* (EN)

Dusky-faced Tanager *Mitrospingus cassinii*

Hepatic Tanager *Piranga hepatica*

Crested Ant-tanager *Habia cristata* (EN)

Ochre-breasted Tanager *Habia stolzmanni*

Ultramarine Grosbeak *Cyanoloxia brissonii*

White-capped Tanager *Sericossypha albocristata*

Black-capped Hemispingus *Kleinothraupis atopileus*

Black-eared Hemispingus *Sphenopsis melanotis*

Superciliaried Hemispingus *Thlypopsis superciliaris*

White-shouldered Tanager *Loriotus luctuosus*

Tawny-crested Tanager *Chrysocorypha delatrii*

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus*

Flame-rumped Tanager *Ramphocelus flammigerus*
(EN)

Crimson-backed Tanager *Ramphocelus dimidiatus*

Black-and-gold Tanager *Bangsia melanochlamys* (EN)

Golden-chested Tanager *Bangsia rothschildi* (EN)

Gold-ringed Tanager *Bangsia aureocincta* (EN)



Gold-ringed Tanager en el PN Tatamá © Ferran López

Hooded Mountain-tanager *Buthraupis montana*

Blue-capped Tanager *Sporathraupis cyanocephala*

Grass-green Tanager *Chlorornis riefferii*

Black-chested Mountain-tanager *Cnemathraupis eximia* (EN)

Lacrimose Mountain-tanager *Anisognathus lacrymosus*

Scarlet-bellied Mountain-tanager *Anisognathus lunulatus*

Blue-winged Mountain-tanager *Anisognathus somptuosus*

Black-chinned Mountain-tanager *Anisognathus notabilis* (EN)

Buff-breasted Mountain-tanager *Dubusia taeniata*



Blue-winged Mountain-tanager en la Finca Bosque de Niebla © Ferran López



Buff-breasted Mountain-tanager en Río Blanco © Ferran López

Purplish-mantled Tanager *Iridosornis porphyrocephalus* (EN)

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota*

Glistening-green Tanager *Chlorochrysa phoenicotis*

Multicolored Tanager *Chlorochrysa nitidissima* (EN)

Blue-grey Tanager *Thraupis episcopus*

Palm Tanager *Thraupis palmarum*

Rufous-throated Tanager *Ixothraupis rufigula* (EN)

Golden-naped Tanager *Chalcothraupis ruficervix*

Grey-and-gold Tanager *Poecilostreptus palmeri* (EN)

Scrub Tanager *Stilpnia vitriolina* (EN)

Golden-hooded Tanager *Stilpnia larvata*

Blue-necked Tanager *Stilpnia cyanicollis*

Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii*

Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis*

Metallic-green Tanager *Tangara labradorides*

Rufous-winged Tanager *Tangara Lavinia*

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola*

Saffron-crowned Tanager *Tangara xanthocephala*

Blue-whiskered Tanager *Tangara johannae* (EN)

Golden Tanager *Tangara arthus*

Emerald Tanager *Tangara florida*

Silver-throated Tanager *Tangara icterocephala*

Turquoise Dacnis *Dacnis hartlaubi* (EN)

Blue Dacnis *Dacnis cayana*

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza*

Scarlet-browed Tanager *Heterospingus xanthopygius*

Guira Tanager *Hemithraupis guira*

Scarlet-and-white Tanager *Chrysothlypis salmoni* (EN)

Blue-backed Conebill *Conirostrum sitticolor*

Capped Conebill *Conirostrum albifrons* (EN)

Glossy Flowerpiercer *Diglossa lafresnayii*

Black Flowerpiercer *Diglossa humeralis*

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera*

Indigo Flowerpiercer *Diglossa indigotica* (EN)

Bluish Flowerpiercer *Diglossa caerulescens*

Masked Flowerpiercer *Diglossa cyanea*



Masked Flowerpiercer en Río Blanco © Ferran López

Plumbeous Sierra Finch *Geospizopsis unicolor*

Grey-hooded Bush-tanager *Cnemoscopus rubrirostris*

Saffron Finch *Sicalis flaveola*

Wedge-tailed Grass-finch *Emberizoides herbicola*

Blue-black Grassquit *Volatinia jacarina*

Ruddy-breasted Seedeater *Sporophila minuta*

Thick-billed Seed-finch *Sporophila funerea*

Large-billed Seed-finch *Sporophila crassirostris*

Black-breasted Seedeater *Sporophila ophthalmica*

Grey Seedeater *Sporophila intermedia*

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila nigricollis*

Paramo Seedeater *Catamenia homochroa*

Bananaquit *Coereba flaveola*

Yellow-faced Grassquit *Tiaris olivaceus*

Buff-throated Saltator *Saltator maximus*

Black-winged Saltator *Saltator atripennis*

Streaked Saltator *Saltator striatipectus*

Masked Saltator *Saltator cinctus*

Slate-coloured Grosbeak *Saltator grossus*