

Países Bajos

Enero 2023



ICARO
BIRDING EXPERIENCE

Regresamos a los Países Bajos con otro tour de cuatro intensos días, entre el 14 y el 17 de enero de 2023 para observar todas las especialidades de este increíble país combinándolo con las rarezas del momento. Aunque coincidimos con un frente tormentoso, la calidad de las observaciones fueron más que notables consiguiendo observar a muy corta distancia aves tan escasas y complicadas de ver como el **mérgulo atlántico**, **pigargo europeo**, **alondra cornuda**, **escribano nival** o un **escribano pigmeo**. Esta última especie aportó una interesante pincelada en cuanto a las rarezas del tour se refiere, permitiéndonos obtener fotografías con gran detalle. Una vez más, elegimos el pequeño pueblo de Bergen como lugar estratégico de alojamiento

situado en un punto intermedio a todos los desplazamientos que realizamos diariamente hacia las zonas más interesantes de nuestras observaciones.

Nuestra primera jornada empezó nada más recoger nuestras maletas en el aeropuerto de Schiphol y salir con nuestros dos vehículos de nueve plazas hacia el norte en busca de **3 o 4 ánsares chicos** que pudimos observar en los campos de Camperduin junto a los primeros grupos de **ánsar común**, **ánsar careto**, **ganso del Nilo** y una **barnacla carinegra**, más las espectaculares agrupaciones de **zarapito real**, **chorlito dorado europeo**, **avefría europea**, **ánade silbón**, **gaviota cana**, **gaviota argénte**a y **gavión atlántico**.



Grupo al completo durante nuestra última jornada por Flevoland © Xavier Larruy

Poco más tarde nos desplazamos hacia el norte para prospectar Den Oever, uno de los puertos más interesantes en la región de Holanda Septentrional (Noord-Holland). Una vez allí recorrimos alguna de las zonas portuarias consiguiendo observar las tres especies de **serretas**, un buen número de **porrones osculados** y agrupaciones de **archibebe común**. A pocos kilómetros al sur, en una de las lagunas litorales disfrutamos con agrupaciones de cientos de **porrones moñudos** y entre ellos, nuestros primeros **porrones bastardos** y **barnacla canadiense**. Ya de camino hacia nuestro hotel, decidimos probar suerte con una barnacla cuellirroja que

había sido citada el día anterior pero no conseguimos localizarla. Tras un completo día, llegamos a nuestro alojamiento donde nos esperaba una reparadora cena y después de repasar la lista de aves diaria nos fuimos a descansar.

Tras un buen desayuno tipo *buffet* en nuestro alojamiento, nuestra segunda jornada se centraba en desplazarnos hacia el sur para visitar la costa de Port Zelande. Sin embargo, antes decidimos probar suerte en Vlaardingen donde un **escribano pigmeo** había sido detectado durante los últimos días. Nada más llegar, pudimos observarlo a placer y fotografiarlo a muy corta distancia.



Escribano pigmeo en Vlaardingen (Zuid-Holland) © Ferran López



Momentos de la observación del escribano pigmeo en Vlardingén (Zuid-Holland) © Ferran López

Tras la excitación del escribano, continuamos nuestro trayecto dirección sur hacia la provincia de Zelanda (Zeeland) donde los fuertes vientos no nos permitieron chequear como es debido el mar en busca de aves marinas. Aun así, aparecieron algunas de las especies *target* del tour como los **correlimos oscuros**, observando en diferentes grupos y a muy corta distancia al menos once

ejemplares, también **ostreros euroasiáticos**, **alca común**, más **porrón osculado** y **serreta mediana**, **correlimos tridáctilos**, **vuelvepiedras común**, **chorlitejo grande**, **gaviota argétea**, **gavión atlántico** y un adulto de **gaviota enana**, entre otras aves. Además, tuvimos buenas observaciones de un individuo de foca gris que rondaba por la orilla de uno de los puntos estratégicos de la zona.



Correlimos oscuro (arriba) y foca gris (abajo) en la costa de Zelanda © Ferran López

Era el momento de dirigirnos hacia el puerto de Vlissingen, donde nos estaba esperando un **mérgulo atlántico**, **alca común** y diversas **gaviotas tridáctilas**, entre otras aves. Nuestro colega Krisztian Vámosi, un *birders* húngaro con quien coincidimos durante estos primeros días, nos estaba echando un cable agilizando la relocalización de alguna de las especies que más

necesitábamos y sin lugar a dudas, esta era una de ellas. Conseguimos observarlo a tan solo cinco metros de distancia, incluso bordeando en una ocasión el margen del puerto pasándonos bajo nuestros pies mientras intentaba alimentarse. Todo un hecho insólito, debido a que se trata de una de las especies de álcidos más compleja de encontrar y sobre todo de

observar a corta distancia. Además, también dos **focas comunes** que

permanecían dentro del mismo puerto.



Mégulo Atlántico en el puerto de Vlissingen (Zeeland) © Ferran López

Finalmente decidimos agotar nuestras dos últimas hora de luz observando un ejemplar de **barnacla cuellirroja** que llevaba cierto tiempo en unos campos de Kaarspolder, al este de la localidad de Wemeldinge, que estaba asociado a un grupo de **barnaclas carinegras**. A media distancia pudimos observar con detalle este precioso ejemplar, pero

también otras aves como grandes grupos de **barnacla cariblanca**, **ánsar común**, **tarro blanco**, entre otras especies. Ya con poca luz decidimos iniciar el regreso a nuestro alojamiento donde pudimos cenar, hacer la lista de aves del día e irnos a descansar a nuestras habitaciones.



Barnacla cuellirroja junto a barnaclas carinegras en los campos de Kaarspolder © Ferran López

Nuestra tercera jornada de tour arrancó tras un buen desayuno desplazándonos dirección norte hacia la provincia de Frisia (Friesland) cruzando el largo *polder* que se une con la región de Holanda Septentrional. Realizamos una breve parada en un tramo de este mismo *polder* para intentar ver una hembra de pato havelda localizada el día anterior,

aunque sin suerte. No obstante, obtuvimos muy buenas observaciones de pequeños grupos de machos de **serreta chica**, alguna **serreta grande** y **mediana**, macho de **eider común** y un enorme grupo de varios centenares de **porrones bastardos** y algún **porrón moñudo**, **zarapito real**, entre otras aves.



Porrone bastardos observados desde el *polder* de Afsluitdijk © Ferran López

Nuestro siguiente punto fue ya en las costas del norte de Frisia donde encontramos un grupo de mixto de **escribanos nivales** y **alondras cornudas**, de unos 30 y 20 ejemplares, respectivamente. Además, también apareció nuestro primer **bisbita costero** y grandes números de **ostrero euroasiático**, entre muchas otras aves. Decidimos tomarnos un breve descanso y calentarnos con un buen café en la localidad de Dokkum. Posteriormente, visitamos la parte oeste del Parque Nacional de Lauwersmeer donde tuvimos buenas observaciones de

diversas aves acuáticas, como **silbón europeo**, **ánade rabudo**, **serreta chica**, **cisne vulgar**, así como grandes agrupaciones de **correlimos común**, **chorlito dorado europeo**, **avefría europea**, **graja** y **busardo ratonero**. Finalmente llegamos al puerto de Waddenkwartier donde aún tuvimos tiempo de observar dos **correlimos oscuros** y **serreta mediana**, junto a dos **focas grises** que permanecían en el interior del mismo puerto. A última hora regresamos hacia nuestro hotel para cenar, hacer el repaso de la lista de aves del día e ir a descansar.



Barnaclas cariblancas en los campos de Frisia © Ferran López

Aprovechamos nuestro último día de tour para visitar la provincia de Flevolanda (Flevoland) y sus alrededores. Nuestro primer punto de observación fue en el pequeño puerto del final del *polder* de la localidad de

Lelystad donde obtuvimos muy buenas vistas de las tres especies de **serretas**, **porrón osculado**, **garceta grande**, **ánzar común**, **ánzar careto**, **porrón moñudo**, **ánade friso** y **somormujo lavanco**, entre otras aves.



Macho de serreta chica en Flevolanda © Ferran López



Observando acuáticas desde uno de los puertos de Flevolanda © Ferran López

Pronto nos dirigimos hacia la parte norte de la reserva natural de Oostvaardersplassen donde conseguimos ver nuestros dos primeros **pigargos europeos**, escuchar **bigotudos** sobre el gran carrizal que bordea la carretera y obtener unas increíbles vistas de la magnitud de esta zona repleta de aves acuáticas. Al otro margen de la carretera pudimos ver grandes cantidades de **porrones moñudos** y un **busardo ratonero** que nos ocasionó ciertas dudas con un posible busardo calzado. Un segundo punto en la parte este de la reserva nos proporcionó buenas observaciones de una pareja de **cisnes cantores** y al menos 18 **cisnes chicos**, **cisne vulgar**,

miles de **ánades rabudos**, **ánsares comunes**, **ánsares caretos** y al menos cuatro **ánsares campestres** de la subespecie **rossicus**. Cabe destacar que algunos autores consideran este taxón como una especie independiente **Anser serrirostris rossicus**. También se avistaron infinidad de **avefrías europeas**, **chorlitos dorados europeos**, una sola **avoceta común**, **picogordo**, **garceta grande** y al menos dos **pigargos europeos** más, uno de ellos posado en el suelo a media distancia. Nos desplazamos hasta otra de las zonas que bordean la gran reserva, esta vez ya situados hacia la parte sur donde observamos cuatro **cisnes cantores** más, dos machos de **esmerejón**, hasta

cinco **pigargos europeos** más, dos **serretas chicas** y por fin, el esperado **busardo calzado**, que intentaba cazar en los campos frente a nuestra posición

mostrándonos varios de los detalles distintivos de su cola, entre otras características.



Pareja de cisnes cantores en Flevolanda © Ferran López

El resto de la tarde lo aprovechamos para visitar un tramo del canal de Veluwemeer donde intentamos relocalizar sin suerte un pato havelda pero conseguimos ver un último **pigargo europeo, porrón moñudo, porrón común**, entre otras aves, para luego dirigirnos hacia los campos al sur de Amsterdam, cerca de la localidad de Wilnis, donde el día anterior se había localizado un ánsar de Ross. No conseguimos encontrarlo pese a contar

con la ayuda de algunos observadores holandeses que también estaban por la labor, pero sí que conseguimos finalizar nuestro tour con unas increíbles observaciones de las enormes agrupaciones de **ánsares caretos, ánsares comunes y barnaclas cariblanclas** que, sin lugar a dudas, nos dejaron un inmejorable sabor de boca antes de regresar hacia el aeropuerto de Schiphol, donde dimos por finalizado nuestro tour ornitológico.

Lista de las aves observadas

Cisne vulgar *Cygnus olor*

Diversos ejemplares observados durante todos los días.

Cisne chico *Cygnus columbianus*

Un grupo de 18 ejemplares en Flevoland.

Cisne cantor *Cygnus cygnus*

Al menos seis ejemplares en diferentes zonas de Flevoland.

Ansar chico *Anser erythropus*

Un grupo de 3 o 4 ejemplares en Camperduin.

Ansar careto *Anser albifrons*

Observaciones diarias por casi todas las regiones.

Ansar campestre *Anser fabalis*

Unos 4 o 5 ejemplares de la subespecie *rossicus* en los campos de Flevoland.

Barnacla canadiense *Branta canadensis*

Diferentes observaciones en varias regiones.

Ansar común *Anser anser*

Muy abundante en la mayoría de regiones visitadas.

Barnacla cariblanca *Branta leucopsis*

Muy abundantes en la mayoría de regiones visitadas.

Barnacla carinegra *Branta bernicla*

Diferentes observaciones en varias regiones.

Barnacla cuellirroja *Branta ruficollis*

Un ejemplar en los campos de Kaarspolder.

Ganso del Nilo *Alopochen aegyptiaca*

Diferentes ejemplares en la mayoría de regiones visitadas.

Tarro blanco *Tadorna tadorna*

Común en la región de Noord Holland, Friesland y Flevoland.

Anade azulón *Anas platyrhynchos*

Abundante en la mayoría de regiones visitadas.

Anade friso *Anas strepera*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Anade rabudo *Anas acuta*

Común en la región de Flevoland.

Cuchara común *Anas clypeata*

Varios ejemplares observados en Noord Holland y Flevoland.

Silbón europeo *Anas penelope*

Muy común en Noord Holland y Friesland.

Cerceta común *Anas crecca*

Varios ejemplares observados en Noord Holland y Flevoland.

Porrón moñudo *Aythya fuligula*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Porrón europeo *Aythya ferina*

Diferentes ejemplares observados en Noord Holland y Friesland.

Porrón bastardo *Aythya marila*

Algunos ejemplares en una laguna litoral al sur de Den Oever y muy abundante en el *polder* que une Noord Holland con Friesland.

Eider común *Somateria mollissima*

Un macho en el *polder* que une Noord Holland con Friesland.

Porrón osculado *Bucephala clangula*

Varios ejemplares en el puerto de Den Oever, Zeeland y Flevoland.

Serreta chica *Mergellus albellus*

Diferentes grupos en diferentes zonas.

Serreta grande *Mergus merganser*

Diferentes grupos en diferentes zonas.

Serreta mediana *Mergus serrator*

Diferentes grupos en diferentes zonas.

Faisán vulgar *Phasianus colchicus*

Unos pocos ejemplares observados en diferentes tramos de carreteras.

Zampullín común *Tachybaptus ruficollis*

Observaciones en varias regiones visitadas.

Zampullín cuellinegro *Podiceps nigricollis*

Un ejemplar en Zeeland.

Somormujo lavanco *Podiceps cristatus*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*

Observaciones regulares en la mayoría de regiones visitadas.

Garceta grande *Casmerodius albus*

Varios ejemplares observados en diferentes zonas.

Garza real *Ardea cinerea*

Común en la mayoría de regiones.

Garceta común *Egretta garzetta*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas del viaje.

Pigargo europeo *Haliaeetus albicilla*

Al menos nueve ejemplares observados en la región de Flevoland.

Busardo ratonero *Buteo buteo*

Común en la mayoría de regiones.

Busardo calzado *Buteo lagopus*

Un ejemplar en Flevoland.

Gavilán común *Accipiter nisus*

Un ejemplar en Friesland.

Cernícalo vulgar *Falco tinnunculus*

Común en la mayoría de zonas.

Halcón peregrino *Falco peregrinus*

Un ejemplar cerca de Dokkum.

Gallineta común *Gallinula chloropus*

Varios ejemplares en diferentes zonas visitadas.

Focha común *Fulica atra*

Común en la mayoría de regiones.

Ostrero euroasiático *Haematopus ostralegus*

Común en la mayoría de regiones, especialmente en Port Zelande, donde observamos varias decenas alimentándose.

Avoceta común *Recurvirostra avosetta*

Un ejemplar en Flevoland.

Chorlito dorado europeo *Pluvialis apricaria*

Abundante en diferentes zonas.

Avefría europea *Vanellus vanellus*

Abundante en todas las regiones visitadas.

Correlimos tridáctilo *Calidris alba*

Unos pocos ejemplares en Port Zelande.

Correlimos común *Calidris alpina*

Muy común en diferentes regiones de Friesland.

Correlimos oscuro *Calidris maritima*

Al menos 11 ejemplares en Port Zelande.

Vuelvepiedras *Arenaria interpres*

Común en Port Zelande y otras zonas.

Archibebe común *Tringa totanus*

Diferentes grupos en Den Oever.

Zarapito real *Numenius arquata*

Abundante en la mayoría de zonas sobre todo en las costas de Friesland.

Gaviota reidora *Chroicocephalus ridibundus*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Gaviota cana *Larus canus*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Gaviota tridáctila *Rissa tridactyla*

Varios ejemplares en el puerto de Vlissingen.

Gaviota enana *Hydrocoloeus minutus*

Un adulto en Port Zelande.

Gaviota argéntea *Larus argentatus*

Común en la mayoría de regiones visitadas.

Gaviota sombría *Larus fuscus*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas.

Gavión atlántico *Larus marinus*

Varios ejemplares observados en diferentes zonas.

Mérgulo atlántico *Alle alle*

Un ejemplar en el puerto de Vlissingen.

Alca común *Alca torda*

Un ejemplar en Port Zelande.

Paloma bravía *Columba livia*

Varios ejemplares observados.

Paloma zurita *Columba oenas*

Unos pocos ejemplares en Flevoland.

Paloma torcaz *Columba palumbus*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas.

Tórtola turca *Streptopelia decaocto*

Unos pocos ejemplares en diferentes zonas pobladas.

Mochuelo común *Athene noctua*

Un ejemplar en el alojamiento de Bergen.

Cotorra de Kramer *Psittacula krameri*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Pito real euroasiático *Picus viridis*

Un ejemplar en un tramo de carretera en la región de Zeeland.

Bisbita pratense *Anthus pratensis*

Común en la mayoría de zonas.

Bisbita alpino *Anthus spinoletta*

Al menos un ejemplar en Flevoland.

Bisbita costero *Anthus petrosus*

Al menos un ejemplar en las costas de Friesland.

Chochín común *Troglodytes troglodytes*

Varios ejemplares escuchados en diferentes zonas.

Acentor común *Prunella modularis*

Unos pocos ejemplares escuchados en diferentes zonas.

Petirrojo europeo *Erethacus rubecula*

Unos pocos ejemplares escuchados en diferentes zonas

Zorzal común *Turdus philomelos*

Al menos dos ejemplares en Flevoland.

Mirlo común *Turdus merula*

Algunos ejemplares vistos en diferentes zonas.

Cetia ruiseñor *Cettia cetti*

Diferentes ejemplares escuchados en Flevoland.

Carbonero común *Parus major*

Diferentes ejemplares vistos en varias regiones.

Herrerillo común *Cyanistes caeruleus*

Diferentes ejemplares vistos en varias regiones.

Bigotudo *Panurus biarmicus*

Un ejemplar escuchado en Flevoland.

Urraca *Pica pica*

Diferentes observaciones en la mayoría de regiones.

Arrendajo euroasiático *Garrulus glandarius*

Un par de ejemplares en Flevoland.

Grajilla *Corvus monedula*

Muy abundante en la mayoría de localidades.

Graja *Corvus frugilegus*

Un grupo de unos 20 ejemplares en Friesland.

Corneja negra *Corvus corone*

Común en la mayoría de regiones.

Estornino pinto *Sturnus vulgaris*

Común en la mayoría de regiones.

Gorrión común *Passer domesticus*

Unos pocos ejemplares en Friesland.

Pinzón vulgar *Fringilla coelebs*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Jilguero europeo *Carduelis carduelis*

Varios ejemplares en diferentes zonas.

Lúgano *Spinus spinus*

Unos pocos ejemplares en Den Oever.

Picogordo común *Coccothraustes coccothraustes*

Un ejemplar en Flevoland.

Escribano palustre *Emberiza schoeniclus*

Unos pocos ejemplares en Vlaardingen.

Escribano pigmeo *Emberiza pusilla*

Un ejemplar en Vlaardingen.